

Тестовые задания для проведения первого этапа первичной аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием по специальности

31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО

1. [Т003253] ПЕРВЫЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 10 – 12
- Б) 12 – 15
- В) 30 – 32
- Г) 28 – 30

2. [Т003254] ВТОРОЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 30 – 32
- Б) 32 – 40
- В) 26 – 28
- Г) 36 – 38

[Т003255] НА ПЕРВОМ ДОРОДОВОМ ПАТРОНАЖЕ ПРОВОДИТСЯ

- А) сбор анамнеза
- Б) обучение уходу за новорожденным
- В) полное обследование женщины
- Г) постановка на учет

4. [Т003256] ЦЕЛЬЮ ВТОРОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА К БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) подготовка женщины к достаточной лактации
- Б) знакомство с семьей
- В) выяснение состояния здоровья отца ребенка
- Г) обучение уходу за ребенком

5. [Т003257] ПАТРОНАЖ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) 1 раз в неделю
- Б) 2 раза в неделю
- В) 1 раз в месяц
- Г) 2 раза в месяц

6. [Т003258] СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПАТРОНАЖА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ РОДДОМА В ДНЯХ

- А) 1-3
- Б) 4-6
- В) 5-7
- Г) 8-10

[Т003259] НА ПЕРВОМ ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКОМ ПАТРОНАЖЕ МАТЬ ОБУЧАЮТ

- А) проведению гигиенической ванны
- Б) постановке горчичников
- В) измерению артериального давления
- Г) проведению ножных ванн

8. [Т003260] НА ВТОРОМ ПАТРОНАЖЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) контроль выполнения всех манипуляций по уходу
- Б) обучение гимнастике
- В) обучение правилам контрастного обливания ног
- Г) сбор анамнеза

9. [Т003261] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПОТРЕБНОСТЯМ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ

- А) быть в безопасности
- Б) учиться
- В) поклоняться кому-либо
- Г) быть признанным

10. [Т003262] ЗНАКОМСТВО С СЕМЬЕЙ НА ПЕРВОМ ДОРОДОВОМ ПАТРОНАЖЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) изучение анамнеза заболеваний

Б) профилактику респираторных инфекций новорожденного

В) выяснение предпочтений в духовной сфере

Г) профилактику генетической патологии

11. [T003263] ЭМБРИОПАТИИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВЛИЯНИИ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ ДО НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ

А) 12

Б) 20

В) 24

Г) 30

12. [T003264] ОБРАБОТКУ ГЛАЗ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ

А) гонобленнореи

Б) ксерофтальмии

В) пиогенной инфекции

Г) вирусного конъюнктивита

13. [T003266] ПЕРВОЙ ПИЩЕЙ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

А) молозиво

Б) зрелое молоко

В) молочная каша

Г) молочная смесь

14. [T003267] СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПАЛАТЕ СПОСОБСТВУЕТ

А) кормлению ребенка «по требованию»

Б) осложнению работы медицинского персонала

В) ухудшению процесса адаптации новорожденного

Г) возникновению гнойно-септической инфекции

15. [T003268] ПРИ ЭМБРИОПАТИИ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ПРОИСХОДИТ В ПЕРИОД

А) органогенеза

Б) фетогенеза

В) ранний неонатальный

Г) поздний неонатальный

16. [T003269] ПЕРЕНОШЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ НА НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ

А) 43

Б) 41

В) 40

Г) 39

17. [T003270] ПЕРВЫЙ ИЗГИБ ПОЗВОНОЧНИКА ПОЯВЛЯЕТСЯ В ОТДЕЛЕ

А) шейном

Б) грудном

В) поясничном

Г) крестцовом

18. [T003271] ПРИ НАГРУБАНИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ

А) сухое тепло

Б) спиртовой компресс

В) орошение фурациллином

Г) обезболивающую мазь

19. [T003272] ЭЛЕМЕНТОМ УХОДА ЗА РОДОВОЙ ОПУХОЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

А) покой

Б) постоянная смена положения

В) положение на пораженной стороне

Г) обработка фурациллином

20. [T003274] НАЧИНАТЬ ПРОГУЛКИ С НОВОРОЖДЕННЫМ ЗИМОЙ МОЖНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НЕ МЕНЕЕ

А) - 10С

Б) - 5С

В) - 15С

Г) - 20С

21. [T003275] МОЛОЗИВО ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ СОДЕРЖАНИЮ

А) иммуноглобулинов

Б) жира

В) углеводов

Г) микроэлементов

22. [T003276] ЖЕНСКОЕ МОЛОКО СОДЕРЖИТ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ

А) таурин

Б) казеин

В) насыщенные жирные кислоты

Г) альфа-лактозу

23. [T003277] ТАУРИН ЖЕНСКОГО МОЛОКА УЧАСТВУЕТ В

А) развитию нервной системы

Б) регуляции работы желудочно-кишечного тракта

В) формировании флоры кишечника

Г) переваривании жиров

24. [T003278] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СНА КОРМЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ В ЧАСАХ В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ

А) 8

Б) 4

В) 6

Г) 12

25. [T003280] НОВОРОЖДЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ДО ДНЯ

А) 29

Б) 30

В) 14

Г) 7

26. [T003281] ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЮТ

А) цвет кожи

Б) количество сыровидной смазки

В) аппетит

Г) группу крови

27. [T003282] КОЛИЧЕСТВО ВЛАЖНЫХ УБОРОК В ПАЛАТЕ НОВОРОЖДЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

А) 3

Б) 4

В) 2

Г) 1

28. [T003283] ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ЖИВОРОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) самостоятельное дыхание

Б) гиперемия кожи

В) наличие сосательного рефлекса

Г) гримаса при раздражении

29. [T003284] ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ НОВОРОЖДЕННОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

А) наличию сосательного рефлекса

Б) цвету кожи

В) характеру стула

Г) громкости крика

30. [T003285] МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ

А) 10-15

Б) 1-5

В) 20-30

Г) 30-60

31. [T003286] ПРИ ОТСУТСТВИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ РОДАХ АКУШЕРКА ПРОВОДИТ

А) тактильную стимуляцию

Б) самостоятельное подключение к ИВЛ

В) введение бронхолитиков

Г) согревание ребенка

32. [T003287] К ЗАКАЛИВАЮЩИМ ПРОЦЕДУРАМ У НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ

А) умывание

Б) обтирание кожи

В) обливание ног

Г) купание в открытых водоемах

33. [T003288] ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

А) данне медицинских осмотров

Б) листки нетрудоспособности

В) статистические талоны

Г) данные переписи населения

34. [T003289] ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ

А) талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у)

Б) дневник работы врача общей практики (семейного врача) (ф. 039/у-воп)

В) медицинскую карту амбулаторного больного (ф. 025/у-04)

Г) талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88)

35. [T003290] К ДОКУМЕНТУ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВОООБРАЗОВАНИЯМИ ОТНОСЯТ

А) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования

Б) статистический талон

В) талон на прием к врачу

Г) амбулаторную карту

36. [T003291] РЕПРОДУКТИВНЫМ ВОЗРАСТОМ У ЖЕНЩИНЫ СЧИТАЮТ ВОЗРАСТ

А) от 15 до 50 лет

Б) от 15 до 20 лет

В) от 15 до 40 лет

Г) от 15 до 30 лет

37. [T003293] К МЕТОДУ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ОТНОСЯТ

А) биохимический

Б) близнецовый

В) дерматоглифический

Г) цитологический

38. [T003294] К МЕТОДУ АНТРОПОГЕНЕТИКИ, ОСНОВАННОГО НА ПРОСЛЕЖИВАНИИ ПРИЗНАКОВ В РЯДУ ПОКОЛЕНИЙ, ОТНОСЯТ

А) генеалогический

Б) биохимический

В) близнецовый

Г) цитологический

39. [T003295] ВОЗРАСТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, В КОТОРЫХ ПОВЫШЕН РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ХРОМОСОМНЫМИ АНОМАЛИЯМИ, СОСТАВЛЯЮТ

А) 35 -45 лет

Б) 20-25 лет

В) 15-18 лет

Г) 25-35 лет

[T003296] ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

А) хромосомной патологии

Б) синдромов с множественными врожденными пороками развития

В) моногенной патологии с известным первичным биохимическим дефектом

Г) мультифакториальных болезней

41. [T003297] К ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКАМ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ ХОРИОНА ОТНОСЯТ ____ НЕДЕЛЬ

- А) 10-13
- Б) 4-6
- В) 7-9
- Г) 14-16

42. [Т003298] ЛЕТАЛЬНАЯ МУТАЦИЯ СОПРЯЖЕНА С

- А) анэнцефалией
- Б) карликовостью
- В) гиперхолестеринемией
- Г) гемофилией

43. [Т003299] К АНОМАЛИЯМ, ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ КОТОРЫХ ЯВИЛИСЬ ГЕННЫЕ МУТАЦИИ, ОТНОСЯТ

- А) полидактилию и синдактилию
- Б) синдромы Дауна и Эдвардса
- В) синдромы Клайнфельтера и Шерешевского-Тернера
- Г) транслокационные формы хромосомных синдромов

44. [Т003300] ДЕЛЕЦИЯ КОРОТКОГО ПЛЕЧА 5 ХРОМОСОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- А) «кошачьего крика»
- Б) синдрома Патау
- В) синдрома Дауна
- Г) синдрома Эдвардса

45. [Т003301] ТРИСОМИЯ ПО 18 ХРОМОСОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- А) синдрома Эдвардса
- Б) синдрома Дауна
- В) «кошачьего крика»
- Г) синдрома Патау

46. [Т003302] ТРИСОМИЯ ПО 13 ХРОМОСОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- А) синдрома Патау
- Б) синдрома Дауна
- В) «кошачьего крика»
- Г) синдрома Эдвардса

47. [Т003303] К ПОКАЗАТЕЛЮ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТНОСИТСЯ

- А) распространенность заболеваний среди населения
- Б) степень изменения уровня заболеваемости во времени
- В) истощенная заболеваемость населения
- Г) удельный вес того или иного заболевания среди населения

48. [Т003304] ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

- А) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; среднегодовая численность населения
- Б) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году
- В) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая численность населения
- Г) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году; общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году

49. [Т003306] ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРАЖЕННОСТИ

- А) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; число лиц, прошедших медицинский осмотр
- Б) число заболеваний, выявленных впервые в данном году; среднегодовая численность населения
- В) число всех выявленных заболеваний; число обратившихся за медицинской помощью
- Г) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая численность населения

50. [Т003308] ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ ПОНИМАЮТ

- А) медико-демографическую и социальную категорию, отражающую физическое, психическое, социальное благополучие людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в рамках определенных социально-экономических систем
- Б) систему лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
- В) науку о социальных проблемах медицины
- Г) систему социально-экономических мероприятий по охране здоровья

51. [T003309] СРЕДИ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЛИДИРУЮТ

- А) образ жизни
- Б) биологические
- В) экологические
- Г) уровень организации медицинской помощи

52. [T003310] ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) предупреждение обострений заболевания
- Б) предупреждение воздействия факторов риска развития заболеваний
- В) предупреждение возникновения инвалидности
- Г) все вышеперечисленное

53. [T003311] НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

- А) развитие первичной медико-санитарной помощи
- Б) повышение роли санаторно-курортной помощи
- В) развитие сети диспансеров
- Г) повышение роли стационаров

54. [T003312] К ПОКАЗАТЕЛЮ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕМУ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТ

- А) среднее число посещений на 1 жителя в год
- Б) фактическая среднечасовая нагрузка врача в поликлинике
- В) распределение посещений городских жителей
- Г) выполнение плана посещений

55. [T003313] СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ИЗУЧАЕТ

- А) численность и состав населения по социальным и биологическим признакам
- Б) общую и повозрастную плодовитость
- В) рождаемость, смертность и воспроизводство населения
- Г) миграцию в различных регионах страны

56. [T003314] ДОКУМЕНТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

- А) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
- Б) международная номенклатура заболеваний
- В) международная классификация заболеваний и травм
- Г) единая статистическая классификация болезней и случаев смерти

57. [T003315] ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

- А) рождаемость, смертность, естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении
- Б) естественный прирост, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, заболеваемость, смертность
- В) рождаемость, браки, разводы, младенческая смертность, первичная заболеваемость
- Г) рождаемость, смертность, первичная заболеваемость, общая заболеваемость

58. [T003318] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА

- А) предупреждение обострений заболевания
- Б) предупреждение воздействия факторов риска на развитие острых заболеваний
- В) предупреждение возникновения инвалидности
- Г) предупреждение воздействия факторов риска на развитие хронических заболеваний

59. [T003319] ОРГАНОМ, КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фонд социального страхования
- Б) министерство здравоохранения
- В) роспотребнадзор
- Г) страховая медицинская организация

60. [T003320] К ДАННЫМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ, ОТНОСЯТ

- А) число физиологических родов; общее число родов
- Б) число физиологических родов; число родившихся живыми и мертвыми
- В) число физиологических родов; число родов с осложнениями

Г) число физиологических родов; число родившихся живыми

61. [Т003321] КАКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ВЫДАЧИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

- А) фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в отдаленной местности
- Б) врачу станции скорой помощи
- В) врачу дома отдыха, санатория
- Г) медицинской сестре здравпункта

62. [Т003322] К ФУНКЦИЯМ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОТНОСЯТСЯ

- А) установление факта временной нетрудоспособности, выдача листка нетрудоспособности, направление на ВК для продления листка нетрудоспособности
- Б) установление факта временной нетрудоспособности, выдача листка нетрудоспособности, направление на медико-социальную экспертизу
- В) установление факта временной нетрудоспособности, выдача листка нетрудоспособности, экспертиза стойкой нетрудоспособности
- Г) установление факта стойкой нетрудоспособности, выдача направления на врачебную комиссию, экспертиза временной нетрудоспособности

63. [Т003323] К ФУНКЦИЯМ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОТНОСЯТСЯ

- А) экспертиза временной нетрудоспособности, консультации врачей, выдача рекомендаций о переводе на щадящую работу, контроль качества лечения, направление на МСЭ в случае возникновения признаков стойкой утраты трудоспособности
- Б) консультации врачей, направление на МСЭ, экспертиза стойкой нетрудоспособности, профессиональной непригодности
- В) консультации врачей, выдача листка нетрудоспособности всем больным, экспертиза временной нетрудоспособности
- Г) выдача листка нетрудоспособности, справок о профессиональной непригодности, экспертиза временной нетрудоспособности, выдача заключения о переводе на другую работу беременных

64. [Т003324] ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития, демографические показатели
- Б) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности
- В) показатели соотношения, наглядности, инвалидности
- Г) демографические показатели, физического развития, обеспеченности кадрами

[Т003325] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) анкетирование
- Б) тестирование
- В) наблюдение
- Г) выкопировка данных из первичных документов

66. [Т003326] ПРИ РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) число женщин детородного возраста
- Б) общее число родившихся живыми и мертвыми
- В) число женщин, состоявших в браке
- Г) численность брачных пар в населении

67. [Т003327] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) проведение медицинских осмотров
- Б) выявление заболеваний
- В) улучшение условий труда и отдыха
- Г) повышения материального благосостояния

68. [Т003328] ДЕМОГРАФИЯ — ЭТО НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ

- А) численность, состав и воспроизводство населения в его общественном развитии
- Б) факторную обусловленность здоровья
- В) здоровье населения
- Г) вопросы брака и плодовитости

69. [Т003329] ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) медицинское свидетельство о рождении ребенка
- Б) свидетельство о браке

В) заявление 2 свидетелей

Г) свидетельство о рождении

70. [T003330] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

А) от 0 до 15 лет и 50 лет и старше

Б) от 1 до 10 лет и от 10 до 15 лет

В) от 19 до 59 лет и 50 лет и старше

Г) от 15 до 49 лет и 60 лет и старше

71. [T003331] БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ

А) 1 раз в месяц

Б) 2 раза в триместр

В) 1 раз в 2 недели

Г) 1 раз в неделю

72. [T003332] ПРИ НАБЛЮДЕНИИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ КАЖДАЯ БЕРЕМЕННАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА

А) терапевтом и стоматологом, при наличии показаний другими специалистами

Б) терапевтом, хирургом

В) хирургом, венерологом

Г) лор-врачом, инфекционистом

73. [T003333] ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА ТЕРАПЕВТОМ

А) 2 раза за беременность

Б) 2 раза в месяц

В) 2 раза в триместр

Г) 1 раз в 2 месяца

74. [T003334] ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

А) 1 раз в 2 недели

Б) 1 раз в месяц

В) 1 раз в 10 дней

Г) 1 раз в 2 месяца

75. [T003335] КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

А) 3 раза за беременность

Б) 1 раз в месяц

В) 2 раза в месяц

Г) 1 раз в 2 месяца

76. [T003336] РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ С

А) 30

Б) 28

В) 34

Г) 38

77. [T003337] КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИИ ВАССЕРМАНА В ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ

А) 3

Б) 2

В) 4

Г) 1

78. [T003338] КРАТНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКОВ НА ГОНОКОККИ У БЕРЕМЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ

А) 3

Б) 1

В) 2

Г) 4

79. [T003339] КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ УЗИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТАВЛЯЕТ

А) трижды в I, II и III триместрах беременности

Б) однократно во II триместре

В) однократно в I триместре

Г) по строгим показаниям

80. [T003340] ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ

А) только при наличии показаний

Б) при каждом посещении

В) через одно посещение

Г) через два посещения

81. [T003341] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА В ДНЯХ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ СОСТАВЛЯЕТ

А) 70

Б) 56

В) 50

Г) 74

82. [T003342] РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ ЖЕНЩИНЕ ПРИ МНОГОПЛОДИИ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ С

А) 28

Б) 30

В) 34

Г) 38

83. [T003343] ОСНОВНАЯ РОЛЬ АКУШЕРКИ В СИСТЕМЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

А) борьбе с материнской и перинатальной заболеваемостью и смертностью

Б) оказании помощи, связанной с рождением ребенка

В) оказании помощи только женщине

Г) оказании помощи всей семье

84. [T003344] ЕСЛИ БЕРЕМЕННАЯ НЕ ПРИШЛА НА ПРИЕМ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, АКУШЕРКА ПРОВОДИТ ПАТРОНАЖ

А) в этот же или на следующий день

Б) в течение недели

В) в течение месяца

Г) только по назначению врача

85. [T003345] ПРИ КАЖДОМ ПОСЕЩЕНИИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ

А) взвешивание и тонометрию

Б) взвешивание и пельвеометрию

В) осмотр в зеркалах

Г) бимануальное исследование

86. [T003346] АКУШЕРКА ИМЕЕТ ПРАВО

А) оказывать акушерское пособие при нормальных родах

Б) оказывать акушерское пособие без врача при осложненных родах

В) проводить ручное отделение и выделение последа

Г) проводить обследование полости матки

87. [T003347] ФЛЮОРОГРАФИЯ ЛЕГКИХ У БЕРЕМЕННЫХ

А) проводится, если есть подозрения на опухолевидные разрастания в верхних дыхательных путях, пневмонию, туберкулез, жалобы на инородное тело в лёгких

Б) назначается в первой и второй половине беременности

В) назначается однократно при постановке на учет

Г) назначается трижды за беременность

88. [T003348] МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ВОПРОСЫ О

А) профессиональном долге медицинских работников

Б) внутреннем духовном мире человека

В) формах человеческого сознания

Г) морали поведения

89. [T003349] ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) биопсия хориона

- Б) плацентоцентез
- В) амниоскопия
- Г) амниоцентез

90. [T003350] НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВО II ТРИМЕСТРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) амниоскопия
- Б) биопсия хориона
- В) ультразвуковое исследование
- Г) электрокардиография

91. [T003351] ДОРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ВЫДАЕТСЯ В НЕДЕЛЯХ

- А) 30
- Б) 26
- В) 32
- Г) 27

92. [T003352] БЕРЕМЕННЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОРОДОВЫЙ ОТПУСК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ДНЯХ

- А) 70
- Б) 56
- В) 86
- Г) 84

93. [T003353] ПОСЛЕРОДОВЫЙ ОТПУСК ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ДНЯХ

- А) 110
- Б) 86
- В) 70
- Г) 84

94. [T003354] ОСМОТР ОКУЛИСТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМ

- А) всем женщинам
- Б) только женщинам с конъюнктивитом
- В) только женщинам после оперативной коррекции зрения
- Г) женщинам, обращающимся по желанию

95. [T003355] БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ВСТАТЬ НА УЧЕТ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 12
- Б) 14
- В) 16
- Г) 20

96. [T003356] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОТНОСИТСЯ

- А) увеличение объема циркулирующей крови
- Б) понижение количества эритроцитов
- В) повышение количества лейкоцитов
- Г) понижение количества тромбоцитов

97. [T003357] БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРОВОДИТСЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА

- А) стафилококковой инфекции
- Б) столбняка
- В) дифтерии
- Г) полиомиелита

98. [T003358] ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 30-НЕДЕЛЬНОГО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А) ультразвуковое исследование
- Б) рентгенологический метод
- В) амниоскопию
- Г) электрокардиография плода

99. [T003359] БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ПРИЗНАКОВ

- А) вероятных
- Б) предположительных

В) сомнительных

Г) достоверных

[T003360] ПОЯВЛЕНИЕ МОЛОЗИВА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ПРИЗНАКОВ БЕРЕМЕННОСТИ

А) вероятных

Б) предположительных

В) сомнительных

Г) достоверных

101. [T003361] ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

А) размягчением перешейка матки

Б) размягчением тела матки

В) сокращением матки при пальпации

Г) асимметрией матки

102. [T003362] ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

А) асимметрии матки

Б) усиленном перегибе матки кпереди

В) размягчении перешейка матки

Г) сокращении матки при пальпации

103. [T003363] ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ ОСНОВАН НА РЕАКЦИИ МЕЖДУ

А) хорионическим гонадотропином в моче и антисывороткой

Б) прогестероном в крови и антисывороткой

В) эстрогеном и антисывороткой

Г) плацентарным лактогеном и антисывороткой

104. [T003364] ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 36 НЕДЕЛЬ ДНО МАТКИ

А) достигает мечевидного отростка

Б) на уровне пупка

В) на середине расстояния между пупком и лоном

Г) на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком

105. [T003365] ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДАТЫ РОДОВ У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ К ДАТЕ ПЕРВОГО ШЕВЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИБАВИТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ

А) 20

Б) 16

В) 18

Г) 22

106. [T003366] СИНТЕЗ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ПРОИСХОДИТ В

А) синцитиотрофобласте

Б) надпочечниках

В) гипофизе

Г) яичниках

[T003367] НАЧАЛО БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЕТСЯ С МОМЕНТА

А) оплодотворения яйцеклетки

Б) имплантации бластоцисты

В) деления зиготы

Г) продвижения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе

108. [T003368] РАБОЧЕЕ МЕСТО ЗА ЖЕНЩИНОЙ СОХРАНЯЕТСЯ

А) в течение трех лет после родов

Б) в течение года после родов

В) на период декретного отпуска

Г) в течение пяти лет после родов

109. [T003369] УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПОКАЗАНО ПРИ

А) несоответствии размеров матки и гестационного срока

Б) миоме матки

В) угрозе прерывания

Г) яичниковых образованиях

110. [T003370] РАСТЯЖКИ НА КОЖЕ У БЕРЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О

- А) недостаточной эластичности кожи
- Б) пониженной сопротивляемости организма
- В) достоверности беременности
- Г) избытке веса

111. [T003371] СРОК ГЕСТАЦИИ, ПРИ КОТОРОМ ПЛОД ДОСТИГАЕТ ДЛИНЫ 35 СМ И МАССЫ 1000 Г В НЕДЕЛЯХ

- А) 28
- Б) 26
- В) 35
- Г) 30

[T003372] КРОМЕ ЯИЧНИКОВ, ПРОГЕСТЕРОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ

- А) плацентой
- Б) гипофизом
- В) гипоталамусом
- Г) щитовидной железой

113. [T003373] ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОНИЦАЕМОСТИ СТенок СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) повышение
- Б) некоторое понижение
- В) существенное понижение
- Г) остается без изменений

114. [T003374] КАЖДАЯ ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА ТРИЖДЫ ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ СДАЕТ

- А) кровь на гемоглобин, СОЭ и лейкоциты
- Б) кровь на группу и резус-фактор
- В) мазки на скрытые инфекции
- Г) мазки на гормональную угрозу

115. [T003375] ТИПИЧНЫЕ ЖАЛОБЫ У БЕРЕМЕННОЙ В 1 ТРИМЕСТРЕ

- А) тошнота и изменение вкуса
- Б) головные боли и ухудшение зрения
- В) шевеление плода
- Г) отеки

116. [T003376] СВЕРТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) повышением
- Б) незначительным понижением
- В) остаются без изменений
- Г) значительным понижением

[T003377] ПРОГЕСТЕРОНОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) оксипрогестерона капронат
- Б) оксибутират натрия
- В) прогестерон
- Г) профази

118. [T003378] ОКРУЖНОСТЬ 33 СМ ПРИ ДИАМЕТРЕ 10 СМ ИМЕЕТ РАЗМЕР ГОЛОВКИ

- А) средний косо́й
- Б) прямой
- В) большой косо́й
- Г) малый косо́й

119. [T003508] ЖЕНСКИЙ ТАЗ СОСТОИТ ИЗ КОСТЕЙ

- А) двух тазовых, крестца и копчика
- Б) трех подвздошных
- В) двух лобковых
- Г) двух седалищных

120. [T003509] К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ОТНОСИТСЯ

- А) матка
- Б) уретра

В) клитор

Г) бартолиновые железы

121. [T003510] НАРУЖНЫЙ ЗЕВ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ ИМЕЕТ ФОРМУ

А) точечную

Б) щелевидную

В) т-образную

Г) серповидную

122. [T003511] ПРОГЕСТЕРОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

А) яичнике

Б) гипоталамусе

В) гипофизе

Г) матке

123. [T003512] СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ПОКРЫТА ЭПИТЕЛИЕМ

А) цилиндрическим мерцательным

Б) зародышевым

В) кубическим

Г) многослойным плоским

124. [T003513] ФОРМА ШЕЙКИ МАТКИ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ

А) коническая

Б) цилиндрическая

В) призматическая

Г) шарообразная

125. [T003514] ЭПИТЕЛИЙ, ВЫСТИЛАЮЩИЙ ВЛАГАЛИЩЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) многослойный плоский

Б) цилиндрический

В) кубический

Г) призматический мерцательный

126. [T003515] БАРТОЛИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТСЯ К

А) наружным половым органам женщин

Б) железам внутренней секреции женщин

В) внутренним половым органам женщин

Г) железам внутренней секреции мужчин

127. [T003516] В ПОЛОСТИ МАТКИ РЕАКЦИЯ СРЕДЫ

А) щелочная

Б) кислая

В) нейтральная

Г) слабокислая

128. [T003517] РЕАКЦИЯ ВЛАГАЛИЩНОЙ СРЕДЫ В НОРМЕ

А) кислая

Б) нейтральная

В) слабощелочная

Г) резкощелочная

129. [T003518] ОСНОВНОЙ СЛОЙ СЛИЗИСТОЙ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) базальный

Б) висцеральный

В) корковый

Г) ворсинчатый

130. [T003519] НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) периметрий

Б) параметрий

В) миометрий

Г) эндометрий

131. [T003520] ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ПРОИСХОДИТ

А) в маточной трубе

Б) в яичнике

В) в матке

Г) в брюшной полости

[T003521] ПАРАМЕТРАЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА ВЫПОЛНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО

- А) между листками широких связок
- Б) вокруг мочевого пузыря
- В) вокруг дугласова углубления
- Г) вокруг прямой кишки

133. [T003522] САМЫЙ ГЛУБОКИЙ СВОД ВЛАГАЛИЩА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) задний
- Б) передний
- В) боковой
- Г) средний

134. [T003523] МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ПОДХОДИТ К МАТКЕ НА УРОВНЕ

- А) внутреннего зева
- Б) наружного зева
- В) тубного угла
- Г) дна матки

135. [T003524] ЯИЧНИКОВАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ

- А) брюшной аорты
- Б) маточной артерии
- В) подвздошной артерии
- Г) срамной артерии

136. [T003525] БАРТОЛИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В

- А) толще больших половых губ
- Б) толще малых половых губ
- В) влагалище
- Г) шейке матки

137. [T003526] К ПЛОДОВЫМ ОБОЛОЧКАМ ОТНОСЯТСЯ

- А) ворсистая и водная
- Б) децидуальная и водная
- В) децидуальная и ворсистая
- Г) спонгиозная и компактная

138. [T003527] НОРМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПУПОВИНЫ РАВНА В САНТИМЕТРАХ

- А) 50
- Б) 30
- В) 70
- Г) 40

139. [T003528] ПУПОВИНА ВКЛЮЧАЕТ

- А) две артерии и одну вену
- Б) две вены и одну артерию
- В) одну вену и одну артерию
- Г) две вены и две артерии

[T003529] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ДО СРОКА В НЕДЕЛЯХ

- А) 12
- Б) 10
- В) 16
- Г) 14

141. [T003530] ЖЕЛТЫМ ТЕЛОМ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- А) прогестерон
- Б) пролактин
- В) окситоцин
- Г) вазопресин

142. [T003531] ОВУЛЯЦИЯ ПРИ 28 ДНЕВНОМ ЦИКЛЕ У ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИСХОДИТ В ДНЯХ

- А) 12-16
- Б) 3-5
- В) 6-9
- Г) 8-10

143. [T003532] ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН СТИМУЛИРУЕТ СЕКРЕЦИЮ

- А) прогестерона

- Б) эстрогенов
- В) андрогенов
- Г) эстриола

144. [T003533] В НОРМЕ СОЗРЕВАНИЕ ШЕЙКИ К РОДАМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОИСХОДИТ, НАЧИНАЯ С НЕДЕЛИ

- А) 38
- Б) 36
- В) 35
- Г) 34

145. [T003534] К ПРИДАТКАМ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ

- А) маточные трубы и яичники
- Б) шейка матки и яичники
- В) яичники и влагалище
- Г) шейка матки и влагалище

146. [T003535] ВО ВРЕМЯ СХВАТКИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИСХОДИТ

- А) ретракция, контракция мышечных волокон
- Б) расслабление миометрия
- В) неравномерное сокращение миометрия
- Г) сокращение нижнего сегмента матки

147. [T003536] МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗМА МАТЕРИ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) определение зрелости шейки матки
- Б) определение нахождения предлежащей части плода
- В) проведение пельвиометрии
- Г) измерение окружности живота

148. [T003537] ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 3 ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ

- А) наличия признаков отделения плаценты
- Б) состояния плода
- В) продолжительности 1 и 2 периода родов
- Г) величины и размеров последа

149. [T003538] ДВИЖЕНИЕ, СОВЕРШАЕМОЕ ГОЛОВКОЙ ПЛОДА В УЗКОЙ ПЛОСКОСТИ МАЛОГО ТАЗА ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) внутренний поворот
- Б) разгибание
- В) сгибание
- Г) дополнительное разгибание

150. [T003539] ДЕЛЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ЗА СЧЕТ

- А) пояса соприкосновения
- Б) контракционного кольца
- В) предлежащей пуповины
- Г) оболочек плодного яйца

151. [T003540] ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО ПОЛНОГО

- А) раскрытия маточного зева
- Б) раскрытия внутреннего зева
- В) излития околоплодных вод
- Г) сглаживания шейки матки

152. [T003541] ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО

- А) рождения последа
- Б) рождения плода
- В) рождения плаценты
- Г) излития околоплодных вод

153. [T003542] ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С

- А) рождения плода
- Б) появления последовых схваток
- В) появления кровянистых выделений
- Г) рождения последа

154. [T003544] В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ ВЫДЕЛЯЮТ ФАЗУ

- А) латентную
- Б) скрытую
- В) пассивную
- Г) торпидную

155. [T003545] ГОРМОН, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ В ЖЕЛТОМ ТЕЛЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) прогестерон
- Б) эстрадиол
- В) инсулин
- Г) окситоцин

156. [T003546] ГОРМОН, СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) окситоцин
- Б) фолликулин
- В) питуитрин
- Г) тестостерон

[T003547] ТАЗОВАЯ КОСТЬ СОСТОИТ ИЗ КОСТЕЙ

- А) подвздошной, седалищной и лобковой
- Б) крестца, копчика
- В) крестцового мыса, лобковой
- Г) бедренной, симфиза

158. [T003548] МЕТОД ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) всем беременным
- Б) только для женщин из группы высокого риска
- В) только женщинам с выраженным болевым симптомом
- Г) женщинам, находящимся в родзале

159. [T003550] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ БЕРЕМЕННОЙ НООБХОДИМО

- А) выбрать роддом и пройти курс дородовой подготовки
- Б) послушать истории родов своих знакомых
- В) прочитать учебник акушерства для специалистов
- Г) посетить несколько родов в родильном зале

160. [T003551] БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) белково-витаминная диета
- Б) ограничение белковой пищи
- В) преимущественно углеводно-жировая диета
- Г) ограничение овощей, фруктов

161. [T003552] ВИДЫ ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИН К РОДАМ

- А) лекции, беседы
- Б) тестирование
- В) конференции
- Г) семинары

162. [T003553] ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ПРИМЕНЯЮТ НЕЙРОЛЕПТИК

- А) дроперидол
- Б) динопрост
- В) дицинон
- Г) дексаметазон

163. [T003554] НЕНАРКОТИЧЕСКИМ АНАЛЬГЕТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) метамизол натрия (анальгин)
- Б) морфин
- В) промедол
- Г) омнопон

164. [T003555] ДЛЯ ПЕРИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) тримекаин
- Б) триквилар
- В) трилен
- Г) морфин

165. [T003556] КАКОЙ ИЗ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ

- А) эпидуральная анестезия
- Б) рефлексотерапия
- В) гидротерапия
- Г) аудиоанальгезия

166. [T003557] К НЕМЕДИКОМЕНТОЗНОМУ МЕТОДУ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ОТНОСИТСЯ

- А) массаж
- Б) эпидуральная анестезия
- В) ингаляционная анестезия
- Г) проводниковая анестезия

167. [T003558] КАКОЙ ИЗ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА

- А) физиопсихопрофилактика
- Б) эпидуральная анестезия
- В) психотропные средства
- Г) спазмолитики

168. [T003559] МЕТОД ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ БЫЛ РАЗРАБОТАН УЧЕНЫМ

- А) Вельвовским
- Б) Красовским
- В) Малиновским
- Г) Земмельвейсом

169. [T003560] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ БОЛЕЗНЕННОСТИ СХВАТОК ПРИМЕНЯЮТ

- А) спазмолитики
- Б) гемостатики
- В) антибиотики
- Г) простогландины

170. [T003561] НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ

- А) вводятся только по назначению врача и подлежат строгому учету
- Б) не угнетают дыхательный центр
- В) не применяются для обезболивания родов
- Г) не применяют после кесарева сечения

171. [T003562] РАСШИФРУЙТЕ АББРЕВИАТУРУ ГОМК

- А) гаммаоксимасляная кислота
- Б) аминокaproновая кислота
- В) этамзилат натрия
- Г) оксипрогестеронакапронат

172. [T003563] МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ СОН - ОТДЫХ ПОКАЗАН

- А) при длительных предвестниках и переутомлении
- Б) во втором периоде родов
- В) в раннем послеродовом периоде
- Г) всем роженицам без исключения

[T003564] БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ

- А) от медработников женской консультации
- Б) от знакомых
- В) из интернет-ресурсов
- Г) из литературных источников

174. [T003565] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СХВАТКАМИ В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2-3
- Б) 4-5
- В) 6-7
- Г) 8-9

175. [T003566] ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ АКУШЕРКЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ БЕСЕДУ О

- А) половой гигиене во время беременности
- Б) хромосомных заболеваниях
- В) пороках развития плода
- Г) заболеваниях детского возраста

176. [T003567] ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГРУДИ К КОРМЛЕНИЮ НУЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

- А) массаж груди
- Б) контрастный душ
- В) физиопроцедуры
- Г) смазывать соски детским кремом

177. [T003568] К ПРЕДВЕСТНИКАМ РОДОВ ОТНОСЯТСЯ

- А) безболезненные сокращения матки
- Б) отхождение околоплодных вод
- В) частые мочеиспускания
- Г) кровянистые выделения из половых путей

[T003569] В РОДАХ ВЫДЕЛЯЮТ

- А) последовый период
- Б) послеродовый период
- В) прелиминарный период
- Г) предвестники родов

179. [T003570] СВОЕВРЕМЕННОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРОИСХОДИТ

- А) при полном или почти полном открытии маточного зева
- Б) при образовании пояса прилегания
- В) при появлении потуг
- Г) при опущении головки плода в полость малого таза

180. [T003571] ПРИЗНАКОМ НАЧАЛА ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) регулярное сокращение матки
- Б) усиление шевеления плода
- В) отхождение околоплодных вод
- Г) появление кровянисто-слизистых выделений из половых путей

181. [T003572] ПРИЗНАКОМ ПРЕДВЕСТНИКОВ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) структурное изменение шейки матки
- Б) отхождение вод
- В) кровотечение
- Г) редкие схватки

182. [T003573] ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ПЕРВЫХ РОДАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ЧАСАХ

- А) 12-14
- Б) 5-6
- В) 24 - 26
- Г) 48 - 50

183. [T003575] СВОЕВРЕМЕННЫМ ДЛЯ ПЕРВЫХ РОДОВ СЧИТАЕТСЯ ОТХОЖДЕНИЕ ВОД ПРИ РАСКРЫТИИ ШЕЙКИ В САНТИМЕТРАХ

- А) 7-8
- Б) 3-4
- В) 5-6
- Г) 1-2

184. [T003576] ВТОРАЯ ФАЗА ПЕРИОДА РАСКРЫТИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) активной
- Б) латентной
- В) транзиторной
- Г) прелиминарной

185. [T003577] НАЧАЛОМ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

- А) появление регулярных схваток и сглаживание шейки матки
- Б) прижатие головки к входу в малый таз
- В) излитие околоплодных вод шейки
- Г) отхождение слизистой пробки

186. [T003578] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СХВАТОК В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 60
- Б) 50
- В) 40
- Г) 25

187. [T003579] СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

- А) создает защитную подушку для эмбриона
- Б) способствует питанию плода
- В) обеспечивает иммунологическую защиту
- Г) ограничивает свободу движений эмбриона

188. [T003580] УКРОЧЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) контракция
- Б) дистракция
- В) регургитация
- Г) ретракция

189. [T003581] СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МИОМЕТРИЯ СТИМУЛИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ ВЫРАБОТКИ

- А) простагландинов
- Б) прогестерона
- В) партусистема
- Г) парлодера

190. [T003582] ОЦК ПРИ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) увеличивается умеренно
- Б) уменьшается незначительно
- В) резко увеличивается
- Г) резко уменьшается

191. [T003583] К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ЖЕНЩИНЫ ОТНОСЯТ

- А) яичники, маточные трубы, матка, влагалище
- Б) влагалище, матка, мочевого пузырь
- В) яичники, мочеиспускательный канал, матка
- Г) матка, яичники, мочевого пузырь, влагалище

192. [T003584] В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- А) плакаты с принципами успешного грудного вскармливания
- Б) плакаты, рекламирующие детское питание
- В) бесплатные образцы искусственной смеси
- Г) плакаты, рекламирующие пустышки, соски

193. [T003585] ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРАВО ПРИСУТСТВИЯ НА РОДАХ ОТЦА РЕБЕНКА ИЛИ ИНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ

- А) № 323
- Б) № 572н
- В) № 574
- Г) № 678

194. [T003586] ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УКРЕПЛЕНИЮ СВЯЗИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ

- А) осторожно берет на руки, гладит, целует
- Б) держит ребенка на некотором расстоянии от себя
- В) пытается командовать ребенком
- Г) негативно высказывается в его адрес

195. [T003587] ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ПРИЛОЖИТЬ РЕБЕНКА К ГРУДИ

- А) сразу после родов
- Б) через 1 час
- В) через 2 час
- Г) через 1 день

196. [T003588] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ В КИЛОГРАММАХ

- А) 10-12
- Б) 5-6
- В) 7-8

Г) 13-14

197. [T003589] ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ПАЛАТЫ

- А) одно или двухместные
- Б) трех или четырехместные
- В) от четырехместных до пятиместных
- Г) от четырехместных до шестиместных

198. [T003590] ОСНОВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) тренирующее
- Б) противовоспалительное
- В) гипотензивное
- Г) иммуностимулирующее

199. [T003591] В РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ АКУШЕРКИ НА САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В МЕСЯЦ ОТВОДИТСЯ ЧАСОВ

- А) 4
- Б) 2
- В) 3
- Г) 1

200. [T003592] К ПИЩЕ, НАИБОЛЕЕ БОГАТОЙ БЕЛКАМИ ОТНОСЯТСЯ

- А) мясо
- Б) крупы
- В) овощи
- Г) мучные изделия

201. [T003593] К ПИЩЕ, НАИБОЛЕЕ БОГАТОЙ УГЛЕВОДАМИ ОТНОСЯТСЯ

- А) мучные изделия
- Б) мясо
- В) молочные продукты
- Г) овощи

202. [T003594] РАННЯЯ ВЫПИСКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА СПОСОБСТВУЕТ

- А) снижению заболеваемости внутрибольничными инфекциями
- Б) росту маститов у матери
- В) увеличению послеродовых осложнений
- Г) уменьшению лактостаза

203. [T003596] СРОКИ ВЫПИСКИ ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- А) состоянием здоровья матери и ребенка
- Б) только здоровьем матери
- В) только здоровьем ребенка
- Г) массой тела ребенка

204. [T003597] РОДСТВЕННИКИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПРИ РОДАХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В

- А) сменной одежде, халате, маске, обуви и бахилах
- Б) сменной одежде и сменной обуви
- В) обычной одежде и сменной обуви
- Г) в обычной одежде

205. [T003598] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) устранение психогенного компонента родовой боли
- Б) ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных
- В) разъяснение физиологической сущности родов и течения послеродового периода
- Г) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности и развитие плода

206. [T003599] ЛЕКЦИЯ О ВЛИЯНИИ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПЛОД ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О

- А) вреде курения, алкоголе и наркотиках
- Б) режиме дня
- В) гигиене
- Г) питанию

207. [T003601] РЕКОМЕНДУЕМАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ВО ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ В КАЛОРИЯХ

- А) 2500-3000
- Б) 1000-1500
- В) 1500-2000
- Г) 4000-4500

[T003606] РАССТРОЙСТВО ЭМОЦИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) апатией
- Б) амнезией
- В) анорексией
- Г) булиимией

209. [T003612] ПРОИЗВОЛЬНЫЙ СФИНКТЕР ПРЯМОЙ КИШКИ ОБРАЗОВАН

- А) мышцами диафрагмы таза
- Б) круговым слоем мышц стенки прямой кишки
- В) продольным слоем мышц стенки прямой кишки
- Г) подвздошно-поясничной мышцей

210. [T003613] НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ СФИНКТЕР ПРЯМОЙ КИШКИ ОБРАЗОВАН

- А) круговым слоем мышц стенки прямой кишки
- Б) подвздошно-поясничной мышцей
- В) продольным слоем мышц стенки прямой кишки
- Г) мышцами диафрагмы таза

211. [T003614] ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА В-12 РАЗВИВАЕТСЯ

- А) анемия
- Б) рахит
- В) цинга
- Г) дерматоз

212. [T003615] МИКРОФЛОРА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАСЩЕПЛЕНИЕ

- А) клетчатки
- Б) белков
- В) жиров
- Г) углеводов

213. [T003616] ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЖЕНЩИН ПРИЛЕЖИТ К

- А) шейке матки и влагалищу
- Б) прямой кишке
- В) сигмовидной кишке
- Г) слепой кишке

214. [T003617] МАССА МАТКИ В ГРАММАХ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- А) 40-50
- Б) 30-40
- В) 50-60
- Г) 60-70

215. [T003618] У РОЖАВШИХ ЖЕНЩИН МАССА МАТКИ В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ В ПРЕДЕЛАХ

- А) 80-90
- Б) 60-70
- В) 70-80
- Г) 90-100

216. [T003619] В РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ ЖЕНЩИНЫ ВХОДЯТ

- А) яичники, матка, маточные трубы, влагалище, вульва
- Б) влагалище, матка, мочевого пузырь
- В) яичники, мочеиспускательный канал, матка
- Г) матка, яичники, прямая кишка, влагалище

217. [T003620] ДЛЯ ГЕМОЛИЗА ХАРАКТЕРНО

- А) разрушение эритроцитов
- Б) склеивание эритроцитов
- В) оседание эритроцитов
- Г) выход эритроцитов из сосудов

218. [T003621] ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЫШЕ, ЧЕМ

ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ, МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ

- А) тромбоз
- Б) анемия
- В) кровотечения
- Г) гипоксия

219. [T003623] ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЫШЕ, ЧЕМ АКТИВНОСТЬ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ, ТО МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ

- А) кровотечения
- Б) тромбоз
- В) анемия
- Г) гипоксия

220. [T003626] ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СООТНОШЕНИЕМ

- А) различных видов лейкоцитов
- Б) различных видов клеток крови
- В) крови и плазмы
- Г) количество крови и массы тела

221. [T003628] ОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ЛЕГКИХ В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1000-1200
- Б) 500-700
- В) 1500-2000
- Г) 2000-2500

222. [T003629] К КОЛЕБЛЮЩИМСЯ РЕБРАМ ОТНОСЯТСЯ

- А) 11-12 пары
- Б) все ребра
- В) 1- 7 пары
- Г) 8-10 пары

223. [T003630] К ИСТИННЫМ РЕБРАМ ОТНОСЯТСЯ

- А) 1-7 пары
- Б) все ребра
- В) 8-10 пары
- Г) 11-12 пары

224. [T003631] ГЛАВНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МЫШЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) диафрагма
- Б) дельтовидная
- В) трапецевидная
- Г) ромбовидная

225. [T003632] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 36
- Б) 35
- В) 38
- Г) 39

226. [T003634] ТЕМПЕРАТУРА СМЕСИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ГРАДУСАХ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ

- А) 36-37
- Б) 34-35
- В) 22-24
- Г) 38-39

227. [T003635] ПРОФИЛАКТИКА ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) сон без подушки
- Б) частое пеленание
- В) вертикальное ношение на руках
- Г) кормление лежа в кроватке

228. [T003636] К ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ СОСАНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ

- А) валикообразное утолщение десен

Б) обильное слюнотечение

В) маленький язык

Г) сухость слизистой

229. [T003955] БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИНЫ В ДНЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СРЕДНЕМ

А) 280

Б) 220

В) 300

Г) 260

230. [T003956] СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) нарушение обоняния

Б) отсутствие менструации

В) увеличение молочных желез

Г) увеличение матки

231. [T003957] ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) увеличение матки

Б) появление пигментации

В) нарушение обоняния

Г) тошнота

232. [T003958] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) выслушивание сердцебиения плода

Б) рвота

В) размягчение перешейка матки

Г) отсутствие менструаций

233. [T003959] ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ ПУПКА ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

А) 24

Б) 20

В) 28

Г) 16

234. [T003960] ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЛОБКОМ И ПУПКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

А) 16

Б) 22

В) 28

Г) 24

235. [T003961] СИМПТОМ РАЗМЯГЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПЕРЕШЕЙКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ

А) Горвица-Гегара

Б) Пискачека

В) Снегирева

Г) Отта

236. [T003962] СИМПТОМ НЕРОВНОСТЕЙ КОНТУРОВ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ

А) Пискачека

Б) Снегирева

В) Горвица-Гегара

Г) Отто

237. [T003963] СИМПТОМ ЛЕГКОЙ ВОЗБУДИМОСТИ МАТКИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ

А) Снегирева

Б) Горвица-Гегара

В) Пискачека

Г) Отто

238. [T003964] НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЮТ

А) 25-28-31-20

Б) 22-25-28-18

В) 28-29-32-15

Г) 20-23-25-17

239. [T003965] ОТНОШЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ К ГОЛОВКЕ И ТУЛОВИЩУ ПЛОДА НАЗЫВАЕТСЯ

А) членорасположение

Б) позиция

В) вид

Г) положение

240. [T003966] ОТНОШЕНИЕ ОСИ ПЛОДА К ОСИ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) положение

Б) предлежание

В) позиция

Г) вид

241. [T003967] ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К БОКОВЫМ СТЕНКАМ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) позиция

Б) вид

В) предлежание

Г) вставление

242. [T003968] ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) вид

Б) позиция

В) предлежание

Г) членорасположение

243. [T003969] ОТНОШЕНИЕ КРУПНОЙ ЧАСТИ ПЛОДА КО ВХОДУ В ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ

А) предлежание

Б) положение

В) вид

Г) позиция

244. [T003970] ОТНОШЕНИЕ СТРЕЛОВИДНОГО ШВА ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ТАЗА НАЗЫВАЕТСЯ

А) вставление головки

Б) предлежание головки

В) разгибание головки

Г) сгибание головки

245. [T003971] ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ

А) высоту стояния дна матки

Б) предлежащую часть

В) позицию и вид плода

Г) вставление головки

246. [T003972] ВТОРОЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ

А) положение, позицию, вид плода

Б) предлежащую часть

В) высоту стояния дна матки

Г) вставление головки

247. [T003973] ТРЕТИЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ

А) предлежащую часть

Б) позицию

В) вид

Г) вставление головки

248. [T003975] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫМИ ТОЧКАМИ ГРЕБНЕЙ ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

А) 28-29

Б) 30-32

В) 25-26

Г) 20-21

[T003976] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ ЛОБКОВОГО СИМФИЗА И НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 20-21
- Б) 25-26
- В) 28-29
- Г) 30-31

250. [T003977] В НОРМЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕВЕРХНИМИ ОСТЯМИ ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 25-26
- Б) 30-31
- В) 20-21
- Г) 28-29

251. [T003978] ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОБА МОЧИ НА БЕРЕМЕННОСТЬ ОСНОВАНА НА ВЫЯВЛЕНИИ

- А) хорионического гонадотропина
- Б) белка
- В) ацетона
- Г) лейкоцитов

252. [T003979] ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- А) вероятных признаков беременности
- Б) сомнительных признаков беременности
- В) достоверных признаков беременности
- Г) предположительных признаков беременности

[T003980] ИСТИННАЯ КОНЬЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ РАВНЯЕТСЯ

- А) 11
- Б) 10
- В) 9
- Г) 13

254. [T003981] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИЖНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ТОЧКОЙ МЫСА НАЗЫВАЕТСЯ КОНЬЮГАТОЙ

- А) диагональной
- Б) истинной
- В) анатомической
- Г) наружной

255. [T003982] РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) наружной конъюгатой
- Б) индексом Соловьева
- В) истинной конъюгатой
- Г) диагональной конъюгатой

256. [T003983] ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИСТИННОЙ КОНЬЮГАТЫ НУЖНО

- А) от диагональной конъюгаты отнять 1,5-2 см
- Б) от наружной конъюгаты отнять 1,5-2 см
- В) к диагональной конъюгате прибавить 1,5-2 см
- Г) от диагональной конъюгаты отнять 9 см

257. [T003984] ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНЬЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ РАВНЯЕТСЯ

- А) 12,5-13
- Б) 11-11,5
- В) 9-10
- Г) 20-21

258. [T003985] ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НАРУЖНОЙ КОНЬЮГАТЫ ТАЗА ЖЕНЩИНА ЛЕЖИТ

- А) на боку с согнутой нижележащей ногой
- Б) на боку с согнутой вышележащей ногой
- В) на спине с вытянутыми ногами
- Г) на спине с согнутыми ногами

259. [T003986] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ПЛОДА ПО МЕТОДУ ЖОРДАНИЯ НЕОБХОДИМО

- А) умножить высоту стояния дна матки на окружность живота
- Б) разделить окружность живота на высоту стояния дна матки

В) от длины окружности живота отнять высоту стояния дна матки

Г) к окружности живота прибавить высоту стояния дна матки

[T003987] ПОВТОРНОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

А) 18

Б) 14

В) 20

Г) 22

261. [T003988] ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ПУПКОМ И МЕЧЕВИДНЫМ ОТРОСТКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

А) 32

Б) 34

В) 36

Г) 26

262. [T003989] ПЕРВОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

А) 20

Б) 24

В) 22

Г) 26

263. [T003990] ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ И ВИД ПЛОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО НОМЕР

А) 2

Б) 1

В) 3

Г) 4

264. [T003991] ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

А) вероятных признаков беременности

Б) сомнительных признаков беременности

В) достоверных признаков беременности

Г) предположительных признаков беременности

265. [T003992] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНВОЛЮЦИИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ РОДОВ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ

А) 6

Б) 2

В) 4

Г) 3

266. [T003993] СРОКИ ЗАКРЫТИЯ ВНУТРЕННЕГО ШЕЕЧНОГО ЗЕВА ПОСЛЕ РОДОВ В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ

А) 7

Б) 3

В) 14

Г) 20

267. [T003994] ПРИ ЛАКТОСТАЗЕ ПОКАЗАНО

А) активное кормление и сцеживание

Б) подавление лактомии

В) согревающий компресс

Г) физиолечение

268. [T003995] ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕНСТРУАЦИЙ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

А) вероятных признаков беременности

Б) предположительных признаков беременности

В) сомнительных признаков беременности

Г) достоверных признаков беременности

[T003996] ИСТИННУЮ КОНЬЮГАТУ НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО РАЗМЕРАМ

А) индекса Соловьева

Б) размера Франка

В) диагональной конъюгаты

Г) наружной конъюгаты

270. [T003997] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РОДИЛЬНИЦЕЙ ПОСЛЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ В ЧАСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2
- Б) 1
- В) 6
- Г) 24

271. [T003998] ЛОХИИ ОСТАЮТСЯ ЧИСТО КРОВЯНИСТЫМИ В ДНЯХ

- А) 2-3
- Б) 4-5
- В) 6-8
- Г) 8-10

272. [T003999] ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КРОВОПОТЕРИ В РОДАХ В ПРОЦЕНТАХ ОТ МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 0,5%
- Б) 0,6%
- В) 1%
- Г) 5%

273. [T004000] ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРИЗНАКА ОТДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДА ПО МЕТОДУ ШРЕДЕРА СЛЕДУЕТ

- А) определить изменение стояния высоты дна матки
- Б) надавить ребром ладони над лобком
- В) проверить пульсацию сосудов пуповины
- Г) предложить роженице подышать

274. [T004001] НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ РОДАХ ПЕРЕСЕКАТЬ ПУПОВИНУ

- А) после прекращения пульсации сосудов пуповины
- Б) сразу после рождения ребенка
- В) после отделения последа
- Г) после кормления ребенка

275. [T004002] ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ЖИВОТА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИЗВОДИТСЯ

- А) на уровне пупка
- Б) на уровне дна матки
- В) в положении стоя
- Г) в положении лежа на боку

276. [T004003] МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ НАБЛЮДАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- А) 36
- Б) 38
- В) 40
- Г) 32

277. [T004004] ВСТАВЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ

- А) стреловидного шва к мысу и симфизу
- Б) малого родничка к передней или задней стенке таза
- В) малого родничка к правой или левой стенке таза
- Г) большого родничка к правой или левой стенке таза

278. [T004005] АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН В КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

- А) 15-16
- Б) 5-6
- В) 9-10
- Г) 19-20

279. [T004006] ПРИ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ГОРМОН

- А) альфа-фетопротеин
- Б) плацентарный лактоген
- В) эстриол
- Г) прогестерон

280. [T004007] ПРИ АМНИОСКОПИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- А) цвет околоплодных вод
- Б) уродство плода
- В) биомеханический состав вод
- Г) наличие многоплодной беременности

281. [Т004008] НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕЙ НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА У БЕРЕМЕННЫХ В ГРАММАХ НА ЛИТР СЧИТАЕТСЯ

- А) 110
- Б) 100
- В) 102
- Г) 120

282. [Т004009] ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИБАВКА ЗА НЕДЕЛЮ В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 300-400
- Б) 100-200
- В) 500-600
- Г) 700-800

283. [Т004010] ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) судорожное сокращение икроножных мышц
- Б) головная боль
- В) тошнота
- Г) учащенное мочеиспускание

284. [Т004011] ПЕРЕД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЖИВОТ БЕРЕМЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ

- А) жировой эмульсией
- Б) эфиром
- В) спиртом
- Г) йодонатом

285. [Т004012] ПРИЗНАКОМ «ЗРЕЛОЙ» ШЕЙКИ МАТКИ НАКАНУНЕ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) укорочение шейки до 1 см
- Б) длина шейки 3 см
- В) отклонение шейки кзади
- Г) проходимость наружного зева для кончика пальца

286. [Т004013] ДЕКСАМЕТАЗОН ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) для профилактики респираторных расстройств новорожденного
- Б) для профилактики осложнений всех беременных
- В) для профилактики кровотечения во втором периоде родов
- Г) для лечения аномалий родовых сил

287. [Т004014] ОСМОТР РОДОВЫХ ПУТЕЙ ПОСЛЕ РОДОВ ПРОВОДИТСЯ

- А) всем женщинам
- Б) только первородящим
- В) только повторнородящим
- Г) только женщинам из группы риска

288. [Т004015] УДЛИНЕНИЕ НАРУЖНОГО ОТРЕЗКА ПУПОВИНЫ НА 10 СМ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- А) Альфельда
- Б) Шредера
- В) Кюстнера-Чукалова
- Г) Гентера

[Т004016] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В ЧАСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2
- Б) 12
- В) 24
- Г) 6

290. [Т004017] РОДОВЫЕ ПУТИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

- А) костный таз, матку, влагалище, мышцы тазового дна
- Б) матку, мышцы тазового дна, пристеночные мышцы таза
- В) матку, влагалище, мышцы тазового дна

Г) Тело матки, нижний сегмент матки, влагалище

291. [T004018] УКАЖИТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА

А) продольное, поперечное, косое

Б) косое и поперечное

В) головное и тазовое

Г) переднее и заднее

292. [T004020] ПЛОСКОСТЬ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ

А) верхний внутренний край симфиза, безымянные линии, крестцовый мыс

Б) середину внутренней поверхности симфиза, безымянные линии, крестцовый мыс

В) верхний край симфиза, безымянные линии, первый крестцовый позвонок

Г) нижний край симфиза, подвздошные ямки, крестцовый мыс

293. [T004021] ЧЕРЕЗ СЕДАЛИЩНЫЕ БУГРЫ ПРОХОДИТ

А) поперечный размер плоскости выхода из малого таза

Б) поперечный размер плоскости узкой части полости малого таза

В) поперечный размер плоскости широкой части полости малого таза

Г) прямой размер плоскости узкой части полости малого таза

294. [T004022] МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ПРОХОДИТ МЕЖДУ НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫМИ ТОЧКАМИ

А) венечного шва

Б) теменных бугров

В) лобных бугров

Г) височных костей

295. [T004031] ПЕРЕХОД ОДНОГО ВИДА ТКАНИ В ДРУГОЙ, РОДСТВЕННЫЙ ЕЙ ВИД ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

А) метаплазия

Б) организация

В) гиперплазия

Г) регенерация

296. [T004034] РЕГЕНЕРАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

А) восстановлением структуры элементов ткани

Б) снижением массы органа или ткани

В) увеличением массы органа или ткани

Г) увеличением количества клеток

297. [T004036] ГИПЕРПЛАЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

А) увеличением количества клеток

Б) увеличением массы органа или ткани

В) восстановлением структуры элементов ткани

Г) снижением массы органа или ткани

298. [T004038] ГИПЕРЕМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

А) увеличением кровенаполнения ткани

Б) воспалением ткани

В) уменьшением кровенаполнения ткани

Г) нарушением восстановления структур ткани

299. [T004039] В КОЖЕ НОВОРОЖДЕННОГО ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ВИТАМИН

А) D

Б) A

В) B

Г) C

300. [T004041] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ НЕДОКОРМА У НОВОРОЖДЕННОГО СЛЕДУЕТ

А) провести контрольное кормление

Б) докармливать кашей

В) допаивать кипяченой водой

Г) ввести прикорм

301. [T004042] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПРЕЛОСТЕЙ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

А) гигиенический уход

Б) кормление «по требованию»

В) тугое пеленание

Г) измерение температуры тела

[T004043] ПАТРОНАЖ, НА КОТОРОМ МАТЬ ГОТОВЯТ К ДОСТАТОЧНОЙ ЛАКТАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) второй дородовый

Б) первый дородовый

В) первичный врачебно-сестринский

Г) целевой патронаж

303. [T004046] НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ПРАКТИКОЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

А) сочетание различных форм физической подготовки

Б) баня

В) плавание

Г) ходьба

304. [T004047] ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К РОДАМ ПОКАЗАНА ЖЕНЩИНАМ

А) всем, опираясь на индивидуальные особенности каждой женщины

Б) всем без исключения

В) по желанию

Г) по особым показаниям

305. [T004150] БИОМЕХАНИЗМ РОДОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

А) сгибание и внутренний поворот головки

Б) запрокидывание ручек

В) дополнительный внутренний поворот плечиков

Г) запрокидывание головки кзади

306. [T004151] ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРИОДОМ

А) изгнания

Б) раскрытия

В) прелиминарным

Г) предвестниковым

307. [T004152] ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА

А) полного раскрытия шейки матки

Б) начала потужных схваток

В) отхождения вод

Г) появления схваток через 3 минуты по 40 сек

308. [T004153] АУСКУЛЬТАЦИЯ ПЛОДА ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПРИ ГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРОВОДИТСЯ

А) чуть ниже пупка со стороны позиции

Б) над лобком

В) выше пупка

Г) на уровне пупка

309. [T004154] ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ВТОРЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) внутренний поворот головки

Б) сгибание головки

В) разгибание головки

Г) дополнительное сгибание головки

310. [T004155] ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) малый родничок

Б) большой родничок

В) подзатылочная ямка

Г) переносица

311. [T004156] ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) сгибание головки

Б) разгибание головки

В) дополнительное сгибание головки

Г) внутренний поворот головки

312. [T004157] ТОЧКА, ВОКРУГ КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ РАЗГИБАНИЕ ИЛИ СГИБАНИЕ

ГОЛОВКИ ПРИ БИОМЕХАНИЗМЕ РОДОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) точкой фиксации
- Б) проводной
- В) ведущей
- Г) точкой отсчета

313. [Т004158] СОВОКУПНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КОТОРОЕ СОВЕРШАЕТ ПЛОД ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАЗ И РОДОВЫЕ ПУТИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) биомеханизмом родов
- Б) асинклитизмом
- В) конфигурацией головки
- Г) течением родов

314. [Т004159] ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ СЕРДЦЕБИЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ

- А) после каждой потуги
- Б) через каждые 15 минут
- В) через каждые 10 минут
- Г) через каждые 5 минут

315. [Т004160] ВО ВРЕМЯ ПОТУГ ХАРАКТЕРНО

- А) повышение внутрибрюшного давления
- Б) уменьшение внутрибрюшного давления
- В) расслабление мышц брюшного пресса
- Г) расслабление мышц тазового дна

316. [Т004161] ПОД ПОЗИЦИЕЙ ПЛОДА ПОНИМАЕТСЯ

- А) отношение спинки плода к боковым стенкам матки
- Б) отношение головки плода к входу в таз
- В) отношение оси плода к длиннику матки
- Г) взаимоотношение различных частей плода

317. [Т004162] В НОРМЕ ПОТУГИ ДОЛЖНЫ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ГОЛОВКИ ПЛОДА

- А) не выше узкой части полости малого таза
- Б) в широкой полости таза
- В) в плоскости входа в малый таз
- Г) над входом в малый таз

318. [Т004164] ПРАВЫМ КОСЫМ РАЗМЕРОМ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

- А) правым крестцово-подвздошным сочленением и левым подвздошно-лобковым бугорком
- Б) верхним краем лобкового симфиза и мысом
- В) левым крестцово-подвздошным сочленением и правым подвздошно-лобковым бугорком
- Г) наиболее отдаленными точками безымянных линий

319. [Т004165] ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ УЗКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 10,5
- Б) 11
- В) 13
- Г) 12,5

320. [Т004166] ЛЕВЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 12
- Б) 11
- В) 13
- Г) 10,5

321. [Т004168] ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ШИРОКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 12,5
- Б) 11
- В) 13
- Г) 10,5

322. [Т004169] ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 11
- Б) 12,5
- В) 13
- Г) 9

323. [Т004170] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВЫСЛУШИВАНИЯМИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПРИ ЦЕЛОМ ПЛОДНОМ ПУЗЫРЕ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 15-20
- Б) 20-30
- В) 5-10
- Г) 30-40

324. [Т004171] БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) теменными буграми
- Б) границей волосистой части лба и затылочным бугром
- В) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- Г) наиболее отдаленными точками венечного шва

325. [Т004172] ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) серединой большого родничка и подъязычной костью
- Б) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- В) теменными буграми
- Г) затылочным бугром и подбородком

326. [Т004174] ПРЯМОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) переносицей и затылочным бугром
- Б) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- В) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- Г) серединой большого родничка и подъязычной костью

327. [Т004175] МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 9,5
- Б) 10,5
- В) 12
- Г) 11

328. [Т004176] РАССТОЯНИЕ ОТ ПЕРЕНОСИЦЫ ДО ЗАТЫЛОЧНОГО БУГРА ГОЛОВКИ ПЛОДА НАЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ

- А) прямым
- Б) средним косым
- В) малым косым
- Г) вертикальным

329. [Т004177] СРЕДНИЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 10-10,5
- Б) 11-11,5
- В) 12-12,5
- Г) 13-13,5

330. [Т004178] РАССТОЯНИЕ ОТ СЕРЕДИНЫ БОЛЬШОГО РОДНИЧКА ГОЛОВКИ ПЛОДА ДО ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ

- А) вертикальным
- Б) малым косым
- В) прямым
- Г) большим косым

331. [Т004179] МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) наиболее отдаленными точками венечного шва
- Б) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- В) теменными буграми
- Г) переносицей и затылочным бугром

332. [Т004180] БОЛЬШОЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) подбородком и затылочным бугром
- Б) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- В) наиболее отдаленными точками венечного шва
- Г) теменными буграми

333. [T004181] МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 8
- Б) 11
- В) 13
- Г) 12

334. [T004182] МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- А) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- Б) переносицей и затылочным бугром
- В) серединой большого родничка и подъязычной костью
- Г) затылочным бугром и подбородком

335. [T004183] ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ МЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) внутренний поворот головки кпереди
- Г) внутренний поворот головки затылком кзади

336. [T004184] ЧЕТВЕРТЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наружный поворот головки, внутренний поворот плечиков
- Б) внутренний поворот головки
- В) сгибание
- Г) разгибание головки

337. [T004185] ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ

- А) малым косым размером
- Б) малым поперечным размером
- В) большим поперечным размером
- Г) большим косым размером

338. [T004186] ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ

- А) средним косым размером
- Б) малым косым размером
- В) большим косым размером
- Г) прямым размером

[T004187] РОЖЕНИЦЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТУЖИТЬСЯ

- А) при прорезывании теменных бугров
- Б) при наружном повороте головки
- В) после рождения головки
- Г) при положительных признаках отделения последа

340. [T004188] БИОМЕХАНИЗМОМ РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) совокупность движений плода по родовому каналу
- Б) врезывание головки плода
- В) поворот плода «на ножку»
- Г) внутренний поворот головки

341. [T004189] ЗАЩИТУ ПРОМЕЖНОСТИ ПРОВОДЯТ В ПЕРИОДЕ

- А) изгнания плода
- Б) раннем послеродовом
- В) рождения последа
- Г) раскрытия шейки матки

342. [T004190] РАЗМЕР, В КОТОРОМ ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС ПЛОДА, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) прямой

- Б) правый косой
- В) левый косой
- Г) прямой и поперечный

343. [T004191] ГРАНИЦАМИ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) верхний край симфиза, безымянная линия, мыс
- Б) проекции вертлужных впадин, середина крестца
- В) низ симфиза, седалищные ости, мыс
- Г) низ симфиза, седалищные бугры, край копчика

344. [T004192] К НАРУЖНОМУ СЛОЮ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ АППАРАТ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ОТНОСЯТСЯ МЫШЦЫ

- А) седалищно-пещеристые
- Б) лобково-копчиковые
- В) подвздошно- копчиковые
- Г) седалищно- копчиковые

345. [T004193] К ФИКСИРУЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ

- А) крестцово-маточные
- Б) широкие
- В) воронко-тазовые
- Г) круглые

346. [T004194] К ПОДВЕШИВАЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ

- А) круглые
- Б) крестцово-маточные
- В) пузырьно-маточные
- Г) кардинальные

347. [T004195] МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ

- А) внутренней подвздошной артерии
- Б) аорты
- В) половой артерии
- Г) наружной подвздошной артерии

348. [T004196] ПЯТЫМ МОМЕНТОМ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) освобождение плечевого пояса и рождение туловища
- Б) бережное выведение головки вне потуг
- В) регулирование потуг
- Г) рассечение промежности

349. [T004197] ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) внутренний поворот головки
- Г) внутренний поворот плечиков

350. [T004198] ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛИВШЕГОСЯ ПОСЛЕДА ПРИМЕНЯЮТ СПОСОБ

- А) Абуладзе
- Б) Шредера
- В) Довженко
- Г) Малиновского

351. [T004199] ПРИ ОСМОТРЕ ПОСЛЕДА НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ЦЕЛОСТНОСТИ

- А) плаценты и оболочек
- Б) только долек плаценты
- В) только оболочек
- Г) краев плаценты

[T004200] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВЫСЛУШИВАНИЯМИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПОСЛЕ ОТХОЖДЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5-10
- Б) 15-20
- В) 20-30
- Г) 30-40

353. [T004201] ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА В НОРМЕ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 120-160
- Б) 100-110
- В) 170-180
- Г) 105-110

354. [Т004202] ТРЕТЬИМ МОМЕНТОМ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) уменьшение напряжения промежности в период прорезывания и рождения теменных бугров
- Б) освобождение плечевого пояса и рождение туловища
- В) защита малых половых губ от разрыва
- Г) защита клитора от разрыва

355. [Т004203] С ПОМОЩЬЮ ЧЕТВЕРТОГО ПРИЕМА ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО В МАТКЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- А) отношение предлежащей части к входу в малый таз
- Б) отношение предлежащей части к плоскостям малого таза
- В) массу плода
- Г) положение, позицию плода

356. [Т004204] ПОТУГИ ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПОВТОРЯЮТСЯ КАЖДЫЕ 2-3 МИНУТЫ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 50-60
- Б) 30-40
- В) 20-30
- Г) 15-20

357. [Т004205] ВО ВТОРОМ МОМЕНТЕ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ АКУШЕРКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- А) бережное выведение головки из половой щели вне потуг
- Б) защиту промежности
- В) регулирование потуг
- Г) освобождение плечевого пояса и рождение туловища

358. [Т004209] СХОЖИМИ МОМЕНТАМИ МЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ВИДАХ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) сгибание головки
- Б) разгибание головки
- В) боковое сгибание в поясничном отделе
- Г) боковое сгибание в шейно-грудном отделе

359. [Т004210] ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

- А) полным раскрытием маточного зева
- Б) рождением ребенка
- В) рождением последа
- Г) прорезыванием головки плода

360. [Т004211] АКУШЕРСКОЕ ПОСОБИЕ В РОДАХ НАЧИНАЮТ ОКАЗЫВАТЬ

- А) при прорезывании головки плода
- Б) после рождения головки плода
- В) после рождения плечиков плода
- Г) при угрозе разрыва промежности

[Т004212] СПОСОБ АБУЛАДЗЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

- А) наличии признаков отделения плаценты и отсутствии самостоятельного рождения последа
- Б) кровотечении из влагалища
- В) задержки в матке дольки плаценты
- Г) задержки в матке оболочек

[Т004213] ПОСЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ

- А) рождения плода
- Б) отделения плаценты
- В) пересечения пуповины плода
- Г) рождения плечиков

363. [Т004214] ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ С ЦЕНТРА НАЗВАНО СПОСОБОМ

- А) Шульца
- Б) Дункана
- В) Шредера
- Г) Гентера

364. [T004215] ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ С КРАЯ НАЗВАНО СПОСОБОМ

- А) Дункана
- Б) Шредера
- В) Гентера
- Г) Шульца

365. [T004216] ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО

- А) темпу сглаживания и раскрытия шейки матки
- Б) частоте и продолжительности схваток
- В) времени излития околоплодных вод
- Г) длительности родов

366. [T004217] ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ТРЕТЬИМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) разгибание головки
- Б) сгибание головки
- В) внутренний поворот головки
- Г) внутренний поворот плечиков

367. [T004218] МАЛЫЙ РОДНИЧОК ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ

- А) переднем виде затылочного предлежания
- Б) заднем виде затылочного предлежания
- В) лобном предлежании
- Г) переднетеменном предлежании

368. [T004219] ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ

- А) наличия признаков отделения плаценты
- Б) длительности первого периода родов
- В) длительности второго периода родов
- Г) длительности безводного периода

369. [T004220] САМОЙ ВАЖНОЙ ТЕМОЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) физиология родов
- Б) внутриутробное развитие плода
- В) медикаментозное обезболивание родов
- Г) уход за новорожденным

370. [T004221] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ЗАНЯТИЙ ПРИ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ СЧИТАЮТСЯ

- А) групповые занятия
- Б) индивидуальные занятия
- В) самостоятельное самообучение
- Г) занятия он-лайн

371. [T004229] ДОЛЖНЫ ЛИ В ПСИХОПРОФИЛАКТИКУ ВХОДИТЬ ЛЕКЦИИ О ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ

- А) должны
- Б) нет, важно думать о родах
- В) все вопросы надо решать по мере поступления
- Г) грудное вскармливание это естественный процесс он не требует подготовки

372. [T004383] ПЕРВЫЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 10-12
- Б) 20-22
- В) 23-25
- Г) 26-28

373. [T004384] ВТОРОЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 30-32
- Б) 32-40
- В) 20-22
- Г) 22-24

374. [T004385] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ В НЕДЕЛЯХ

БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 40
- Б) 32
- В) 24
- Г) 18

375. [Т004386] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ В МЕСЯЦАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1
- Б) 4
- В) 6
- Г) 8

376. [Т004387] ПОРОКИ РАЗВИТИЯ МАКСИМАЛЬНО ФОРМИРУЮТСЯ В ПЕРИОД

- А) эмбриональный
- Б) плацентарный
- В) интранатальный
- Г) постнатальный

377. [Т004388] АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ ПРОИСХОДИТ В ПЕРИОД

- А) новорожденности
- Б) внутриутробный
- В) грудной
- Г) пубертатный

378. [Т004389] ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ С НОРМАЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) I
- Б) II
- В) III
- Г) IV

379. [Т004390] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 7
- Б) 3
- В) 5
- Г) 10

380. [Т004391] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗДНЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В ДНЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- А) с 7-го по 28-й
- Б) с 5-го по 15-й
- В) с 7-го по 20-й
- Г) с 10-го по 30-й

381. [Т004392] СРЕДНЯЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 3000-3500
- Б) 2000-2500
- В) 2500-3000
- Г) 3500-4000

382. [Т004393] СРЕДНЯЯ ДЛИНА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 50-54
- Б) 55-59
- В) 46-49
- Г) 42-45

383. [Т004394] МИНИМАЛЬНАЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2500
- Б) 2000
- В) 2300
- Г) 2700

384. [T004395] МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 46
- Б) 47
- В) 49
- Г) 50

385. [T004396] ПРИЗНАКОМ ДОНОШЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) лицевая часть мала по сравнению с мозговой
- Б) морщинистая кожа
- В) половая щель зияет
- Г) писклявый крик

[T004397] У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) громкий крик
- Б) низкое расположение пупочного кольца
- В) мышечная гипотония
- Г) непропорциональное телосложение

387. [T004398] ГЕСТАЦИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 38 – 42
- Б) 28 – 30
- В) 32 – 34
- Г) 35 – 37

388. [T004399] ОЦЕНКА ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР В БАЛЛАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 8 – 10
- Б) 2 – 4
- В) 5 – 7
- Г) 10 – 12

[T004400] ПУШКОВЫЕ ВОЛОСЫ НА ТЕЛЕ НОВОРОЖДЕННОГО НАЗЫВАЮТСЯ

- А) лануго
- Б) стридор
- В) склерема
- Г) себорея

390. [T004401] ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЛАТ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) циклично
- Б) хаотично
- В) по половому признаку
- Г) по шкале Апгар

391. [T004402] ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСЛОЖНЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВОДИТЬ

- А) в родильном зале
- Б) после перевода в послеродовое отделение
- В) через 6 часов после родов
- Г) на вторые сутки после родов

392. [T004403] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) тетрациклиновую мазь
- Б) фурацилин
- В) хлорид натрия
- Г) полиглюкин

393. [T004404] СКОБКА НА ПУПОВИНУ ОТ ГРАНИЦЫ КОЖИ НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА РАССТОЯНИИ

- А) 1 см
- Б) 5 мм
- В) 1 мм
- Г) 3 см

394. [T004406] ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ СРАЗУ ПОСЛЕ РОДОВ

ПРИВОДИТ К

- А) получению материнской микробной флоры
- Б) ранней эпителизации пупочной ранки
- В) исчезновению физиологической эритемы
- Г) нормализации дыхания

395. [T004407] ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 40-60
- Б) 16-20
- В) 30-35
- Г) 100-120

[T004408] ДЫХАНИЕ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК

- А) аритмичное поверхностное
- Б) ритмичное глубокое
- В) ритмичное поверхностное
- Г) аритмичное глубокое

397. [T004409] К ОСОБЕННОСТЯМ СТРОЕНИЯ ПОЛОСТИ НОСА НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСЯТСЯ ПРИЗНАКИ

- А) носовые ходы узкие, хорошая васкуляризация
- Б) носовые ходы узкие, слабая васкуляризация
- В) носовые ходы широкие, хорошая васкуляризация
- Г) носовые ходы широкие, слабая васкуляризация

398. [T004410] ДЛЯ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНА ОСОБЕННОСТЬ

- А) короткая и широкая
- Б) короткая и узкая
- В) длинная и широкая
- Г) длинная и узкая

399. [T004411] ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ

- А) 120-140
- Б) 110-120
- В) 90-100
- Г) 70-80

400. [T004412] АПНОЭ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) остановкой дыхания
- Б) остановкой сердца
- В) общим цианозом
- Г) приступом судорог

401. [T004413] ДЛЯ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ НОВОРОЖДЕННОГО ХАРАКТЕРНЫ ОСОБЕННОСТИ

- А) хорошо развиты
- Б) не сформированы
- В) не имеют протоков
- Г) развиты, но не функционируют

402. [T004414] У НОВОРОЖДЕННОГО ПЛОХО РАЗВИТА ФУНКЦИЯ КОЖИ

- А) защитная
- Б) дыхательная
- В) выделительная
- Г) образовательная

403. [T004415] У ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ВСЕГДА ОТКРЫТ РОДНИЧОК

- А) большой
- Б) малый
- В) правый боковой
- Г) левый боковой

404. [T004416] У НОВОРОЖДЕННОГО ОТМЕЧАЕТСЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

- А) гипертония мышц-сгибателей
- Б) гипертония мышц-разгибателей
- В) гипотония мышц-сгибателей
- Г) гипотония мышц-разгибателей

405. [T004417] КАРДИАЛЬНЫЙ СФИНКТЕР НОВОРОЖДЕННОГО РАЗВИТ

- А) плохо
- Б) хорошо
- В) очень хорошо
- Г) удовлетворительно

406. [T004418] ПРОНИЦАЕМОСТЬ КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО

- А) высокая
- Б) незначительная
- В) слабая
- Г) не выражена

407. [T004419] СКЛОННОСТЬ ДЕТЕЙ К СРЫГИВАНИЮ ОБУСЛОВЛЕНА

- А) слабым развитием кардиального сфинктера
- Б) хорошим развитием кардиального сфинктера
- В) слабым развитием пилорического сфинктера
- Г) хорошим развитием пилорического сфинктера

408. [T004420] ФАКТОРАМИ, ОБЛЕГЧАЮЩИМИ СОСАНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) комочки Биша, большой язык
- Б) комочки Биша, маленький язык
- В) обильное слюнотечение, большой язык
- Г) обильное слюнотечение, маленький язык

409. [T004421] ЕМКОСТЬ ЖЕЛУДКА НОВОРОЖДЕННОГО В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 30-35
- Б) 50-55
- В) 100-155
- Г) 250-300

410. [T004422] ЕМКОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИЛЛИЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 30-50
- Б) 50-70
- В) 70-80
- Г) 80-100

411. [T004423] К ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ ПРИЗНАК

- А) малая воздушность
- Б) большое количество альвеол
- В) мало соединительной ткани
- Г) много эластической ткани

412. [T004424] ЧИСЛО МОЧЕИСПУСКАНИЙ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ

- А) 20-25
- Б) 15-20
- В) 8-10
- Г) 6-8

[T004425] СЕРДЦЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) горизонтальное
- Б) с наклоном влево
- В) с наклоном вправо
- Г) вертикальное

414. [T004426] КОСТНАЯ ТКАНЬ НОВОРОЖДЕННОГО

- А) склонна к деформации
- Б) плохо кровоснабжена
- В) содержит мало воды
- Г) бедна органическими веществами

415. [T004427] ОСОБЕННОСТЬЮ ПОЗВОНОЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отсутствие изгибов
- Б) шейный лордоз
- В) грудной кифоз
- Г) поясничный лордоз

[T004428] ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УБЫЛЬ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО НАБЛЮДАЕТСЯ В

ДНИ ЖИЗНИ

А) 3-4-й

Б) 5-6-й

В) 1-2-й

Г) 7-8-й

417. [T004429] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ УБЫЛЬ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ В % ДО

А) 8

Б) 14

В) 20

Г) 30

418. [T004430] СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ

А) 7-10

Б) 3-4

В) 15-20

Г) 25-30

419. [T004431] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЫ В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ

А) 3-4

Б) 1-2

В) 5-6

Г) 7-8

420. [T004432] ПОЛОВОЙ КРИЗ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ

А) увеличением грудных желез

Б) повышением температуры тела

В) увеличением массы тела

Г) снижением температуры тела

421. [T004433] СРОКИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОЛОВОГО КРИЗА У НОВОРОЖДЕННОГО В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЮТ

А) 2-3

Б) 3-4

В) 5-6

Г) 6-7

422. [T004434] ПРИЧИНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ УБЫЛИ МАССЫ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

А) потеря жидкости

Б) разрушение эритроцитов

В) накопление билирубина в крови

Г) перестройка обменных процессов

423. [T004435] ПРИЧИНОЙ ПОЛОВОГО КРИЗА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

А) переход гормонов матери к ребенку

Б) перестройка обменных процессов

В) разрушение эритроцитов

Г) потеря жидкости

424. [T004436] СРОКИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ В ДНЯХ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЮТ

А) 10-12-й

Б) 7-8-й

В) 5-6-й

Г) 3-4-й

425. [T004437] ПРОЯВЛЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

А) желтушное окрашивание кожи

Б) вялость

В) темное окрашивание мочи

Г) отказ от груди

426. [T004438] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЯМ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ

- А) половой криз
- Б) метеоризм
- В) диарея
- Г) гипертонус мышц

427. [T004439] ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ НОВОРОЖДЕННЫХ В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 22 – 24
- Б) 20 – 21
- В) 18 – 19
- Г) 24 – 25

428. [T004440] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5 – 7
- Б) 1 – 4
- В) 8 – 11
- Г) 12 - 15

429. [T004441] ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ВАННА НОВОРОЖДЕННОМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДИТСЯ

- А) ежедневно
- Б) через день
- В) через три дня
- Г) по мере необходимости

430. [T004442] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПРЕЛОСТЕЙ СКЛАДКИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО ОБРАБАТЫВАЮТ

- А) стерильным растительным маслом
- Б) физиологическим раствором
- В) раствором фурацилина
- Г) раствором альбуцида

431. [T004443] ВО ВРЕМЯ УТРЕННЕГО ТУАЛЕТА НОВОРОЖДЕННОГО ГЛАЗА ОБРАБАТЫВАЮТ

- А) кипяченой водой
- Б) ретинолом
- В) раствором альбуцида
- Г) перекисью водорода

432. [T004445] ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НОСОВЫХ ХОДОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) ватные жгутики, смоченные растительным маслом
- Б) сухие ватные жгутики
- В) ватные шарики
- Г) марлевые шарики

433. [T004446] ПОЛОСТЬ РТА ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ ПРОТИРАЮТ

- А) только при крайней необходимости
- Б) один раз в день
- В) три раза в день
- Г) после каждого кормления

434. [T004447] МЕКОНИЙ ВЫДЕЛЯЕТСЯ У НОВОРОЖДЕННОГО

- А) в первые 2-3 дня
- Б) в течение первой недели
- В) до 2 недель жизни
- Г) в течение первого месяца жизни

435. [T004448] ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) сухие ватные жгутики - турунды
- Б) жгутики, смазанные стерильным маслом
- В) марлевые шарики
- Г) жгутики с фурацилином

436. [T004449] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 37
- Б) 38

- В) 35
Г) 40
- 437. [T004450] ПОСЛЕ КУПАНИЯ КОЖУ НОВОРОЖДЕННОГО ОБРАБАТЫВАЮТ**
А) стерильным растительным маслом
Б) фурацилином
В) фукарцином
Г) спиртовым раствором
- 438. [T004451] ПАТРОНАЖ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ОБУЧАЮТ МАМУ УХОДУ ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ НАЗЫВАЕТСЯ**
А) первый врачебно-сестринский
Б) первый дородовый
В) второй дородовый
Г) целевой патронаж
- 439. [T004452] ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ПРОВОДИТСЯ НА ДЕНЬ ЖИЗНИ**
А) 3 – 7
Б) 1 – 3
В) 8 – 12
Г) 15 – 19
- 440. [T004453] ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ БЦЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ**
А) туберкулеза
Б) дифтерии
В) коклюша
Г) кори
- 441. [T004454] ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ МЕСТНАЯ РЕАКЦИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ**
А) 4 – 6 недель
Б) 2 – 3 дня
В) 2 – 3 месяца
Г) 6 – 8 месяцев
- 442. [T004455] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ПРОВОДИТСЯ**
А) в первые 12 часов жизни
Б) на 3 – 7 день
В) на 8 – 12 день
Г) на 15 – 19 день
- 443. [T004456] ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ВВОДИТСЯ НОВОРОЖДЕННОМУ**
А) внутримышечно в бедро
Б) внутрикожно в плечо
В) подкожно в предплечье
Г) внутримышечно в ягодицу
- 444. [T004457] ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА НОВОРОЖДЕННЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ**
А) кровь
Б) меконий
В) мочу
Г) слюну
- 445. [T004458] НОВОРОЖДЕННОМУ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ ВСКАРМЛИВАНИЕ**
А) естественное
Б) смешанное
В) искусственное
Г) парентеральное
- 446. [T004459] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ГРУДНОГО МОЛОКА ПЕРЕД КОРОВЬИМ ЯВЛЯЕТСЯ**
А) оптимальное соотношение пищевых веществ
Б) высокое содержание белка
В) высокое содержание витаминов
Г) высокая калорийность
- 447. [T004460] ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ МАТЕРИ ПРОВОДЯТ**
А) сразу после рождения
Б) через 6 часов

В) через 12 часов

Г) через 24 часа

[T004461] НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ ДОКОРМ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

А) гипогалактии

Б) недостатке витаминов

В) расстройстве питания

Г) избытке веса

449. [T004462] КОНТРОЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ РЕБЕНКА ПРОВОДЯТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А) количества высосанного молока из груди матери

Б) массы тела

В) количества прикорма

Г) усвоения пищи

450. [T004463] ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ СОСТАВЛЯЕТ

А) 3

Б) 1

В) 5

Г) 8

[T004464] СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ МОЛОКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ

А) 1/5 от массы тела

Б) 1/6 от массы тела

В) 1/7 от массы тела

Г) 1/8 от массы тела

452. [T004465] КОЛИЧЕСТВО КОРМЛЕНИЙ НОВОРОЖДЕННОГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ, В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ

А) 6

Б) 7

В) 5

Г) 4

453. [T004466] СИМПТОМЫ МОЧЕКИСЛОГО ИНФАРКТА ПОЧЕК ОБЪЯСНЯЮТСЯ

А) высоким содержанием мочевой кислоты

Б) примесью крови в моче

В) высоким содержанием белка

Г) выделением билирубина с мочой

454. [T004467] ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДОКОРМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

А) молочная смесь

Б) молочная каша

В) овощное пюре

Г) яблочный сок

455. [T004468] ЦЕЛЬЮ ВВЕДЕНИЯ ДОКОРМА ЯВЛЯЕТСЯ

А) обеспечение недостающего суточного и разового объема питания

Б) увеличение поступления соли в организм

В) увеличение поступления жиров

Г) уменьшение количества материнского молока

456. [T004469] ПРИЗНАКОМ НЕДОКОРМА НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

А) выраженное беспокойство

Б) частое мочеиспускание

В) обильный стул

Г) повышение температуры

457. [T004470] ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ РЕБЕНКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ

А) молочную смесь

Б) кипяченую воду

В) манную кашу

Г) картофельное пюре

458. [T004471] АДАПТИРОВАННОЙ СМЕСЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ

А) смесь, приближенная по составу к женскому молоку

Б) смесь, которая нравится ребенку

В) смесь, обогащенная белками

Г) смесь, обогащенная жирами

459. [T004472] К АДАПТИРОВАННЫМ СЛАДКИМ ДЕТСКИМ МОЛОЧНЫМ СМЕСЯМ ОТНОСИТСЯ

А) «Хипп комбиотик»

Б) «Наринэ»

В) коровье молоко

Г) «Бифилакт»

460. [T004473] К АДАПТИРОВАННЫМ КИСЛЫМ ДЕТСКИМ МОЛОЧНЫМ СМЕСЯМ ОТНОСИТСЯ

А) «Бифилакт»

Б) цельный кефир

В) «Симилак»

Г) «Хипп комбиотик»

461. [T004474] ДОКОРМ ВВОДИТСЯ

А) после кормления грудным молоком

Б) до кормления грудным молоком

В) между кормлениями

Г) «по требованию»

462. [T004475] ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ ЖЕНЩИНЕ РЕКОМЕНДУЮТ

А) прием жидкости за 20 минут до кормления

Б) ограничение жидкости

В) ограничение белков

Г) прием пряностей за 20 минут до кормления

463. [T004476] НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ КОРМЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО

А) «по требованию»

Б) через 4 часа

В) через 3 часа

Г) через 2 часа

464. [T004477] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ИЗ ГРУДИ МАТЕРИ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

А) 20

Б) 10

В) 40

Г) 60

465. [T004478] СЦЕЖИВАНИЕ ОСТАТКОВ ГРУДНОГО МОЛОКА ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

А) профилактики гипогалактии

Б) профилактики гипотрофии

В) снижения иммунитета

Г) повышения иммунитета

466. [T004479] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) отсутствие молока

Б) самопроизвольное истечение молока

В) затруднение выделения молока

Г) быстрое поступление молока

467. [T004480] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА СМЕШАННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) недокорм

Б) паратрофия

В) срыгивание

Г) дисфагия

468. [T004481] СМЕСЬ ИЗ СОСКИ ДОЛЖНА ВЫТЕКАТЬ

А) редкими каплями

Б) быстро

В) обильно

Г) тонкой струйкой

469. [T004482] ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ В КИШЕЧНИКЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРЕОБЛАДАЮТ

- А) бифидобактерии
- Б) кишечная палочка
- В) энтерококки
- Г) протей

470. [Т004483] ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ В КИШЕЧНИКЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРЕОБЛАДАЮТ

- А) энтерококки
- Б) бифидобактерии
- В) пневмококки
- Г) хламидии

471. [Т004484] СУТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ ДЛЯ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ В ЛИТРАХ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ

- А) 2.0 – 2.5
- Б) 0.5 – 1.0
- В) 1.0 – 1.5
- Г) 3.0 – 3.5

472. [Т004485] В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЖЕНСКОГО МОЛОКА ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) молочные смеси
- Б) фруктовые соки
- В) овощные отвары
- Г) молочные каши

473. [Т004486] ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРУСОВ В ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРИВОДИТ К ФОРМИРОВАНИЮ

- А) порока сердца
- Б) пневмонии новорожденного
- В) асфиксии новорожденного
- Г) гемолитической болезни новорожденного

474. [Т004487] ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) знакомство с семьей будущего новорожденного
- Б) обучение женщины уходу за новорожденным
- В) контроль состояния беременной
- Г) информирование о заболеваниях у детей раннего возраста

475. [Т004488] ЦЕЛЬЮ ВТОРОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обучение созданию благоприятных условий для новорожденного дома
- Б) выяснение анамнеза беременности
- В) выяснение профессиональных вредностей у родителей
- Г) постановка на учет в женской консультации

476. [Т004489] ОСОБЕННОСТЬЮ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нежная, легкоранимая, сухая
- Б) плохое кровоснабжение
- В) бедна водой
- Г) плохая регенерация

477. [Т004490] ОСОБЕННОСТЬЮ ЖЕЛУДКА НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) плохое развитие кардиального сфинктера
- Б) плохое кровоснабжение
- В) вертикальное положение
- Г) малый объем

478. [Т004491] К ПРИДАТКАМ КОЖИ ОТНОСЯТСЯ

- А) сальные железы
- Б) лимфатические узлы
- В) слюнные железы
- Г) железы внутренней секреции

[Т004492] В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ ЧАСТОТА СТУЛА В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 4 – 6
- Б) 1 – 2
- В) 10 – 12
- Г) 20 – 25

480. [Т004493] ЖЕНСКОЕ МОЛОКО СОДЕРЖИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО

- А) иммуноглобулина А
- Б) иммуноглобулина М
- В) свободного билирубина
- Г) насыщенных жиров

481. [Т004494] ПРОЯВЛЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиперемия и шелушение кожи
- Б) желтушное окрашивание
- В) общий цианоз кожи
- Г) бледность, «мраморный» рисунок

482. [Т004495] УХОД ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРИТЕМЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) смазывание кожи стерильным растительным маслом
- Б) обработку кожи бриллиантовой зеленью
- В) обильное питье
- Г) свободное пеленание

483. [Т004496] ПРИЧИНОЙ МОЧЕКИСЛОГО ИНФАРКТА ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) накопление в организме кристаллов мочевой кислоты
- Б) воспалительный процесс
- В) недостаток железа
- Г) недостаток кальция и фосфора

484. [Т004497] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) экстрагенитальное заболевание в стадии декомпенсации
- Б) гипогалактия
- В) физиологическая желтуха новорожденного
- Г) отсутствие молока

485. [Т004498] СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ЗРЕЛОГО МОЛОКА» У ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ РОДОВ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЮТ

- А) 2 – 3
- Б) 1 – 3
- В) 4 – 5
- Г) 3 – 4

486. [Т004499] СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2:1
- Б) 1:2
- В) 3:1
- Г) 2:4

[Т004500] БОЛЬШОЙ РОДНИЧОК У НОВОРОЖДЕННОГО ИМЕЕТ ФОРМУ

- А) ромбовидную
- Б) овальную
- В) округлую
- Г) треугольную

488. [Т004501] ПРИЗНАКОМ ДОНОШЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гипертонус мышц - сгибателей
- Б) мышечная гипотония
- В) тремор конечностей
- Г) гипертонус мышц - разгибателей

489. [Т004502] ПОД РЕФЛЕКСОМ БАБКИНА ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ РЕФЛЕКС

- А) ладонно-ротовой
- Б) хватания
- В) ползания
- Г) охватывания

490. [Т004503] ПОД РЕФЛЕКСОМ ПОЛЗАНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ РЕФЛЕКС

- А) Бауэра
- Б) Моро

- В) Бабкина
- Г) Робинсона

491. [T004504] ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА НА ПУПОВИНУ НАКЛАДЫВАЮТ ЗАЖИМЫ КОХЕРА В КОЛИЧЕСТВЕ

- А) 3
 - Б) 1
 - В) 2
 - Г) 4
- 492. [T004505] ПРИКЛАДЫВАНИЕ РЕБЕНКА К ГРУДИ МАТЕРИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСЛОЖНЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНО**

- А) в родильном зале
- Б) после перевода в послеродовое отделение
- В) в течение суток
- Г) на вторые сутки после родов

493. [T004506] НАГРУБАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПОСЛЕ РОДОВ ЧАЩЕ ВСЕГО НАСТУПАЕТ С СУТОК

- А) 3
 - Б) 1
 - В) 2
 - Г) 4
- 494. [T004507] ПРИЧИНОЙ ТРЕЩИН НА СОСКАХ У РОДИЛЬНИЦЫ ЧАЩЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) неправильное прикладывание ребенка к груди
- Б) гипогалактия
- В) нагрубание молочных желез
- Г) не соблюдение женщиной гигиены

495. [T004508] МАССОЙ ТЕЛА РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ СЧИТАЮТ РЕЗУЛЬТАТ ВЗВЕШИВАНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННОГО ПОСЛЕ РОДОВ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 1 часа
- Б) 2 часов
- В) 1 суток
- Г) 2 суток

[T004510] НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОЛАКТИНА У ЖЕНЩИНЫ ОТМЕЧАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ

- А) сна
- Б) физической активности
- В) состояния покоя
- Г) кормления

497. [T004819] НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- А) внутривенно
- Б) подкожно
- В) внутримышечно
- Г) сублингвально

498. [T004820] СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ВАЛИДОЛ» ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сублингвальный
- Б) пероральный
- В) ректальный
- Г) внутривенный

499. [T004821] ПОД ЭНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ

- А) ректальный
- Б) подкожный
- В) ингаляционный
- Г) внутривенный

500. [T004822] ДЛЯ ОСТАНОВКИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) эргометринамалеат
- Б) динопрост
- В) сальбутамол
- Г) магния сульфат

501. [T004823] ПРЕДНИЗОЛОН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) глюкокортикостероиды
- Б) мочегонные средства
- В) снотворные средства
- Г) антигистаминные средства

[T004824] К АНТИГИСТАМИННЫМ СРЕДСТВАМ, БЛОКИРУЮЩИМ Н1 ГИСТАМИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ ОТНОСИТСЯ

- А) лоратадин
- Б) валериана
- В) капотен
- Г) глюкоза

503. [T004825] ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА НА МЕСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) местное
- Б) резорбтивное
- В) рефлекторное
- Г) кумулятивное

504. [T004826] РАСТВОР БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) красители
- Б) антибиотики
- В) противовирусные
- Г) антигистаминные

505. [T004827] К АНТАЦИДНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) альмагель
- Б) мотилиум
- В) ранитидин
- Г) рифампицин

506. [T004828] ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ПРИВОДЯЩЕЕ К ГИБЕЛИ ЗАРОДЫША

- А) эмбриотоксическое
- Б) эмбриолетальное
- В) мутагенное
- Г) фетотоксическое

507. [T004829] ПРИ ВВЕДЕНИИ БЕТА АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- А) гипотрофия плаценты и плода
- Б) потеря слуха
- В) поражение кожных покровов
- Г) геморрагический синдром

508. [T004830] НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) амоксицилин
- Б) тетрациклин
- В) ванкомицин
- Г) гентамицин

509. [T004831] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОКИСЛИТЕЛЕЙ ОТНОСИТСЯ

- А) перекись водорода
- Б) фурацилин
- В) омепрозол
- Г) диакарб

510. [T004832] АНТИСЕПТИК, КОТОРЫЙ ПРОТИВОПОКАЗАН ДЕТЯМ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

- А) борная кислота
- Б) фурацилин
- В) перекись водорода
- Г) бриллиантовый зеленый

511. [T004833] НАРУШЕНИЕ РОСТА ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- А) тетрациклина
- Б) ампициллина
- В) цефтриаксона
- Г) джозамицина

512. [Т004834] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕВОМИЦЕТИНА У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) «серый синдром»
- Б) угнетение функции почек
- В) угнетение функции печени
- Г) дисбактериоз

513. [Т004835] К ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) ацикловир
- Б) ремантадин
- В) зидовудин
- Г) азитромицин

514. [Т004836] НООТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- А) винпоцетин (кавинтон)
- Б) хлоропирамин (супрастин)
- В) валидол
- Г) этимизол

515. [Т004837] ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) окситоцин
- Б) прогестерон
- В) анальгин
- Г) амоксиклав

516. [Т004838] СВОЕВРЕМЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) проводится по показаниям
- Б) проводится при инфекционных заболеваниях
- В) благотворно влияет на мать и плод при туберкулезе
- Г) благотворно влияет на мать и плод при сахарном диабете

517. [Т004839] ПАЦИЕНТАМ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК ПРОТИВОПОКАЗАН

- А) гентамицин
- Б) пefлоксацин
- В) стрептомицин
- Г) пипольфен

[Т004840] БЕРЕМЕННЫМ ПРОТИВОПОКАЗАН

- А) стрептомицин
- Б) ванкомицин
- В) арбидол
- Г) азитромицин

519. [Т004841] ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ РАЗВИВАЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ

- А) кандидоз полости рта
- Б) лунообразное лицо
- В) стероидный диабет
- Г) стероидная язва

520. [Т004842] К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) дифлюкан
- Б) пирацетам
- В) пантогам
- Г) омнопон

521. [Т004843] К ИНГИБИТОРАМ АПФ ОТНОСИТСЯ

- А) каптоприл
- Б) анаприлин
- В) нитроглицерин
- Г) диакарб

522. [Т004844] ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ

- А) ацетилсалициловую кислоту
- Б) анаприлин
- В) морфин
- Г) сумамед

523. [T004845] ГИПОТИАЗИД СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ

- А) утром с препаратами калия
- Б) вечером с препаратами калия
- В) утром
- Г) вечером

524. [T004846] АЛЬМАГЕЛЬ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) антациды
- Б) блокаторы H₂-рецепторов гистамина
- В) ненаркотические анальгетики
- Г) антигистаминные

525. [T004848] К МЯГКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ ОТНОСИТСЯ

- А) паста
- Б) таблетка
- В) раствор
- Г) аэрозоль

526. [T004849] АЛЬБУМИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) плазмозаменители
- Б) ненаркотические анальгетики
- В) антибиотики
- Г) антикоагулянты

527. [T004850] К ВИТАМИНАМ , НАЗНАЧАЕМЫМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАХИТА У ДЕТЕЙ, ОТНОСИТСЯ

- А) эргокальциферол
- Б) ретинол
- В) аскорбиновая кислота
- Г) пиридоксина гидрохлорид

528. [T004851] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кровотечение в раннем послеродовом периоде
- Б) удушье
- В) приступ стенокардии
- Г) гипертонический криз

529. [T004852] К УТЕРОТОНИЗИРУЮЩЕМУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ОТНОСИТСЯ

- А) метилэргометрин
- Б) гепарин натрия
- В) аскорбиновая кислота
- Г) конвулекс

530. [T004853] ОСНОВНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кардиотонический
- Б) антиангинальный
- В) диуретический
- Г) желчегонный

531. [T004854] ОСНОВНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПАРАЦЕТАМОЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) анальгезирующий
- Б) желчегонный
- В) противоаллергический
- Г) антибактериальный

532. [T004855] К СЕДАТИВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) валериана
- Б) женьшень
- В) настойка календулы
- Г) левзея

[T004856] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА МЕТОКЛОПРОМИД ГИДРОХЛОРИД (ЦЕРУКАЛ) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) противорвотное
- Б) антиаритмическое
- В) гипотензивное
- Г) диуретическое

534. [T004857] ПОД РАЗОВОЙ ДОЗОЙ ПОНИМАЮТ КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА ПРИНЯТОЕ

- А) за один прием
- Б) в течение суток
- В) за три приема
- Г) в удвоенной средней терапевтической дозе принятой за один прием

535. [T004858] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ЯВЛЯЕТСЯ

- А) усиление лактации
- Б) уменьшение лактации
- В) повышает АД
- Г) гипогликемия

536. [T004859] ЖИДКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) раствор
- Б) таблетка
- В) мазь
- Г) порошок

537. [T004860] ДИАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) транквилизатор
- Б) анальгетик
- В) муколитик
- Г) антибиотик

538. [T004862] К ГРУППЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ОТНОСИТСЯ

- А) гепарин натрия
- Б) ацетилсалициловая кислота
- В) диклофенак натрия
- Г) ибуклин

539. [T004863] К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- А) эссенциале
- Б) ацетилсалициловая кислота
- В) парацетам
- Г) лазолван

540. [T004864] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ДИФЕНГИДРАМИНА (ДИМЕДРОЛА) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) крапивница
- Б) ринит
- В) головная боль
- Г) судороги

541. [T004865] НИТРОГЛИЦЕРИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) нитраты
- Б) антикоагулянты
- В) антибиотики
- Г) анальгетики

542. [T004866] АЛЛОХОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) желчегонные
- Б) противорвотные
- В) гемастатические
- Г) антисептики

543. [T004867] ВЛИЯНИЕ КОАГУЛЯНТОВ НА СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ

- А) повышают
- Б) не изменяют
- В) угнетают
- Г) понижают

544. [T004868] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ

- А) антимикробное
- Б) жаропонижающее
- В) противоаллергическое
- Г) адсорбирующее

545. [T004869] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) головная боль, гипотензия
- Б) гипертермия
- В) сужение коронарных артерий
- Г) расширение коронарных артерий

546. [T004870] СИМПТОМОМ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гематурия
- Б) дизурия
- В) никтурия
- Г) пиурия

[T004872] СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- А) бенциклан (галидор)
- Б) висмута трикалиядицитрат (де-нол)
- В) ацидин-пепсин
- Г) фестал

548. [T004873] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИМЕНЯЮТ УРОСЕПТИК

- А) циклофлоксацин
- Б) лазикс
- В) гепарин
- Г) баралгин

549. [T004874] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ХЛОРОПИРАМИН (СУПРАСТИН) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сонливость
- Б) алопеция
- В) лихорадка
- Г) запор

550. [T004875] СЕЛЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ЗАВИСИТ ОТ

- А) дозы
- Б) периода полувыведения
- В) способа приема
- Г) объема распределения

551. [T004876] ДИАПАЗОН МЕЖДУ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ЛЕКАРСТВА В ПЛАЗМЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) шириной терапевтического действия
- Б) периодом полувыведения
- В) тахифилаксией
- Г) толерантностью

552. [T004878] К ИНГАЛЯЦИОННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМ ОТНОСИТСЯ

- А) беклометазон
- Б) преднизолон
- В) дексаметазон
- Г) полькортолон

553. [T004879] ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кандидоз полости рта
- Б) головная боль
- В) полиурия
- Г) тошнота

554. [T004880] РАННИМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) стероидный диабет
- Б) катаркта

- В) миопатия
- Г) остеопороз

555. [T004881] АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) атропина сульфат
- Б) неостигминаметилсульфат (прозерин)
- В) унитиол
- Г) мускарин

556. [T004882] К КРИСТАЛЛОИДНЫМ ИНФУЗИОННЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

- А) 0,9% раствор натрия хлорида
- Б) желатиноль
- В) полиглюкин
- Г) реополиглюкин

557. [T004883] ПРИ ВНЕЗАПНОМ СНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ВНУТРИВЕННО

- А) эпинефрин (адреналин)
- Б) преднизолон
- В) ацетилсалициловую кислоту
- Г) дицинон

558. [T004884] ПРИ ЛИХОРАДКЕ СВЫШЕ 39° ГРАДУСОВ У ДЕТЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

- А) ацетилсалициловой кислоты
- Б) парацетамола
- В) ибупрофена
- Г) ибуклина

559. [T004885] КОЖНЫМ АНТИСЕПТИКОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) спирт 70%
- Б) фурацилин
- В) спирт 40%
- Г) перекись водорода

560. [T004886] ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) этиотропная
- Б) патогенетическая
- В) симптоматическая
- Г) заместительная

561. [T004887] ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) симптоматическая
- Б) патогенетическая
- В) этиотропная
- Г) заместительная

562. [T004888] К ТВЕРДОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ, ОБЛАДАЮЩЕЙ СВОЙСТВОМ СЫПУЧЕСТИ, ОТНОСИТСЯ

- А) порошок
- Б) карамель
- В) паста
- Г) мазь

563. [T004889] ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ АНТИДОТ

- А) унитиол
- Б) атропина сульфат
- В) налорфин
- Г) бемеград

564. [T004890] ВСАСЫВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, БИОТРАНСФОРМАЦИЮ И ВЫВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗУЧАЕТ

- А) фармакокинетика
- Б) фармакодинамика
- В) фармакопея
- Г) хронофармакология

565. [Т004891] БИОДОСТУПНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАЗЫВАЕТСЯ ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО ПРЕПАРАТА В

- А) системном кровотоке
- Б) моче
- В) желудочном соке
- Г) панкреатическом соке

566. [Т004892] ПАЦИЕНТАМ С НЕВРИТОМ СЛУХОВОГО НЕРВА ПРОТИВОПОКАЗАН

- А) стрептомицин
- Б) дротаверин (но-шпа)
- В) фестал
- Г) нитроглицерин

567. [Т004893] АНТИБИОТИКОМ ИЗ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пефлоксацин
- Б) карбенициллин
- В) рифампицин
- Г) стрептомицин

568. [Т004894] ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К

- А) бронхоскопии
- Б) томографии
- В) рентгеноскопии
- Г) флюорографии

569. [Т004895] ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ

- А) бициллин 1
- Б) рифампицин
- В) амоксициллин
- Г) азитромицин

570. [Т004896] ПРИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ЭФФЕКТИВЕН

- А) амоксициллин
- Б) фурагин
- В) пенициллин
- Г) фамотидин

571. [Т004897] ЦИМЕТИДИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) блокаторы H₂-рецепторов гистамина
- Б) холинолитики
- В) спазмолитики
- Г) анальгетики

572. [Т004900] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

- А) интерферон
- Б) папаверин
- В) холосас
- Г) пенициллин

573. [Т004901] ПРИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ ЭФФЕКТИВЕН

- А) амоксициллин
- Б) фурадонин
- В) изониазид
- Г) омепразол

574. [Т004902] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОР

- А) атенолол
- Б) фуросемид
- В) омепразол
- Г) изоптин

575. [Т004905] ХЕНОФАЛЬК ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) холеретики

- Б) анальгетики
- В) спазмолитики
- Г) уросептики

576. [T004908] ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ФЕНКАРОЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сонливость
- Б) запор
- В) лихорадка
- Г) аллопеция

577. [T004909] ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ (ДЕ-НОЛ) ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) гастропротекторы
- Б) гепатопротекторы
- В) холинолитики
- Г) слабительные

578. [T004910] ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фамотидин
- Б) сайтотек
- В) солкосерил
- Г) дротаверин (но-шпа)

579. [T004911] ОМЕЗ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) ингибитор протонной помпы
- Б) блокатор H₂-рецепторов гистамина
- В) М-холиноблокаторы
- Г) блокаторы H₁-рецепторов гистамина

580. [T004912] ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, ПОДАВЛЯЮЩИМ СУХОЙ КАШЕЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) либексин
- Б) тавегил
- В) мукалтин
- Г) гентамицин;

581. [T004913] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБДАДАЮЩИЙ АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) висмута трикалия дицитрат (де-нол)
- Б) гастал
- В) омепразол
- Г) ранитидин

582. [T004914] К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) внутривенный
- Б) сублингвальный
- В) ректальный
- Г) пероральный

583. [T004916] К МУКОЛИТИКАМ ОТНОСЯТ

- А) ацетилцистеин
- Б) сальметерол
- В) кодеин
- Г) кромогликат натрия

584. [T004918] К ЦЕФАЛОСПОРИНАМ 1 ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСЯТ

- А) цефазолин
- Б) беродуал
- В) винпоцетин
- Г) сумамед

585. [T004919] ВАНКОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) гликопептиды
- Б) пенициллины
- В) макролиды
- Г) аминогликозиды

[T004921] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ТЕТРАЦИКЛИНОВ ОТНОСИТСЯ

- А) рондамицин
- Б) рифампицин
- В) сумамед
- Г) парацетамол

587. [T004923] ЛИНКОМИЦИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) линкозамиды
- Б) гликопептиды
- В) аминогликозиды
- Г) пенициллины

588. [T004924] ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, РАССЛАБЛЯЮЩИМ МИОМЕТРИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гинипрал
- Б) окситоцин
- В) динопрост
- Г) макропен

589. [T004925] РЕФЛЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАЗЫВАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

- А) на орган через рефлекторную дугу
- Б) в месте его нанесения
- В) в токсических дозах
- Г) после накопления в организме

590. [T004927] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА БИЙОХИНОЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сифилис
- Б) тонзиллит
- В) бронхит
- Г) трахеит

591. [T004928] БИЙОХИНОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ

- А) препараты висмута
- Б) антигистаминные
- В) антибиотики
- Г) анальгетики

[T004929] БОЛЕЗНЬ «БЕРИ-БЕРИ» РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА

- А) тиамин бромид
- Б) рибофлавин
- В) эргокальциферол
- Г) цианокобаламин

593. [T004988] ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ (МЕДИЦИНЫ) В ОБОБЩЕННОМ ВИДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) общественное здоровье и факторы, влияющие на него
- Б) здоровье индивидуума
- В) эпидемиология заболеваний
- Г) здоровье работающего населения

594. [T004989] ОСНОВНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) участковые врачи и специалисты среднего медицинского звена поликлиники
- Б) специалисты центров Роспотребнадзора
- В) врачи центра медицинской профилактики
- Г) врачи психоневрологического диспансера

595. [T004990] В ПОНЯТИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВХОДЯТ ПЕРИОДЫ

- А) антенатальный + интранатальный+ ранний неонатальный
- Б) антенатальный + интранатальный
- В) антенатальный + неонатальный
- Г) интранатальный + неонатальный + ранний неонатальный

596. [T004991] ПОКАЗАТЕЛЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) абсолютный прирост населения
- Б) темп прироста населения
- В) темп роста

Г) показатель рождаемости

597. [T004992] В ПОНЯТИЕ ПОСТНЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВХОДИТ ПЕРИОД

А) со второго месяца жизни до года

Б) первой недели жизни

В) первых суток жизни

Г) первого месяца жизни

598. [T004993] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

А) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая по обязательному социальному страхованию

Б) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением инвалидности

В) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мероприятий по материальному обеспечению социально-незащищенных семей

Г) системой создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового риска по обязательному социальному страхованию

599. [T004994] К СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ОТНОСЯТ

А) обязательные платежи в Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Б) обязательные платежи в Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности, стойкой утраты трудоспособности и в связи с материнством

В) обязательные платежи в Фонд обязательного медицинского страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Г) обязательные платежи в Фонд социального страхования РФ в целях обеспечения обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай стойкой утраты трудоспособности и в связи с материнством.

600. [T004995] ОТЧИСЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ (РАБОТОДАТЕЛЯ) НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (%)

А) 2,9

Б) 26,0

В) 3,1

Г) 5,1

601. [T004996] СТРАХОВЩИКОМ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

А) фонд социального страхования

Б) пенсионный Фонд

В) фонд обязательного медицинского страхования

Г) фонд регионального развития

602. [T004997] В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НАИБОЛЬШИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАНИМАЮТ

А) острые респираторные заболевания

Б) травмы, отравления и несчастные случаи

В) заболевания сердечно-сосудистой системы

Г) заболевания периферической нервной системы

603. [T004998] ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ СРОКОМ

А) на 70 дней со дня рождения ребенка

Б) на 90 дней со дня рождения ребенка

В) на 156 дней со дня рождения ребенка

Г) на 56 дней со дня рождения ребенка

604. [T004999] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЕ ПЛОДА В ОСНОВНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

А) в акушерском отделении родильного дома

Б) в женской консультации

В) в поликлинике для взрослого населения

Г) в отделении новорожденных родильного дома

605. [T005000] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕВОЧКАМ ДО 15 ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ

А) детские поликлиники, женские консультации

Б) диспансеры

В) гинекологические отделения взрослых поликлиник

Г) школьные врачи

606. [T005001] ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ В СТРУКТУРЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

А) акушерские кровотечения

Б) экстрагенитальная патология

В) сепсис

Г) гестозы

607. [T005002] ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗАНИМАЮТ БОЛЕЗНИ

А) воспалительные

Б) врожденные аномалии

В) осложнения беременности

Г) онкологические

608. [T005003] В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ ЗАНИМАЮТ

А) психические расстройства и расстройства поведения

Б) болезни органов дыхания

В) врожденные аномалии

Г) болезни нервной системы

609. [T005004] К ПОКАЗАТЕЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА ОТНОСИТСЯ

А) перинатальная смертность

Б) младенческая смертность

В) летальность

Г) повозрастная смертность в детском возрасте

610. [T005005] К ПОКАЗАТЕЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСЯТСЯ

А) младенческая смертность

Б) мертворождаемость

В) перинатальная смертность

Г) ранняя неонатальная смертность

611. [T005006] ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ЗАНИМАЮТ

А) внутричерепная родовая травма

Б) врожденные пороки

В) сепсис

Г) гнойно-септические заболевания новорожденных

612. [T005007] ДОСТУПНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

А) развитием широкой сети медицинских организаций и наличием необходимого количества медицинских работников

Б) производством и закупкой недостающих медикаментов за рубежом

В) развитием широкой сети учебно-методических медицинских центров

Г) финансированием научно-исследовательского сектора

613. [T005008] ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В АКУШЕРСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) женская консультация

Б) станция скорой медицинской помощи

- В) диспансер
- Г) поликлиника

614. [T005009] МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА

- А) сохранение здоровья
- Б) снижение летальности
- В) увеличение рождаемости
- Г) борьбу с абортами

615. [T005010] СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ

- А) 800
- Б) 750
- В) 700
- Г) 1200

616. [T005011] ВЗНОС НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ В ФОНД МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

- А) работодателями
- Б) работающими гражданами
- В) администрацией муниципального образования
- Г) из бюджета РФ

617. [T005012] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОМС) РЕГУЛИРУЕТСЯ

- А) государством
- Б) фондами ОМС
- В) страховыми организациями
- Г) медицинскими учреждениями

618. [T005013] ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фонды медицинского страхования
- Б) индивидуальный бюджет
- В) инвестиции
- Г) федеральный бюджет

619. [T005014] НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ЦЕНЫ

- А) тарифные
- Б) договорные
- В) свободные
- Г) бюджетные

620. [T005015] ТИП ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

- А) регрессивный
- Б) стабильный
- В) прогрессивный
- Г) смешанный

621. [T005016] ПОКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- А) родильного дома
- Б) поликлиники
- В) женской консультации
- Г) стационара

622. [T005017] К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТ

- А) обязательное
- Б) коллективное
- В) индивидуальное
- Г) профессиональное

[T005018] СОВЕРШИВШЕЕСЯ СОБЫТИЕ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ КОТОРОГО ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) страховой случай

- Б) типовой случай
- В) рисковый случай
- Г) страховой риск

624. [T005019] ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ГАРАНТИЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ БЮДЖЕТНО-СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) страховой полис
- Б) паспорт
- В) медицинская карта амбулаторного больного
- Г) медицинская карта стационарного больного

625. [T005020] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ

- А) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
- Б) получение медицинской помощи минимального объема
- В) бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи
- Г) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности

626. [T005021] ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

- А) направлено на получение гарантий более высокого уровня медицинской помощи сверх установленных программой ОМС
- Б) может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного медицинского страхования
- В) может осуществляться только региональными фондами ОМС
- Г) в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного медицинского страхования.

627. [T005022] ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) территориальной программой ОМС
- Б) лечебным учреждением
- В) Законом РФ «О медицинском страховании»
- Г) страховой компанией

628. [T005023] СТРАХОВЩИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) страховая медицинская организация
- Б) гражданин обладатель страхового полиса
- В) тот, кто уплачивает страховые взносы
- Г) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе ОМС

629. [T005024] СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

- А) имеет право контролировать качество оказания медицинской помощи
- Б) контролирует качество оказания медицинской помощи только при возникновении жалоб от пациентов
- В) участвует в аттестации медицинских работников
- Г) участвует в лицензировании лечебно-профилактических учреждений

630. [T005025] ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ 2-Х ИЛИ БОЛЕЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ЛИСТОК НЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ СРОКОМ

- А) на 110 дней со дня рождения детей
- Б) на 90 дней со дня рождения детей
- В) на 156 дней со дня рождения детей
- Г) на 70 дней со дня рождения детей

631. [T005026] ОТЧИСЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (%)

- А) 3,6
- Б) 26,0
- В) 3,1
- Г) 2,9

632. [T005027] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ

- А) законодательством РФ, на региональном уровне может увеличиваться
- Б) только законодательством РФ
- В) только законодательными актами субъектов РФ
- Г) законодательством РФ, на региональном уровне уменьшается

633. [T005028] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СРОКИ

- А) в любые сроки беременности
- Б) до 12 недель беременности
- В) до 22 недель беременности
- Г) до 28 недель беременности

634. [Т005029] ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ОТЦОМ РЕБЕНКА ЗАПИСЫВАЕТСЯ

- А) муж женщины
- Б) донор
- В) донор или муж женщины
- Г) никто не записывается

635. [Т005030] СОГЛАСИЕ ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА НА ЛЕЧЕБНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- А) обязательно получать в любом случае
- Б) необязательно получать
- В) необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
- Г) необязательно, если имеется угроза его жизни

636. [Т005031] ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ Ф3 РФ « ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»

- А) соблюдение прав и обеспечение государственных гарантий
- Б) медицинское страхование граждан
- В) государственное управление здравоохранением
- Г) муниципальное управление здравоохранением

[Т005032] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ

- А) до 12 недель беременности
- Б) до 28 недель беременности
- В) в любые сроки беременности
- Г) до 22 недель беременности

638. [Т005033] МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ

- А) только по письменному заявлению, в возрасте старше 35 лет или женщинам, имеющим не менее двух детей
- Б) по достижению возраста 35 лет
- В) при наличие двух детей
- Г) при наличие трех и более детей

639. [Т005034] ПРАВО ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЗАКРЕПЛЕНО

- А) конституцией Российской Федерации
- Б) уголовным кодексом РФ
- В) гражданским кодексом РФ
- Г) кодексом об административных правонарушениях

[Т005035] ЦЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- А) лишение человека способности к воспроизводству потомства и как метод контрацепции
- Б) только как метод контрацепции
- В) лишение человека способности к воспроизводству потомства
- Г) лишение человека способности к воспроизводству при психических заболеваниях

641. [Т005036] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА ДЕТЬМИ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

- А) коллективным договором
- Б) Правительством РФ
- В) правилами внутреннего распорядка
- Г) органами местного самоуправления

642. [Т005037] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 140 календарных дней
- Б) 170 календарных дней
- В) 120 календарных дней
- Г) 150 календарных дней

643. [Т005040] ЖЕНЩИНАМ, РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ МОЖЕТ

ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ

- А) один выходной без сохранения заработной платы
- Б) три дополнительных выходных дня
- В) три оплачиваемых дня
- Г) один оплачиваемый выходной день

644. [Т005041] СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ

- А) в определенных случаях изменения социального или материального положения
- Б) при утрате имущества
- В) только в ситуациях, возникших неожиданно
- Г) только в следствии стихийных бедствий

645. [Т005042] К ВЫПЛАТАМ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ

- А) выплаты по беременности и родам
- Б) компенсация материального ущерба
- В) компенсация морального ущерба
- Г) компенсации вследствие стихийных бедствий

646. [Т005043] СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОЗЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

- А) вносятся с согласия пациента
- Б) вносятся без согласия пациента
- В) вносятся по решению администрации
- Г) не вносятся

[Т005044] ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) правительство РФ
- Б) президентом РФ
- В) государственной думой РФ
- Г) местной администрацией

648. [Т005046] ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И ЕЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО

- А) на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской помощи
- Б) на халатное отношение со стороны медицинских работников
- В) на дефекты в оформлении медицинской документации
- Г) не имеет право на возмещение вреда причиненного здоровью

649. [Т005047] МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) специализированная
- Б) медико-социальная
- В) паллиативная
- Г) квалифицированная

650. [Т005048] ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНУ

- А) только по желанию гражданина
- Б) на усмотрения лечащего врача
- В) с согласия родственников
- Г) в любом случае

651. [Т005049] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ

- А) результаты проведения анализов, обследований, а также диагноз
- Б) о медицинской организации
- В) противоправные действия в отношении пациента
- Г) угроза массового распространения инфекционного заболевания

652. [Т005052] МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ ПРОВОДИТЬСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

- А) муниципальной и государственной систем здравоохранения
- Б) муниципальной системы здравоохранения
- В) государственной системы здравоохранения
- Г) частной системы здравоохранения

653. [Т005053] УСЛОВИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) информированное добровольное согласие пациента
- Б) добровольное согласие пациента

В) согласие пациента, заверенное нотариусом

Г) согласие пациента не требуется

654. [T005054] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

А) 84

Б) 70

В) 80

Г) 86

655. [T005055] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ РОЖДЕНИИ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

А) 110

Б) 70

В) 80

Г) 84

656. [T005056] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА ПРИ ОСЛОЖНЁННЫХ РОДАХ СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

А) 86

Б) 70

В) 80

Г) 84

657. [T005057] В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА ЖЕНЩИНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА

А) 3 лет

Б) 1.5 года

В) 1.5 лет

Г) 1 года

658. [T005058] ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО НА ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК И ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО

А) 15 лет

Б) 1 года

В) 3 лет

Г) 7 лет

659. [T005060] СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА, ОТВЕЧАЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

А) имеющая собственного здорового ребенка, не имеющая отклонений в состоянии здоровья, в возрасте 20 – 35 лет

Б) имеющая не менее двух собственных детей, не имеющая отклонений в состоянии здоровья, в возрасте до 40 лет

В) здоровая женщина в возрасте от 20 – 35 лет

Г) здоровая женщина в возрасте от 17 до 50 лет

660. [T005063] ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

А) члену семьи, кто фактически будет ухаживать за ребенком

Б) отцу ребенка

В) близкому родственнику

Г) только матери ребенка

661. [T005065] ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

А) федеральный закон РФ « Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Б) федеральный закон РФ « О медицинском страховании граждан»

В) федеральный закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов»

Г) трудовой Кодекс РФ

662. [T005069] ВИДОМ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) предупреждение

Б) замечание

В) увольнение

Г) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

663. [T005353] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ БРОНХИТОВ ОТНОСЯТ

А) бактериальную и вирусную инфекцию

- Б) курение
- В) алкоголизм
- Г) переохлаждение

664. [T005354] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ БРОНХИТА ОТНОСЯТ

- А) кашель с мокротой
- Б) слабость
- В) легочное кровотечение
- Г) головная боль

665. [T005355] К ОСНОВНОМУ ФАКТОРУ РИСКА ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ

- А) курение
- Б) бактериальную и вирусную инфекцию
- В) переохлаждение
- Г) гиповитаминоз

666. [T005356] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ

- А) одышку
- Б) недомогание
- В) повышение температуры
- Г) головную боль

667. [T005357] ДЛЯ ОСТРОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНА МОКРОТА

- А) слизистая
- Б) стекловидная
- В) "ржавая"
- Г) розовая пеннистая

668. [T005358] К ОСЛОЖНЕНИЯМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ

- А) хроническую дыхательную недостаточность
- Б) острую сосудистую недостаточность
- В) острую сердечную недостаточность
- Г) легочное кровотечение

669. [T005359] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ОТНОСЯТ

- А) приступ удушья
- Б) кашель с гнойной мокротой
- В) кровохарканье
- Г) инспираторная одышка

670. [T005360] ДЛЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНО ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА

- А) сидя, с упором на руки
- Б) горизонтальное с приподнятыми ногами
- В) лежа на боку
- Г) горизонтальное

[T005361] НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЯЗКОЙ СТЕКЛОВИДНОЙ МОКРОТЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПРИ

- А) бронхиальной астме
- Б) абсцессе легкого
- В) пневмонии
- Г) экссудативном плеврите

672. [T005362] ПРИ ПРИСТУПЕ УДУШЬЯ НА ФОНЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) сальбутамол
- Б) либексин
- В) кодеин
- Г) тусупрекс

673. [T005363] ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ В МОКРОТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) эозинофилы
- Б) эластические волокна
- В) атипичные клетки
- Г) лейкоциты

674. [T005364] К ПРИНЦИПАМ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

ОТНОСИТСЯ

- А) прекращение контакта с аллергеном
- Б) устранение гиподинамии
- В) отказ от алкоголя
- Г) сбалансированное питание

675. [T005365] ПОД ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ ПОНИМАЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- А) пиковой скорости выдоха
- Б) жизненной емкости легких
- В) остаточного объема
- Г) дыхательного объема

676. [T005366] К ОСНОВНОМУ ВОЗБУДИТЕЛЮ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ

- А) пневмококк
- Б) микобактерию
- В) вирус
- Г) кишечную палочку

677. [T005367] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТСЯ

- А) боль в грудной клетке, одышка, лихорадка
- Б) слабость, головная боль, стекловидная мокрота
- В) длительный субфебрилитет, утомляемость
- Г) отеки, повышение АД, нарушение ритма

678. [T005368] ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) пневмонии
- Б) бронхиальной астме
- В) остром бронхите
- Г) сухом плеврите

679. [T005369] «РЖАВЫЙ» ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) пневмонии
- Б) бронхиальной астме
- В) остром бронхите
- Г) сухом плеврите

680. [T005370] К ВОЗМОЖНОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ОТНОСИТСЯ

- А) асфиксия
- Б) кожный зуд
- В) судороги
- Г) непроизвольное мочеиспускание

681. [T005371] К ЭТИОТРОПНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПНЕВМОНИИ ОТНОСИТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

- А) антибактериальных средств
- Б) отхаркивающих средств
- В) бронхолитических средств
- Г) жаропонижающих средств

[T005372] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) острая дыхательная недостаточность
- Б) лихорадка
- В) боль в грудной клетке
- Г) легочное кровотечение

683. [T005373] ПРИ КРИТИЧЕСКОМ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ ПНЕВМОНИИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- А) коллапс
- Б) острая дыхательная недостаточность
- В) острая коронарная недостаточность
- Г) легочное кровотечение

684. [T005374] ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛЫХ В НОРМЕ МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ (УД/МИН)

- А) 16-20
- Б) 20-40
- В) 60-80
- Г) 6-10

685. [T005375] ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО

ОБЕСПЕЧИТЬ

- А) сухой банкой
- Б) сухой пробиркой
- В) стерильной пробиркой
- Г) стерильной банкой

686. [T005376] ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКОВ У ПАЦИЕНТКИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- А) дисбактериоз
- Б) лихорадка
- В) отеки
- Г) увеличение массы тела

687. [T005377] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиперлипидемия
- Б) природно-экологические факторы
- В) неблагоприятные климатические условия
- Г) рациональное питание

688. [T005379] К ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РЕВМАТИЗМА ОТНОСЯТ

- А) бета-гемолитический стрептококк
- Б) золотистый стафилококк
- В) вирусы
- Г) риккетсии

689. [T005380] К РАЗВИТИЮ РЕВМАТИЗМА ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ

- А) очаг хронической инфекции
- Б) гиподинамия
- В) стрессы
- Г) нерациональное питание

690. [T005381] ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ КЛАПАН СЕРДЦА

- А) митральный
- Б) аортальный
- В) пульмональный
- Г) трехстворчатый

691. [T005382] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ОТНОСЯТ

- А) поражение крупных суставов, летучесть и симметричность болей
- Б) повышение температуры, стойкая деформация суставов
- В) поражение мелких суставов, скованность
- Г) недомогание, моноартрит с деформацией

692. [T005383] ПРИ РЕВМАТИЗМЕ НА КОЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) кольцевидная эритема
- Б) диффузный цианоз
- В) "сосудистые звездочки"
- Г) акроцианоз

693. [T005384] ДЛЯ ИСХОДА РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ХАРАКТЕРНО

- А) отсутствие остаточных деформаций
- Б) деформация сустава
- В) кровоизлияние в полость сустава
- Г) анкилоз

[T005385] ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТИЗМА С ЭТИОТРОПНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) амоксициллин
- Б) нитроглицерин
- В) метамизол
- Г) фурагин

695. [T005386] ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТИЗМА С ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- А) нестероидные противовоспалительные препараты
- Б) нитраты
- В) анальгетики
- Г) мочегонные

696. [T005387] К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕДНИЗОЛОНА ОТНОСЯТ

- А) повышение АД, гипергликемия, синдром Иценко-Кушинга
- Б) головная боль, снижение АД
- В) одышка, легочное кровотечение
- Г) лихорадка, нарушение слуха

697. [T005388] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕВМАТИЗМА ВКЛЮЧАЕТ

- А) бициллинопрофилактику
- Б) витаминизированное питание
- В) санация очагов стафилококковой инфекции
- Г) занятия спортом

698. [T005389] БИЦИЛЛИНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО ОБОСТРЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 5 лет
- Б) 1 года
- В) 2 лет
- Г) 6 месяцев

699. [T005390] К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ОТНОСЯТ

- А) ревматизм
- Б) инфаркт миокарда
- В) стенокардия
- Г) гипертоническая болезнь

700. [T005391] СИНЮШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ГУБ И КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- А) акроцианоз
- Б) иктеричность
- В) диффузный цианоз
- Г) гиперемия

701. [T005393] ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 110 УДАРОВ В МИНУТУ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) тахикардия
- Б) брадикардия
- В) экстрасистолия
- Г) норма

702. [T005394] ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) ограничение жидкости и соли
- Б) увеличение жидкости и белков
- В) ограничение жиров и углеводов
- Г) увеличение жиров и белков

703. [T005395] К ВОЗМОЖНУМУ ФАКТОРУ РИСКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- А) нервно-психическое перенапряжение
- Б) очаг хронической инфекции
- В) гиповитаминоз
- Г) переохлаждение

704. [T005396] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТ

- А) головная боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами
- Б) кровохарканье, головная боль, одышка
- В) изжога, рвота, шум в ушах
- Г) отрыжка, слабость

705. [T005397] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- А) эналаприл, атенолол
- Б) дигоксин, дифенгидрамин (димедрол)
- В) целанид, корвалол
- Г) атропина сульфат, аспаркам

706. [T005398] К ОСЛОЖНЕНИЯМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- А) инсульт, инфаркт миокарда
- Б) обморок, коллапс
- В) ревматизм, порок сердца

Г) пневмония, плеврит

707. [T005399] ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

А) гипертоническом кризе

Б) кардиогенном шоке

В) коллапсе

Г) обмороке

708. [T005400] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ СЕРДЦА ПРЕДПОЛАГАЕТ

А) разъяснение сущности исследования пациентке

Б) осуществление очистительная клизма

В) отсутствие подготовки

Г) накануне легкий ужин

709. [T005401] К ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТ

А) высокий уровень холестерина

Б) занятия физической культурой

В) неотягощенная наследственность

Г) рациональное питание

710. [T005402] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПОРАЖАЮТСЯ

А) артерии

Б) вены

В) капилляры

Г) мышцы

711. [T005403] К ОСЛОЖНЕНИЯМ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ

А) инсульт, инфаркт миокарда

Б) асцит, анасарка

В) пиелонефрит, цистит

Г) пневмония, бронхит

712. [T005404] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ

А) головная боль, ухудшение памяти

Б) загрудинную боль, нарушение ритма сердца

В) снижение аппетита и массы тела

Г) тошноту, рвоту

713. [T005405] ДЛЯ СИМПТОМА АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ХАРАКТЕРНА

А) загрудинная боль

Б) головная боль

В) одышка

Г) тошнота

714. [T005406] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОТНОСЯТ

А) боли в икроножных мышцах при ходьбе, зябкость конечностей

Б) отеки, повышение АД

В) одышку, аритмию

Г) слабость, тахикардию

715. [T005407] БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ХОЛЕСТЕРИНА СОДЕРЖИТСЯ В ПРОДУКТАХ

А) яйца, икра

Б) овощи, фрукты

В) рыба, ягоды

Г) крупы, бобовые

716. [T005408] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ СМЕРТНОСТИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОТНОСЯТ

А) ишемическую болезнь сердца

Б) гипертоническую болезнь

В) пороки сердца

Г) ревматизм

717. [T005409] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

А) атеросклероз коронарных артерий

Б) гипертоническая болезнь

В) пороки сердца

Г) ревматизм

718. [T005411] ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ИРРАДИРУЮЩАЯ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

А) стенокардии

Б) ревмокардите

В) остеохондрозе

Г) инфаркте миокарда

719. [T005412] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

А) гиперлипидемия

Б) переохлаждение

В) гиповитаминоз

Г) гипотония

720. [T005413] К АЭРОЗОЛЬНОЙ ФОРМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСИТСЯ

А) нитроминт

Б) эналаприл

В) клексан

Г) атенолол

721. [T005414] К НИТРАТУ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

А) нитроглицерин

Б) нитрогранулонг

В) сустак-форте

Г) оликард

[T005415] ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (МИН.)

А) 1-3

Б) 10-15

В) 20-25

Г) 30-40

723. [T005416] К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСЯТ

А) головную боль

Б) лихорадку

В) отеки

Г) асцит

724. [T005417] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ ____ МИНУТ

А) 15

Б) 60

В) 120

Г) 180

725. [T005418] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОКАРДИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

А) нитраты, бета-адреноблокаторы

Б) анальгетики, наркотики

В) гипотензивные, диуретики

Г) ганглиоблокаторы, диуретики

726. [T005419] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

А) атеросклероз коронарных артерий

Б) порок сердца

В) ревматический эндокардит

Г) ревматический миокардит

727. [T005420] ДЛЯ ОСНОВНОГО СИМПТОМА АНГИНОЗНОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНЫ

А) загрудинная боль

Б) головная боль

В) отеки на ногах

Г) сердцебиение

728. [T005421] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ

А) загрудинная боль, которая не купируется нитроглицерином

Б) загрудинная боль, которая купируется нитроглицерином

В) колющая боль в области сердца

Г) ноющая боль в области сердца

[T005422] ТИПИЧНОЙ ФОРМОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

А) ангинозная

Б) абдоминальная

В) астматическая

Г) безболевая

730. [T005423] ОСЛОЖНЕНИЕМ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

А) кардиогенный шок

Б) артриты

В) повышение АД

Г) одышка

731. [T005424] ДЛЯ ОСНОВНОГО СИМПТОМА АСТМАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНЫ

А) приступ удушья

Б) загрудинная боль

В) боль в животе

Г) головная боль

732. [T005425] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ОТНОСЯТ

А) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс

Б) приступ удушья

В) лихорадка, рвота

Г) резкое повышение АД, напряженный пульс

733. [T005426] ПОЯВЛЕНИЕ УДУШЬЯ, ОБИЛЬНОЙ ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

А) отека легких

Б) пневмонии

В) кровохарканья

Г) легочного кровотечения

734. [T005427] ПОД ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ ПОНИМАЮТ

А) преждевременное сокращение сердца

Б) увеличение частоты сердечных сокращений

В) нарушение проводимости

Г) уменьшение частоты сердечных сокращений

735. [T005428] ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ПРАВУЮ РУКУ НАКЛАДЫВАЮТ ЭЛЕКТРОД

А) красный

Б) желтый

В) зеленый

Г) черный

[T005429] МЕСТОМ УСТАНОВКИ ГРУДНОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ ЗАПИСИ ОТВЕДЕНИЯ V4 ЯВЛЯЕТСЯ

А) пятое межреберье по левой среднеключичной линии

Б) четвертое межреберье слева от грудины

В) пятое межреберье слева от грудины

Г) четвертое межреберье справа от грудины

737. [T005430] ПРИНЦИПОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА С НЕОСЛОЖНЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

А) транспортировка на носилках

Б) в кресле-каталке

В) самостоятельное передвижение

Г) передвижение в сопровождении медработника

738. [T005431] ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕОБХОДИМА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

А) в первые часы заболевания

Б) на 2-е сутки заболевания

В) на 3-и сутки заболевания

Г) на 4-е сутки заболевания

739. [T005432] ПОД ОБМОРОКОМ ПОНИМАЮТ ФОРМУ ОСТРОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

А) сосудистой

Б) левожелудочковой

В) правожелудочковой

Г) коронарной

740. [T005433] ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОБМОРОКА ЯВЛЯЕТСЯ

А) острая гипоксия мозга

Б) резкое повышение АД

В) высокая температура тела

Г) метеоризм

741. [T005434] ПРИ ОБМОРОКЕ ПАЦИЕНТУ ПРИДАЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ

А) с приподнятыми ногами

Б) с приподнятым изголовьем

В) на левом боку

Г) на правом боку

742. [T005435] К ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ ОТНОСИТСЯ

А) рефлекторное воздействие нашатырного спирта

Б) введение мезатона

В) введение пентамина

Г) проведение оксигенотерапии через пеногасители

743. [T005436] ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ ОБМОРОКЕ НЕОБХОДИМО

А) напоить пациента крепким горячим чаем

Б) поставить банки

В) поставить горчичники

Г) провести кровопускание

744. [T005437] ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

А) недостаточности кровообращения

Б) инфаркта миокарда

В) стенокардии

Г) гипертонической болезни

745. [T005438] ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

А) вечером на ногах

Б) утром на ногах

В) вечером на лице

Г) утром на лице

746. [T005439] ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕКОВ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

А) ограничить прием жидкости и соли

Б) ограничить прием белков и жиров

В) увеличить прием жидкости и соли

Г) увеличить прием белков и жиров

747. [T005440] ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 54 УДАРОВ В МИНУТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

А) брадикардия

Б) тахикардия

В) экстрасистолия

Г) норма

748. [T005441] В РАЦИОНЕ ПАЦИЕНТА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ

А) растительные жиры

Б) мясо

В) кофе, чай

Г) продукты, богатые углеводами

749. [T005442] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ ГАСТРАЛГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

А) боль в животе

Б) головная боль

В) загрудинная боль

Г) приступ удушья

750. [T005443] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА В ОТНОСИТСЯ

А) хеликобактериальная инфекция

Б) аутоиммунные нарушения

В) нерациональное питание

Г) отравление

751. [T005444] НАЗВАНИЕ СИНДРОМА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА

А) диспепсический

Б) гипертонический

В) интоксикационный

Г) гепатолиенальный

752. [T005447] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

А) болезненность в эпигастральной области

Б) положительный симптом Ортнера

В) положительный симптом Пастернацкого

Г) положительный симптом Щеткина-Блюмберга

753. [T005448] ОСЛОЖНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

А) язвенная болезнь

Б) холецистит

В) цирроз печени

Г) рак желудка

754. [T005449] РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ

А) фиброгастродуоденоскопия

Б) желудочное зондирование

В) лапароскопия

Г) рентгенография желудка

755. [T005450] К ОСЛОЖНЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА С РЕЗКО СНИЖЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ

А) рак желудка

Б) холецистит

В) цирроз печени

Г) язвенная болезнь

756. [T005451] ИНФОРМАЦИЮ О СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ

А) желудочное зондирование

Б) общий анализ кала

В) рентгенологическое исследование

Г) дуоденальное зондирование

757. [T005452] В ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ЭНДСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ВХОДЯТ ПРАВИЛА

А) «вечером - легкий ужин, утром – натощак»

Б) «вечером - очистительная клизма»

В) «вечером и утром - очистительная клизма»

Г) подготовки не требуется

[T005453] ДИЕТА № 1 ПРЕДПОЛАГАЕТ

А) тщательное измельчение пищи

Б) повышенное содержание кальция

В) исключение молочных продуктов

Г) исключение крупяных блюд

759. [T005454] НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ

А) рациональное питание

Б) устранение гиподинамии

В) закаливание

Г) нормализация массы тела

760. [T005457] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) хеликобактериальная инфекция
- Б) переохлаждение, переутомление
- В) физическая перегрузка, переохлаждение
- Г) вирусная инфекция, переохлаждение

761. [T005458] РАННЯЯ БОЛЬ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ ЕДЫ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 30 минут после еды
- Б) 2 часов после еды
- В) 3 часов до еды
- Г) 4 часов до еды

762. [T005459] К САМОМУ ЧАСТОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- А) желудочное кровотечение
- Б) кахексию
- В) обезвоживание
- Г) кишечную непроходимость

763. [T005460] ХАРАКТЕР КАЛА ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ОПИСЫВАЕТСЯ КАК

- А) дегтеобразный
- Б) кровянистый
- В) обесцвеченный
- Г) жирный

764. [T005461] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- А) панзинорм, фестал
- Б) викалин, циметидин
- В) клацид, омез
- Г) атропин, гастропепин

765. [T005462] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) эндоскопическое исследование с биопсией
- Б) ирригоскопия
- В) ультразвуковое исследование
- Г) желудочное зондирование

766. [T005464] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К АНАЛИЗУ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ИЗ ПИТАНИЯ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ

- А) мясо
- Б) молоко
- В) манную кашу
- Г) черный хлеб

767. [T005466] ПРИОРИТЕТ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИНАДЛЕЖИТ

- А) блокаторам H₂-гистаминовых рецепторов
- Б) спазмолитикам
- В) ферментам
- Г) анальгетикам

768. [T005467] ПАЦИЕНТУ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) частое дробное питание
- Б) уменьшение калорийности рациона
- В) ограничение жидкости
- Г) голодание

769. [T005470] ПРИ ЗАПОРЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) продукты, богатые клетчаткой
- Б) ограничение поваренной соли
- В) ограничение жидкости
- Г) продукты с малым содержанием клетчатки

770. [T005472] ПОД ИРРИГОСКОПИЕЙ ПОНИМАЮТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

- А) толстого кишечника

- Б) желудка
- В) тонкого кишечника
- Г) пищевода

[T005473] ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ ИСКЛЮЧАЮТ

- А) жареные блюда
- Б) кисломолочные блюда
- В) фрукты
- Г) пшеничный хлеб

772. [T005474] ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ

- А) прием жирной пищи
- Б) переохлаждение
- В) прием углеводов
- Г) стресс

773. [T005475] СИМПТОМ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) боль в правом подреберье
- Б) гектическая лихорадка
- В) мелена
- Г) слабость

[T005476] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОТНОСЯТ

- А) бета-гемолитический стрептококк
- Б) грибковая инфекция
- В) кишечная палочка
- Г) микобактерии

775. [T005477] ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ

- А) клубочки
- Б) канальцы
- В) лоханки
- Г) чашечки

776. [T005478] СИМПТОМ ПАСТЕРНАЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) почек
- Б) легких
- В) сердца
- Г) печени

777. [T005479] ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ АНГИНЫ ЧЕРЕЗ

- А) 1-2 недели
- Б) 3-4 дня
- В) 1-2 дня
- Г) 1-2 месяца

778. [T005480] ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

- А) утром на лице
- Б) утром на ногах
- В) вечером на ногах
- Г) вечером на лице

779. [T005481] РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза
- Б) гидроперикард
- В) увеличение живота
- Г) гидроторакс

780. [T005482] ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ МОЧА ИМЕЕТ ЦВЕТ

- А) "мясных помоев"
- Б) "пива"
- В) соломенно-желтый
- Г) бесцветный

781. [T005483] МОЧА ЦВЕТА "МЯСНЫХ ПОМОЕВ" ОБУСЛОВЛЕНА СОДЕРЖАНИЕМ

БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА

- А) эритроцитов
- Б) лейкоцитов
- В) цилиндров
- Г) бактерий

782. [T005484] ДЛЯ СБОРА МОЧИ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ

- А) сухой банкой
- Б) сухой пробиркой
- В) стерильной банкой
- Г) стерильной пробиркой

783. [T005485] ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ОБЪЕМА СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ В МЛ

- А) олигурия
- Б) анурия
- В) полиурия
- Г) протеинурия

784. [T005486] ПОД АНУРИЕЙ ПОНИМАЮТ

- А) отсутствие мочи
- Б) нормальное количество мочи
- В) преобладание ночного диуреза над дневным
- Г) много мочи

785. [T005487] ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ОТРАЖАЮТСЯ В

- А) гематурии, протеинурии, цилиндрурии
- Б) гематурии, глюкозурии, цилиндрурии
- В) лейкоцитурии, протеинурии, цилиндрурии
- Г) лейкоцитурии, протеинурии, бактериурии

786. [T005488] ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЖИМ

- А) строгий постельный
- Б) постельный
- В) палатный
- Г) общий

787. [T005489] ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЗНАЧАЮТ

- А) до исчезновения отеков и нормализации АД
- Б) до исчезновения боли в поясничной области
- В) до нормализации анализов мочи
- Г) до нормализации температуры тела

788. [T005490] ДИЕТА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ

- А) жидкости и соли
- Б) белков и углеводов
- В) белков и жиров
- Г) жидкости и углеводов

789. [T005491] ПОД НИКТУРИЕЙ ПОНИМАЮТ

- А) преобладание ночного диуреза над дневным
- Б) увеличение суточного количества мочи более 2000 мл
- В) уменьшение суточного количества мочи менее 500 мл
- Г) болезненное мочеиспускание

790. [T005492] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- А) антибиотики, гормоны, дезагреганты
- Б) анальгетики, спазмолитики
- В) нитраты, сердечные гликозиды
- Г) сульфаниламиды, нитрофураны

791. [T005493] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ОТНОСИТСЯ

- А) восходящая инфекция мочевых путей
- Б) нерациональное питание

В) переохлаждение

Г) стрессы

792. [T005494] ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ

А) чашечки

Б) клубочки

В) канальцы и клубочки

Г) канальцы

793. [T005495] ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ОБЫЧНО ВЫЯВЛЯЮТСЯ

А) боль в пояснице, дизурия, лихорадка

Б) жажда, полиурия, полидипсия

В) диспепсия, боль в правом подреберье

Г) слабость, кожный зуд, артралгии

794. [T005496] ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

А) лейкоцитурия, бактериурия

Б) гематурия, протеинурия

В) глюкозурия, цилиндрурия

Г) глюкозурия, протеинурия

795. [T005497] РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

А) экскреторная урография

Б) томография

В) хромоцистоскопия

Г) ирригоскопия

796. [T005498] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) хроническая кровопотеря

Б) дефицит витаминов

В) избыточное употребление углеводов

Г) избыточное употребление белков

797. [T005499] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЮТСЯ СЛАБОСТЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ИЗВРАЩЕНИЕ ВКУСА И ОБОНЯНИЯ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

А) железодефицитная анемия

Б) хронический лейкоз

В) острый лейкоз

Г) В12-дефицитная анемия

798. [T005500] ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ

А) бледные

Б) гиперемированные

В) желтушные

Г) цианотичные

799. [T005501] ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ПО ЦВЕТОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

А) гипохромная

Б) гиперхромная

В) нормохромная

Г) гемолитическая

800. [T005502] ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В АНАЛИЗЕ КРОВИ НАБЛЮДАЮТСЯ

А) снижение гемоглобина и цветового показателя

Б) лейкопения, уменьшение СОЭ

В) лейкоцитоз, увеличение СОЭ

Г) увеличение гемоглобина и эритроцитов

801. [T005503] К ПРЕПАРАТАМ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТНОСЯТ

А) феррум-лек

Б) тотема

В) ферроплекс

Г) мальтофер

802. [T005504] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) мальтофер
- Б) аскорутин
- В) панзинорм
- Г) цианокобаламин

803. [T005505] ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) аскорбиновую кислоту
- Б) цианокобаламин
- В) ретинол
- Г) эргокальциферол

804. [T005506] К НОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАТОЩАК (ММОЛЬ/Л) ОТНОСЯТ

- А) 3,3-5,5
- Б) 2,2-3,3
- В) 1,1-2,2
- Г) 6,6-8,8

805. [T005507] ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ

- А) гормонов Т3, Т4, ТТГ
- Б) гемоглобина, цветового показателя
- В) лейкоцитов, СОЭ
- Г) инсулина, глюкагона

[T005508] ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ ЙОДА В ПИЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ

- А) эндемический зоб
- Б) ожирение
- В) сахарный диабет
- Г) диффузный токсический зоб

807. [T005509] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЙОДИРОВАТЬ

- А) хлеб, поваренную соль
- Б) крупы, молоко
- В) растительное масло, маргарин
- Г) сахар, конфеты

808. [T005510] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ БОЛЕЕ 5 ЛИТРОВ ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) сахарный диабет
- Б) диффузный токсический зоб
- В) гипотиреоз
- Г) эндемический зоб

809. [T005511] К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТ

- А) жажда, кожный зуд
- Б) отеки, боли в пояснице
- В) сухой кашель, одышка
- Г) снижение памяти, запоры

810. [T005512] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) гипергликемия
- Б) гипопропротеинемия
- В) гиперпротеинемия
- Г) гипербилирубинемия

811. [T005513] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) глюкозурия
- Б) бактериурия
- В) фосфатурия
- Г) пиурия

812. [T005514] К ОСЛОЖНЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСИТСЯ

- А) кетоацидотическая кома
- Б) гипертонический криз
- В) отек легких
- Г) легочное кровотечение

813. [T005515] К ПРЕПАРАТАМ, ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ, ОТНОСЯТ

- А) антибиотики
- Б) диуретики
- В) гипотензивные
- Г) цитостатики

814. [T005516] К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КРАПИВНИЦЫ ОТНОСЯТ

- А) сыпь, кожный зуд
- Б) одышка, сухой кашель
- В) тошнота, рвота
- Г) боль за грудиной, одышка

815. [T005517] СЫПЬ ПРИ КРАПИВНИЦЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

- А) на любых участках тела
- Б) на туловище
- В) на конечностях
- Г) на лице

816. [T005518] ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ АНТИСЕПТИКИ В ХИРУРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) Листер
- Б) Пирогов
- В) Пастер
- Г) Дьяконов

817. [T005519] ПОД ГЕМАТОМОЙ ПОНИМАЮТ СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В

- А) тканях и органах
- Б) плевральной полости
- В) полости перикарда
- Г) полости сустава

818. [T005520] РЕЗУС-КОНФЛИКТ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И ПЛОДОМ ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ КРОВЬ

- А) матери - резус-отрицательная, а плода - резус-положительная
- Б) матери и плода - резус-положительная
- В) матери и плода - резус-отрицательная
- Г) матери - резус-положительная, а плода - резус-отрицательная

819. [T005521] ДОСТОВЕРНЫМ (АБСОЛЮТНЫМ) ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) патологическая подвижность
- Б) отек
- В) местное повышение температуры
- Г) боль

820. [T005522] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отсутствие активных движений в суставе
- Б) боль
- В) отек
- Г) патологическая подвижность

821. [T005523] ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отек мягких тканей в зоне перелома
- Б) абсолютное укорочение конечности
- В) деформация
- Г) крепитация

822. [T005524] САМЫМ ТОЧНЫМ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОЖОГА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) метод Постникова
- Б) правило "девятки"
- В) правило ладони
- Г) спиртовая проба

823. [T005525] АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нахождение суставного конца в необычном месте
- Б) гематома в зоне перелома
- В) крепитация
- Г) отек мягких тканей сустава

824. [T005526] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) транспортная иммобилизация
- Б) наложение гипсовой повязки
- В) применение скелетного вытяжения
- Г) наложение жгута

825. [T005528] К ВОЗРАСТНЫМ ИНТЕРВАЛАМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, В КОТОРЫХ ПОВЫШЕН РИСК РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ХРОМОСОМНЫМИ АНОМАЛИЯМИ, ОТНОСЯТ

- А) 35 -45 лет
- Б) 20-25 лет
- В) 15-18 лет
- Г) 25-35 лет

826. [T005529] РЕЗУС-КОНФЛИКТА МАТЕРИ И ПЛОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- А) выкидышу, мертворождению
- Б) врожденным уродствам
- В) хромосомным аномалиям
- Г) олигофрении

827. [T005530] К ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКАМ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ ХОРИОНА ОТНОСЯТ

- А) 10-13 недель
- Б) 4-6 недель
- В) 7-9 недель
- Г) 14-16 недель

[T005531] ПОД ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПОНИМАЮТ

- А) комплекс мероприятий, направленный на предупреждение рождения или зачатия больного ребенка
- Б) комплекс мероприятий, направленный на предотвращение заболевания
- В) генотипическая коллекция дефекта
- Г) фенотипическая коллекция дефекта

829. [T005533] К ГРУППАМ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НЕ ОТНОСЯТСЯ

- А) беременные женщины
- Б) потребители инъекционных наркотиков
- В) мужчины, имеющие секс с мужчинами
- Г) коммерческие секс работники

830. [T005534] У БЕРЕМЕННЫХ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛО ПРОТЕКАЕТ

- А) вирусный гепатит Е
- Б) вирусный гепатит А
- В) вирусный гепатит С
- Г) вирусный гепатит В

831. [T005536] БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ГЕПАТИТА «А» ПРОТИВОПОКАЗАНО

- А) прерывание беременности
- Б) проведение любых лабораторных исследований
- В) применение глюкозо-солевых растворов
- Г) употребление в пищу кисломолочных продуктов

832. [T005539] ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛИХОРАДКОЙ ЗИКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ОПАСНО В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ У ПЛОДА

- А) микроцефалии
- Б) гемолитической анемии
- В) аутоиммунного гепатита
- Г) почечной недостаточности

833. [T005540] К ФОРМИРОВАНИЮ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ПРИВОДИТ ПЕРЕНЕСЁННАЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) краснуха
- Б) ВИЧ-инфекция
- В) пищевая токсикоинфекция
- Г) рожа

834. [T005541] ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ОТ ГРИППА ПРОВОДИТСЯ

- А) во 2 и 3 триместре
- Б) в 1 триместре
- В) только по жизненным показаниям
- Г) непосредственно перед родоразрешением

835. [T005543] ДЛЯ БРУЦЕЛЛЁЗА ХАРАКТЕРНО

- А) привычное невынашивание беременности
- Б) развитие преэклампсии и эклампсии
- В) спонтанная ремиссия во время беременности
- Г) тяжёлое течение в послеродовом периоде

836. [T005544] В РАМКАХ СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ НА НАЛИЧИЕ НВУ-ИНФЕКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ МАРКЁР

- А) HBs-ag
- Б) HBcor-ag
- В) anti-HBs
- Г) суммарные антитела

837. [T005545] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ К РЕБЁНКУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

- А) антиретровирусных препаратов
- Б) антибиотиков широкого спектра действия
- В) цитостатиков
- Г) синтетических аналогов женских половых гормонов

838. [T005546] ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) грудное вскармливание
- Б) приём антиретровирусных препаратов во время беременности
- В) плановое кесарево сечение
- Г) совместное пребывание матери и ребёнка в послеродовом периоде

839. [T005547] ПРИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ПОКАЗАНО

- А) проведение регидратации
- Б) применение антибиотиков широкого спектра действия
- В) прерывание беременности
- Г) введение антитоксической сыворотки по методу Безредко

840. [T005548] К ПРЕПАРАТУ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИЗЕНТЕРИИ У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

- А) цефтриаксон
- Б) ципрофлоксацин
- В) тетрацилин
- Г) гентамицин

841. [T005549] ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ АНТИТЕЛ К ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) иммунный блоттинг
- Б) бактериологический посев крови
- В) микроскопию толстой капли крови
- Г) реакцию Райта и Хеддельсона

842. [T005550] ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- А) гепатита С
- Б) дифтерии
- В) дизентерии
- Г) гепатита А

843. [T005551] ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ «Е» У БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) развитием печёночной недостаточности
- Б) преобладанием безжелтушных форм
- В) наиболее тяжёлым течением в 1 триместре
- Г) замедленным антителообразованием

844. [T005552] ПРИ ВРОЖДЁННОЙ КРАСНУХЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) катаракта, микроцефалия, пороки сердца
- Б) желтуха, увеличение печени и селезёнки

В) увеличение околоушных слюнных желёз, орхит, панкреатит

Г) триада Гетчинсона

845. [T005553] БЕРЕМЕННОСТЬ, НАСТУПИВШАЯ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА

«В»,

А) повышает риски обострения гепатита

Б) не влияет на течение гепатита

В) приводит к спонтанному выздоровлению

Г) способствует формированию токсического гепатита

846. [T005554] СПОСОБ РОДРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЗАВИСИТ ОТ

А) вирусной нагрузки

Б) ВИЧ-статуса полового партнёра

В) возраста

Г) срока гестации

847. [T005555] БЕРЕМЕННОСТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ

А) бешенства

Б) туберкулёза

В) ветряной оспы

Г) брюшного тифа

848. [T005556] ЗАРАЖЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД РОДАМИ ПРИВОДИТ К

А) врождённой ветрянке

Б) порокам развития плода

В) гипотрофии плода

Г) формированию вторичного иммунодефицита у новорождённого

849. [T005557] К ПРЕПАРАТУ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

А) озельтамивир

Б) анаферон

В) антигриппин

Г) ацикловир

850. [T005558] БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ

А) в левой подвздошной области

Б) в эпигастрии

В) в околопупочной области

Г) в правом подреберье

851. [T005559] ДЛЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА ХАРАКТЕРНО

А) жидкий, обильный, зловонный стул, имеющий вид «болотной тины»

Б) инкубационный период 10-14 суток

В) увеличение печени и селезенки

Г) нормальная температура тела

852. [T005560] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ХОЛЕРЫ ОТНОСИТСЯ

А) выраженная дегидратация

Б) стул в виде «малинового желе»

В) схваткообразные боли по ходу кишечника

Г) повышение температуры тела

853. [T005561] ВОЗБУДИТЕЛЬ ХОЛЕРЫ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДЕЛЕН

А) из рвотных масс

Б) из ликвора

В) из смывов носоглотки

Г) из мокроты

854. [T005562] НАИБОЛЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ СИМПТОМ БОТУЛИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ

А) параличи

Б) интоксикация

В) серозный менингит

Г) увеличение селезёнки

855. [T005563] ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКТИВНОГО ИММУНИТЕТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- А) анатаксины
- Б) антибиотики
- В) иммуноглобулины
- Г) сыворотки

856. [T005564] ХАРАКТЕРНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ «А» ЯВЛЯЕТСЯ

- А) водный
- Б) парентеральный
- В) половой
- Г) через укус комара

857. [T005565] СЫПЬ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ИМЕЕТ ХАРАКТЕР

- А) розеолезный, появляется на 8-10 день болезни в области живота и нижней части грудной клетки
- Б) розеолезно-петехиальный на туловище и верхних конечностях
- В) геморрагическая на бёдрах и пояснице
- Г) скарлатиноподобный со сгущением в естественных складках

858. [T005566] К СПИД-ИНДИКАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ НЕ ОТНОСИТСЯ

- А) гепатит В
- Б) токсоплазмоз
- В) пневмоцистная пневмония
- Г) саркома Капоши

859. [T005567] К ЗАРАЖЕНИЮ ЛЕПТОСПИРОЗОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

- А) купание в непроточном водоёме
- Б) укус клеща
- В) беспорядочные половые связи
- Г) употребление в пищу вяленой рыбы

860. [T005568] В ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ

- А) бруцеллёз
- Б) туляремия
- В) чума
- Г) сальмонеллёз

861. [T005569] К ВЕДУЩЕМУ КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ ЗЕВА ОТНОСЯТ

- А) отёк подкожной клетчатки шеи
- Б) распространение налётов за пределы миндалин
- В) увеличение регионарных лимфоузлов
- Г) поражение глаз

862. [T005570] ПРИ ВЫЯСНЕНИИ ЭПИДАНАМНЕЗА ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- А) при дизентерии – употребление немытых овощей и фруктов
- Б) при малярии - употребление сырого молока
- В) при сыпном тифе - употребление некипячёной воды
- Г) при иксодовом клещевом боррелиозе - укусы комаров

863. [T005571] ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ МЕНИНГОКОККЦЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) геморрагическая сыпь
- Б) симптом Кернига
- В) ригидность затылочных мышц
- Г) длительный субфебрилитет

864. [T005572] К ЛОКАЛИЗОВАННЫМ ФОРМАМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) менингококковый назофарингит
- Б) менингококкцемия
- В) смешанная форма
- Г) менингококковый менингит

865. [T005573] К ПЕРЕНОСЧИКАМ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ОТНОСЯТСЯ

- А) иксодовые клещи
- Б) лобковые вши
- В) песчаные блохи

Г) комары рода Anopheles

866. [T005574] ТИПИЧНЫМ КОЖНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кольцевидная эритема
- Б) уртикарная сыпь
- В) очаговая склеродермия
- Г) карбункул

867. [T005575] СИМПТОМОКОМПЛЕКС, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ БЕШЕНСТВА, ВКЛЮЧАЕТ

- А) гидрофобия, аэрофобия, фотофобия, акустикофобия
- Б) тошнота, повторная рвота, жидкий стул
- В) гиперемия зева, плотные налёты серого цвета
- Г) розеолезная сыпь, артралгия, распространенные отеки

868. [T005576] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) антирабическая вакцина
- Б) лечение больных бешенством животных
- В) экстренная антибиотикопрофилактика
- Г) антирабический анатоксин

869. [T005577] К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ МАЛЯРИЙНОГО ПАРОКСИЗМА ОТНОСЯТСЯ

- А) озноб, жар, пот
- Б) тошнота, рвота, диарея
- В) жажда, сухость во рту, олигоурия
- Г) бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение

870. [T005578] ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕШЕНСТВА НАИБОЛЕЕ ДЛИННЫЙ ПРИ УКУСЕ В ОБЛАСТИ

- А) голени
- Б) лица
- В) шеи
- Г) промежности

871. [T005579] РАЗВИТИЕ ОТЁКОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А) трихинеллёза
- Б) аскаридоза
- В) энтеробиоза
- Г) дифиллоботриоза

872. [T005580] ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ЧУМНОГО БУБОНА

- А) плотной консистенции, болезненный, периаденит
- Б) безболезненный, мягкий
- В) поражаются только заднешейные лимфоузлы
- Г) безболезненный, размер до 1 см

873. [T005581] ДЛЯ МЕСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РОЖЕ ХАРАКТЕРНЫ

- А) гиперемия с чёткими контурами
- Б) рыхлый отёк
- В) колликвационный некроз
- Г) кольцевидная эритема

874. [T005582] К ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ИНФЕКЦИИ ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

- А) хирургическое лечение карбункула
- Б) применение антибиотиков
- В) введение противосибирязвенного иммуноглобулина
- Г) повторное заражение

875. [T005638] НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ ПРИ СРОКЕ ГЕСТАЦИИ В НЕДЕЛЯХ ДО

- А) 37
- Б) 38
- В) 39
- Г) 40

876. [T005639] НЕДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ С МАССОЙ ТЕЛА В ГРАММАХ МЕНЕЕ

- А) 2500
- Б) 2700
- В) 2300
- Г) 2000

877. [T005643] ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ В ГРАДУСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 24 – 26
- Б) 26 – 28
- В) 18 – 20
- Г) 28 – 29

878. [T005646] К ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕДОНОШЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСИТСЯ

- А) непропорциональное телосложение
- Б) громкий крик
- В) мышечный гипертонус
- Г) кожа бархатистая, розовая

879. [T005655] «ЯДЕРНАЯ» ЖЕЛТУХА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ

- А) ЦНС
- Б) сердца
- В) легких
- Г) почек

880. [T005665] ПРИ РАХИТЕ НАРУШАЕТСЯ ОБМЕН

- А) кальция, фосфора
- Б) калия, магния
- В) калия, железа
- Г) кальция, железа

881. [T005666] ПОТЛИВОСТЬ И ОБЛЫСЕНИЕ ЗАТЫЛКА У РЕБЕНКА ДО 1 ГОДА НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ

- А) рахите
- Б) потнице
- В) опрелости
- Г) менингите

882. [T005669] ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ СПАЗМОФИЛИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) судороги
- Б) отеки
- В) запоры
- Г) кровоизлияния

883. [T005670] БРАХИЦЕФАЛИЯ, КОСОЙ РАЗРЕЗ ГЛАЗ, ПЛОСКОЕ ЛИЦО, ПОПЕРЕЧНАЯ СКЛАДКА НА ЛАДОНИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) болезни Дауна
- Б) фенилкетонурии
- В) гемофилии
- Г) рахита

884. [T005671] АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВСТАХИЕВОЙ ТРУБЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОТИТА У ДЕТЕЙ

- А) короткая и широкая
- Б) короткая и узкая
- В) длинная и широкая
- Г) длинная и узкая

885. [T005672] КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) апноэ
- Б) брадипноэ
- В) тахипноэ
- Г) асфиксия

886. [T005673] ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) одышка
- Б) боль в грудной клетке

В) лихорадка

Г) слабость

887. [T005679] ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

А) ринит

Б) отит

В) ларингит

Г) трахеит

888. [T005681] ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ ОСТРОМ ОТИТЕ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) боль в ухе

Б) кашель

В) одышка

Г) боль в грудной клетке

[T005688] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЗНАКОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) боль в животе

Б) повышение артериального давления

В) диарея

Г) потеря массы тела

890. [T005702] ВЫЯВЛЕНИЕ ЯИЦ В СОСКОБАХ КОЖИ ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

А) энтеробиоза

Б) аскаридоза

В) лямблиоза

Г) описторхоза

891. [T005706] ПОЯВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ОТЕКОВ, ГЕМАТУРИИ С ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

А) гломерулонефрита

Б) цистита

В) пиелонефрита

Г) нефроптоза

892. [T005725] КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

А) полифагия, полидипсия, полиурия

Б) лихорадка, кашель с мокротой, одышка

В) боль в пояснице, отеки, лихорадка

Г) тахикардия, тремор, экзофтальм

893. [T005726] ПЕРЕДОЗИРОВКА ИНСУЛИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВЕДЕТ К РАЗВИТИЮ КОМЫ

А) гипогликемической

Б) печеночной

В) уремической

Г) гипергликемической (диабетической)

[T005731] ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ИЗ ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ

А) конфеты

Б) кефир

В) нежирное мясо

Г) гречневую крупу

895. [T005733] ЗАПАХ АЦЕТОНА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ КОМЕ

А) диабетической

Б) гипогликемической

В) печеночной

Г) уремической

896. [T005734] ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗЫ

А) щитовидной

Б) поджелудочной

В) гипофиза

Г) вилочковой

897. [T005735] ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ИНСУЛИН ВВОДИТСЯ

А) подкожно

Б) внутривенно

В) внутримышечно

Г) внутрикожно

898. [T005736] ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ФОРМИРУЕТСЯ ИММУНИТЕТ

А) активный, естественный

Б) активный, искусственный

В) пассивный, искусственный

Г) пассивный, естественный

899. [T005737] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОРВИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) пневмония

Б) лейкоз

В) сахарный диабет

Г) туберкулез

900. [T005738] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СИМПТОМОВ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ОРВИ ПРИМЕНЯЮТ

А) обильное питье

Б) горчичники

В) оксигенотерапию

Г) обливание прохладной водой

901. [T005739] ПРИ ОРВИ В КАЧЕСТВЕ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ

А) противовирусные

Б) противокашлевые

В) отхаркивающие

Г) жаропонижающие

902. [T005740] ВОЗБУДИТЕЛЕМ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) вирус

Б) шигелла

В) пневмококк

Г) микобактерия

903. [T005741] ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА

А) слизистой щек

Б) лице

В) туловище

Г) конечностях

904. [T005742] ПЕРВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ ПРИ КОРИ У ДЕТЕЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА

А) лице

Б) туловище

В) руках

Г) ногах

905. [T005743] АКТИВНУЮ ИММУНИЗАЦИЮ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДЯТ ДЕТЯМ

А) живой коревой вакциной

Б) человеческим иммуноглобулином

В) туберкулином

Г) сывороткой

906. [T005744] КРАСНУХА, ВОЗНИКШАЯ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ОПАСНА РАЗВИТИЕМ

А) врожденных пороков у ребенка

Б) сахарного диабета у женщины

В) обострения пиелонефрита у женщины

Г) бронхиальной астмы у женщины

907. [T005746] ПОЛИМОРФИЗМ (ПЯТНО, ПАПУЛА, ВЕЗИКУЛА) ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

А) ветряной оспы

Б) кори

- В) краснухи
- Г) скарлатины

908. [T005748] УВЕЛИЧЕНИЕ ОКОЛОУШНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А) эпидемического паротита
- Б) краснухи
- В) кори
- Г) ветряной оспы

909. [T005750] ПРИСТУПООБРАЗНЫЙ СПАЗМАТИЧЕСКИЙ КАШЕЛЬ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- А) коклюша
- Б) ветряной оспы
- В) эпидемического паротита
- Г) риновирусной инфекции

910. [T005751] ПОЯВЛЕНИЕ ЯЗВОЧКИ НА УЗДЕЧКЕ ЯЗЫКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) коклюше
- Б) кори
- В) ветряной оспе
- Г) риновирусной инфекции

911. [T005752] ВОЗБУДИТЕЛЕМ СКАРЛАТИНЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) стрептококк
- Б) стафилококк
- В) протей
- Г) вирус

912. [T005753] АНГИНА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ

- А) скарлатины
- Б) ветряной оспы
- В) кори
- Г) гриппа

913. [T005754] ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бактерия
- Б) вирус
- В) микоплазма
- Г) хламидия

914. [T005755] АНТИТОКСИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА ПРИМЕНЯЕТСЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

- А) дифтерии
- Б) гриппа
- В) кори
- Г) полиомиелита

915. [T005758] ГЕПАТИТ А ВЫЗЫВАЕТСЯ

- А) вирусами
- Б) бактериями
- В) грибами
- Г) простейшими

916. [T005759] ВЫРАЖЕННАЯ СЕЗОННОСТЬ ГЕПАТИТА А ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПЕРИОД

- А) осенне-зимний
- Б) зимне-весенний
- В) весенне-летний
- Г) летне-осенний

917. [T005764] ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) парентеральный
- Б) фекально-оральный
- В) контактно-бытовой
- Г) водный

918. [T005765] ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИЗЕНТЕРИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) шигелла
- Б) эшерихия
- В) сальмонелла
- Г) энтеровирус

919. [T005766] ЖИДКИЙ СТУЛ С ПРИМЕСЬЮ СЛИЗИ И ПРОЖИЛОК КРОВИ У ДЕТЕЙ («РЕКТАЛЬНЫЙ ПЛЕВОК») ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- А) дизентерии
- Б) сальмонеллеза
- В) эшерихиоза
- Г) энтеровирусной инфекции

920. [T005767] ТЕНЕЗМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) дизентерии
- Б) сальмонеллеза
- В) дисбактериоза
- Г) колиинфекции

[T005768] ДЛЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРЕН СТУЛ В ВИДЕ

- А) «болотной тины»
- Б) «рисового отвара»
- В) «крахмальных зерен»
- Г) «горохового пюре»

922. [T005769] ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЫ МАНТУ ТУБЕРКУЛИН РЕБЕНКУ ВВОДЯТ

- А) внутрикожно
- Б) подкожно
- В) внутримышечно
- Г) внутривенно

923. [T005774] НЕЗАВИСИМЫМ СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) освобождение от стесняющей одежды
- Б) проведение оксигенотерапии
- В) введение бронхолитиков
- Г) введение глюкокортикоидов

924. [T005776] ОСНОВНЫМ ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ У ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ибупрофен
- Б) метамизол натрия (анальгин)
- В) ацетилсалициловая кислота
- Г) эпинефрин (адреналин)

925. [T005777] ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА РЕБЕНКУ ВВОДЯТ

- А) декстрозу (глюкозу)
- Б) инсулин короткого действия
- В) инсулин пролонгированного действия
- Г) хлоропирамин (супрастин)

926. [T005793] ПОД ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ ПОНИМАЮТ

- А) диагностику болезни у эмбриона или плода
- Б) мероприятия по предотвращению беременности при высоком риска рождения больного ребенка
- В) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития заболевания у ребенка
- Г) оценку риска развития заболевания будущего ребенка

927. [T005800] ВИТАМИН Д В ОРГАНИЗМЕ РЕГУЛИРУЕТ ОБМЕН

- А) минеральный
- Б) углеводный
- В) липидный
- Г) белковый

928. [T006026] НЕОТЛОЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ОТЁКЕ-НАБУХАНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) дыхание увлажнённым кислородом
- Б) гипербарическая оксигенация
- В) искусственная вентиляция лёгких
- Г) применение ноотропов

929. [T006029] ПРИ ОТЁКЕ-НАБУХАНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРОТИВОПОКАЗАНО

- А) быстрое снижение артериального давления
- Б) введение глюкокортикостероидов

В) самостоятельное дыхание

Г) применение диуретиков

930. [T006039] ПРИ БОТУЛИЗМЕ РАЗВИТИЕ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОБУСЛОВЛЕНО

А) параличом дыхательной мускулатуры

Б) поражением паренхимы лёгких

В) закупоркой дыхательных путей фибринозными плёнками

Г) выраженной интоксикацией

931. [T006040] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ НЕОБХОДИМО

А) обеспечить соблюдение строгого постельного режима

Б) перевести больного на парентеральное питание

В) изолировать в отдельную палату

Г) регулярно промывать желудок

932. [T006042] ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) асфиксия

Б) кожный зуд

В) судороги

Г) непроизвольное мочеиспускание

933. [T006044] АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЕТ

А) ужаление пчел

Б) укус клещей

В) укус комаров

Г) укус вшей

934. [T006054] НА СТАДИИ ИНФИЛЬТРАТА ПРИ ВОСПАЛЕНИИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ

А) холод

Б) разрез

В) тепло

Г) дренирование

935. [T006055] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ СЕРОЗНОГО МАСТИТА ПРИМЕНЯЮТ

А) холод, поддерживающую повязку

Б) обработку железы этиловым спиртом

В) повязку с фурацилином

Г) разрез, поддерживающую повязку

936. [T006056] КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ

А) два

Б) один

В) четыре

Г) три

937. [T006058] ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ ОТ СДАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ

А) обезболивание, тугое бинтование, иммобилизация, щелочное питье

Б) наложение жгута, сосудорасширяющие, согревание, слабокислое питье

В) обезболивание, наложение жгута, согревание, щелочное питье

Г) тугое бинтование, слабокислое питье, согревание

938. [T006063] ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

А) шиной Дитерихса

Б) воротником Шанца

В) гипсовой повязкой

Г) шиной Крамера

939. [T006064] ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЗАЩИТЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРА ЯВЛЯЕТСЯ

А) марлевая повязка, смоченная содовым раствором

Б) марлевая повязка, смоченная слабым раствором лимонной кислоты

В) сухая марлевая повязка

Г) промыть открытые участки кожи и глаза слабым раствором лимонной кислоты

940. [T006066] К СТЕПЕНИ "ГЛУБОКОГО" ОЖОГА ОТНОСИТСЯ СТАДИЯ

- А) Шб
- Б) П
- В) I
- Г) Ша

941. [T006067] К СРЕДСТВУ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ ОТНОСИТСЯ

- А) йодид калия
- Б) афин
- В) тарен
- Г) этаперазин

942. [T006069] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ГИПОКСИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ "УГАРНЫМ ГАЗОМ" ОТНОСИТСЯ

- А) образование в крови карбоксигемоглобина
- Б) образование в крови метгемоглобина
- В) образование в крови миоглобина
- Г) образование в крови оксигемоглобина

943. [T006070] ОЧЕРЕДНОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЭВАКУАЦИИ ПОРАЖЕННЫМ В СОСТОЯНИИ ШОКА

- А) первая
- Б) отсроченная
- В) не подлежат эвакуации
- Г) вторая

944. [T006071] ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ПОСТРАДАВШЕГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ

- А) запрокинута назад
- Б) согнута вперед
- В) повернута на бок
- Г) не имеет значения

945. [T006072] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) появление на коже трупных пятен
- Б) отсутствие самостоятельного дыхания
- В) отсутствие рефлексов
- Г) отсутствие сердечной деятельности

946. [T006073] К ГЛАВНОМУ ПРИЗНАКУ ОТЕКА ЛЕГКИХ ОТНОСИТСЯ

- А) kloкочущее дыхание, кашель с розовой пенистой мокротой
- Б) систолические шумы
- В) эмфизема легких
- Г) набухшие вены

[T006074] ПРИЗНАКОМ ОТЕКА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) судороги, рвотные движения.
- Б) kloкочущее дыхание
- В) набухшие сосуды
- Г) головная боль

948. [T006075] САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ БОРЬБЫ С ПЕНООБРАЗОВАНИЕМ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) вдыхание кислорода через пары спирта
- Б) озонотерапия
- В) ИВЛ
- Г) оксигенотерапия

949. [T006076] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ СМЕРТИ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ОТНОСИТСЯ

- А) фибрилляция желудочков сердца
- Б) угнетение дыхания
- В) кровотечения и переломы
- Г) отрыв конечностей

950. [T006077] ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) гангреной, омертвлением всех тканей
- Б) отеком, покалыванием
- В) гиперемией, болью

Г) мраморностью кожи

951. [T006078] К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КЛЮЧИЦЫ, ОТНОСИТСЯ

А) Дезо

Б) окклюзионная

В) спиральная

Г) черепашья

952. [T006079] К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ГОЛЕНОСТОПНЫХ СВЯЗОК, ОТНОСИТСЯ

А) восьмиобразная

Б) черепашья

В) уздечка

Г) колосовидная

953. [T006080] К ПОВЯЗКЕ, КОТОРАЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ РАНЕНИЯХ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ОТНОСИТСЯ

А) "чепец"

Б) т-образная

В) восьмиобразная

Г) уздечка

954. [T006081] ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, КРОВОПОТЕРЯ ЧАЩЕ СОСТАВЛЯЕТ

А) 1000-1500мл

Б) 900мл

В) 600-700мл

Г) 2000-2500 мл

955. [T006082] ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ

А) большой кровопотери

Б) длительного безводного периода

В) нарушения метаболизма

Г) стремительных родов

956. [T006083] К ПРИЧИНАМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСЯТСЯ

А) обширные ожоги

Б) пневмония

В) хронический цистит

Г) хронический гломерулонефрит

957. [T006085] К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ОТНОСЯТ

А) эвакуационно-транспортную, внутрипунктовую

Б) диагностическую

В) транспортную

Г) внутреннюю

958. [T006086] ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАВМ I СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХАРАКТЕРНО

А) судорожное сокращение мышц

Б) потеря сознания

В) расстройства дыхания и кровообращения

Г) клиническая смерть

959. [T006087] ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОТРАВМАМИ

А) госпитализируются скорой помощью

Б) направляются на прием к участковому врачу

В) не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении

Г) направляются на дополнительное обследование

960. [T006088] КЛИНИКА СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ И ОТЕКА ЛЕГКИХ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

А) острой левожелудочковой недостаточности

Б) острой правожелудочковой недостаточности

В) острой сосудистой недостаточности

Г) бронхиальной астме

961. [T006089] ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО С ШОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

А) положение с приподнятыми конечностями

Б) положение на боку

В) положение полусидя

Г) положение с приподнятым изголовьем

962. [T006091] ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

А) 10 литров воды

Б) 1 литров воды

В) 2 литров воды

Г) 5 литров воды

963. [T006092] БОЛЬНЫЕ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ

А) во всех случаях острых отравлений

Б) при тяжелом состоянии больного

В) в случаях, когда не удалось промыть желудок

Г) при бессознательном состоянии больного

964. [T006093] ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ АММИАКА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ

А) в нижние этажи и подвалы

Б) в верхние этажи зданий

В) на улицу

Г) оставаться на месте

965. [T006094] ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ ХЛОРА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ

А) в верхние этажи зданий

Б) оставаться на месте

В) на улицу

Г) в нижние этажи и подвалы

966. [T006096] ОБИЛЬНАЯ ПЕНИСТАЯ РОЗОВАЯ МОКРОТА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

А) отека легких

Б) пневмонии

В) легочного кровотечения

Г) кровохарканья

967. [T006099] НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА ПОСТРАДАВШЕГО ПРОВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ

А) лежа на спине на твердой поверхности

Б) произвольном

В) с опущенной вниз головой

Г) с приподнятый ножным концом

968. [T006101] К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

А) отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях

Б) отсутствие сознания, дыхания, аритмия

В) нарушение ритма дыхания, судороги, цианоз

Г) отсутствие сознания, расширенные зрачки, аритмия

969. [T006102] К МЕТОДУ РАБОТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО СВОЕВРЕМЕННО ОКАЗАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИ МАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИИ ПОРАЖЕННЫХ, ОТНОСЯТ

А) медицинскую сортировку

Б) оказание неотложной помощи

В) организованную эвакуацию

Г) выведение из очага

970. [T006103] К ОСЛОЖНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

А) перелом ребер

Б) перелом позвоночника

В) травма внутренних органов

Г) перелом нижней челюсти

971. [T006104] КАРДИОГЕННЫЙ ШОК МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

А) инфаркта миокарда

Б) кровотечения

В) обширных ожогов

Г) воздействия бактериальных токсинов

972. [T006105] ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ПОСТРАДАВШЕГО

- А) гиперемированные
- Б) желтушные
- В) бледные
- Г) цианотичные

973. [T006107] ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ С ОТСЛОЙКОЙ ЭПИДЕРМИСА И ОБРАЗОВАНИЕМ ПУЗЫРЕЙ СО СВЕТЛО-ЖЕЛТЫМ СОДЕРЖИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРМИЧЕСКИМ ОЖОГОМ

- А) 2 степени
- Б) 1 степени
- В) 3 степени
- Г) 4 степени

974. [T006108] К ПРЕПАРАТАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА, ОТНОСИТСЯ

- А) эпинефрин (адреналин)
- Б) мезатон
- В) фуросемид
- Г) метамизол натрия (анальгин)

975. [T006112] ВЕЛИЧИНА АД И ЧАСТОТА ПУЛЬСА РОДИЛЬНИЦЫ ПОМОГАЕТ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОЦЕНИТЬ

- А) стадии геморрагического шока
- Б) стадии ДВС -синдрома
- В) аномалию родовой деятельности
- Г) степень гипоксии плода

976. [T006114] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) угнетение центральной нервной системы
- Б) нарушение гемодинамика
- В) нарушение мочеиспускания
- Г) гипотермия

[T006115] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) быстрое воздействие на организм
- Б) соблюдение стерильности
- В) медленное постепенное влияние на организм
- Г) удобство применения

[T006116] ПАРЕНТЕРАЛЬНО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВВОДЯТ

- А) внутривенно, внутримышечно
- Б) через дыхательные пути
- В) в прямую кишку
- Г) через рот

979. [T006117] ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВЛИВАНИЯ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВЕНЫ

- А) локтевого сгиба
- Б) кисти
- В) стопы
- Г) головы

980. [T006118] ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ

- А) анафилактического шока
- Б) аллергический ринит
- В) крапивницы
- Г) покраснения

981. [T006120] К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ОТНОСЯТ

- А) желудочное кровотечение
- Б) отравление грибами
- В) отравление алкоголем
- Г) эндогенная интоксикация азотистыми шлаками

982. [T006121] КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ БЕЗЗОНДОВОГО ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА, (Л)

- А) 2-3
- Б) 0,1-0,5
- В) 3-5
- Г) 5-10

983. [Т006122] ПРИ КРОВОХАРКАНИИ И ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО:

- А) ставить банки и горчичники на грудную клетку
- Б) усадить и успокоить пациента
- В) положить пузырь со льдом на грудную клетку
- Г) приподнять головной конец туловища

984. [Т006123] ПОД ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ ПОНИМАЮТ ПИТАНИЕ

- А) минуя желудочно-кишечный тракт
- Б) через желудочный зонд
- В) с помощью питательных клизм
- Г) через гастростому

985. [Т006124] ПРИ КОРМЛЕНИИ ПАЦИЕНТА ПРИ ПОМОЩИ ЗОНДА ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) тонкий желудочный зонд
- Б) дуоденальный зонд
- В) толстый желудочный зонд
- Г) газоотводную трубку

986. [Т006125] ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ СОЗНАНИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА

- А) наличие у него дыхания и центрального пульса
- Б) поиск возможных медицинских документов
- В) поиск документов, удостоверяющих личность
- Г) общий осмотр

987. [Т006126] ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) травмы не совместимые с жизнью
- Б) онкологические заболевания
- В) старческий возраст
- Г) алкоголизм, наркомания

988. [Т006127] К ОСНОВНОМУ ДЕЙСТВИЮ ЭПИНЕФРИНА (АДРЕНАЛИНА) ВО ВРЕМЯ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) повышение возбудимости миокарда
- Б) появление злокачественной тахикардии
- В) понижение возбудимости миокарда
- Г) появление брадикардии

989. [Т006128] ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ 1 СТЕПЕНИ КРОВОПОТЕРЯ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 0,5 л
- Б) 1 л
- В) 1,5 л
- Г) 2 л

990. [Т006129] ПРИ НЕСТЕРПИМЫХ «КИНЖАЛЬНЫХ» БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

- А) анальгетики не вводят
- Б) можно вводить только ненаркотические анальгетики
- В) анальгетики можно давать таблетированно (таблетку рассосать или разжевать)
- Г) можно давать таблетки, содержащие анальгетики и спазмолитики одновременно (ревалгин)

991. [Т008828] ПЕРВИЧНЫМ ЗВЕНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ

- А) женская консультация
- Б) отделение гинекологии
- В) перинатальный центр
- Г) федеральный научно-исследовательский центр

992. [Т008829] ПЕРВИЧНЫМ ЗВЕНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ

- А) женская консультация

- Б) отделение гинекологии
- В) перинатальный центр
- Г) федеральный научно-исследовательский центр

993. [T008860] ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕВОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

- А) Приказ № 514н Минздрава России
- Б) Приказ № 353 Минздрава России
- В) Приказ № 689н Минздрава России
- Г) Приказ № 928 Минздрава России

994. [T008865] ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЕ ДЕВОЧКИ И ДЕВОЧКИ С ФАКТОРАМИ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) I
- Б) II
- В) III
- Г) IV

995. [T008872] ЖЕНЩИНЫ, НАБЛЮДАЮЩИЕСЯ ПО ПОВОДУ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ

- А) V
- Б) I
- В) II
- Г) III

996. [T008878] ЖЕНЩИНЫ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ

- А) 5
- Б) 2
- В) 1
- Г) 4

997. [T008879] ЖЕНЩИНЫ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ И БЕСПЛОДИЕМ ОТНОСЯТСЯ К ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ

- А) 5
- Б) 2
- В) 1
- Г) 4

998. [T008911] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С

- А) нейроэндокринными синдромами
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

[T008912] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С

- А) бесплодием
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

1000. [T008913] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С

- А) неправильным положением половых органов
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой
- Г) язвой желудка

1001. [T008914] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С

- А) доброкачественными заболеваниями шейки матки
- Б) запорами
- В) бронхиальной астмой

Г) язвой желудка

1002. [Т008915] ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ С

А) трихомонадным кольпитом

Б) запорами

В) бронхиальной астмой

Г) язвой желудка

1003. [Т008916] ЗАДАЧЕЙ АКУШЕРКИ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) выявление визуальных форм онкологических заболеваний

Б) проведение лапароскопии

В) проведение гистероскопии

Г) проведение вагиноскопии

1004. [Т008917] ЗАДАЧЕЙ АКУШЕРКИ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) проведение санитарно-просветительной работы

Б) проведение лапароскопии

В) проведение гистероскопии

Г) проведение вагиноскопии

1005. [Т008918] ДИАГНОЗЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ АКУШЕРКОЙ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ЯВЛЯЮТСЯ

А) ориентировочными

Б) окончательными

В) заключительными

Г) дополнительными

1006. [Т008919] ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА УСТАНОВЛИВАЕТ

А) врач соответствующего профиля

Б) акушерка

В) медицинская сестра

Г) медицинский регистратор

1007. [Т008920] ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

А) с 8:00 до 20:00 ч

Б) с 10:00 до 20:00 ч

В) с 10:00 до 18:00 ч

Г) с 8:00 до 24:00 ч

1008. [Т008921] РАБОТА ГОРОДСКИХ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

А) 2 смены

Б) 3 смены

В) 1 смену

Г) 4 смены

1009. [Т008922] ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В СУББОТНИЕ ДНИ

А) с 8:00 до 18:00 ч

Б) с 10:00 до 20:00 ч

В) с 10:00 до 18:00 ч

Г) с 8:00 до 10:00 ч

1010. [Т008923] ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

А) с 8:00 до 18:00 ч

Б) с 10:00 до 20:00 ч

В) с 10:00 до 18:00 ч

Г) с 8:00 до 10:00 ч

1011. [Т008925] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

А) по методам контрацепции

Б) по санаторно-курортному лечению

В) по физиотерапии

Г) по лечебной гимнастике

1012. [Т008926] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

А) работу с женщинами группы риска наступления нежелательной беременности

Б) консультирование по санаторно-курортному лечению

В) консультирование по методам физиотерапии

Г) консультирование по методам лечебной гимнастике

1013. [T008927] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

А) мониторинг репродуктивного поведения женщин после родов и абортов

Б) консультирование по санаторно-курортному лечению

В) консультирование по физиотерапии

Г) консультирование по лечебной гимнастике

1014. [T008928] РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

А) использование современных методов контрацепции

Б) консультирование по санаторно-курортному лечению

В) консультирование по физиотерапии

Г) консультирование по лечебной гимнастике

1015. [T008929] ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СПИСКИ

А) женщин прикрепленного района

Б) всех жителей прикрепленного района

В) детей прикрепленного района

Г) инвалидов прикрепленного района

1016. [T008930] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗЕРВОМ

А) снижения онкологических заболеваний женских половых органов

Б) повышения госпитализаций

В) повышения иммунизации

Г) снижения частоты вирусных инфекций

1017. [T008931] УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНИТАЛИЙ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВОДЯТ

А) 1 раз в год

Б) 2 раз в год

В) 3 раз в год

Г) 4 раз в год

1018. [T008932] ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ АНАЛИЗИРУЮТ ПО ДАННЫМ

А) профилактической работы и ее результатов

Б) санаторно-курортного лечения

В) физиотерапевтического лечения

Г) паллиативного лечения

1019. [T008933] ПОД ВНЕДРЕНИЕМ ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ЯЙЦЕКЛЕТКИ В ЭНДОМЕТРИЙ ПОНИМАЮТ

А) имплантацию

Б) овуляцию

В) секрецию

Г) менструацию

1020. [T008934] ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ГЕМОГЛОБИНА ЯВЛЯЕТСЯ

А) дыхательная

Б) выработка антител

В) выделительная

Г) свертывающая

1021. [T008935] БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В МОЧЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ КАК

А) пиурию

Б) глюкозурию

В) полиурию

Г) гематурию

1022. [T008936] ВЫДЕЛЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МОЧИ НОСИТ НАЗВАНИЕ

А) полиурия

Б) изостенурия

В) олигурия

Г) гипостенурия

1023. [T008937] ПРИ ОСМОТРЕ ВНЕШНИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ МОЖНО ВЫЯВИТЬ

А) рак кожи

Б) рак эндометрия

В) опухоль ячников

Г) рак мочевого пузыря

1024. [T008938] ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК НЕ ИМЕЕТ

А) ворсинок

Б) сальниковых отростков

В) гаустр

Г) продольных мышечных лент

1025. [T008939] В СОСТАВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ВХОДИТ _____ КИШКА

А) ободочная

Б) тощая

В) подвздошная

Г) 12-перстная

1026. [T008940] АППЕНДИКС ВЫПОЛНЯЕТ _____ ФУНКЦИЮ

А) иммунную

Б) пищеварительную

В) депонирующую

Г) кроветворную

1027. [T008942] СЛИЗИСТАЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА СОДЕРЖИТ

А) солитарные фолликулы, бокаловидные клетки

Б) пейеровы бляшки

В) круговые складки

Г) пилорические железы

1028. [T008943] ОБКЛАДОЧНЫЕ КЛЕТКИ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА ВЫРАБАТЫВАЮТ

А) соляную кислоту

Б) гастрин

В) пепсиноген

Г) мукоидный секрет

1029. [T008944] В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ ПРОИСХОДИТ

А) расщепление и всасывание питательных веществ

Б) механическая обработка питательных веществ

В) расщепление питательных веществ с помощью микрофлоры

Г) оценка качества питательных веществ

1030. [T008945] В СОСТАВ СЛЮНЫ ВХОДЯТ ФЕРМЕНТЫ РАСЩЕПЛЯЮЩИЕ

А) углеводы

Б) нуклеиновые кислоты

В) жиры

Г) белки

1031. [T008946] ОСОБЕННОСТЬЮ СТРОЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ТОНКОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

А) кишечных ворсинок, пейеровых бляшек, круговых складок

Б) продольных складок

В) кишечных полей

Г) полулунных складок

1032. [T008949] БИФУРКАЦИЯ ТРАХЕИ НА ДВА ГЛАВНЫХ БРОНХА ПРОИСХОДИТ НА УРОВНЕ ПОЗВОНКОВ

А) 4-5 грудных

Б) 7 шейного - 1 грудного

В) 2-3 грудных

Г) 6-7 грудных

1033. [T008950] АНТИТЕЛАМИ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЛКИ

А) глобулины

Б) альбумины

В) ферменты

Г) фибриноген

1034. [T008951] АНТИГЕНЫ СИСТЕМЫ РЕЗУС РАСПОЛОЖЕНЫ НА

- А) эритроцитах
- Б) белках
- В) тромбоцитах
- Г) лейкоцитах

1035. [T008952] К АГГЛЮТИНОГЕНАМ I ГРУППЫ КРОВИ ОТНОСЯТ

- А) 0
- Б) АВ
- В) А
- Г) В

1036. [T008953] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЭРИТРОЦИТА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 120 дней
- Б) 40 дней
- В) 80 дней
- Г) 20 дней

1037. [T008954] АЛЬБУМИНЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

- А) поддержание онкотического давления
- Б) фагоцитоз
- В) постоянство температуры тела
- Г) сохранение постоянства осмотического давления

1038. [T008955] ОКСИТОЦИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

- А) гипофизе
- Б) надпочечниках
- В) вилочковой железе
- Г) эпифизе

1039. [T008956] АГГЛЮТИНОГЕНЫ СОДЕРЖАТСЯ В

- А) эритроцитах
- Б) тромбоцитах
- В) плазме
- Г) сыворотке

1040. [T008957] АГГЛЮТИНИНЫ СОДЕРЖАТСЯ В

- А) плазме
- Б) эритроцитах
- В) тромбоцитах
- Г) лейкоцитах

1041. [T008958] СДВИГ РЕАКЦИИ КРОВИ В ЩЕЛОЧНУЮ СТОРОНУ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) алкалоз
- Б) ацидоз
- В) пиноцитоз
- Г) гемостаз

1042. [T008959] ПОД ГЕМАТОКРИТОМ ПОНИМАЮТ ОТНОШЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ К

- А) плазме
- Б) лейкоцитам
- В) сыворотке
- Г) тромбоцитам

1043. [T008960] ЯИЧНИКОВЫЕ АРТЕРИИ ОТХОДЯТ ОТ

- А) брюшной аорты
- Б) почечной артерии
- В) внутренней подвздошной артерии
- Г) нижней брыжеечной артерии

1044. [T008961] СДВИГ РЕАКЦИИ КРОВИ В КИСЛУЮ СТОРОНУ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) ацидоз
- Б) гемостаз
- В) алкалоз
- Г) пиноцитоз

1045. [T008962] В 1 МКЛ КРОВИ ЖЕНЩИНЫ В НОРМЕ СОДЕРЖИТСЯ ЭРИТРОЦИТОВ

- А) 4.0-4.5
- Б) 3-4

В) 6-7

Г) 7-8

1046. [T008963] ПОД ФИБРИНОГЕНОМ В КРОВИ ПОНИМАЮТ БЕЛОК, КОТОРЫЙ

А) растворен в плазме

Б) содержится в эритроцитах

В) содержится в лейкоцитах

Г) способствует кровотоку

1047. [T008964] К АГГЛЮТИНИНАМ IV ГРУППЫ ОТНОСИТСЯ

А) 0

Б) альфа, бета

В) альфа

Г) бета

1048. [T008965] КЛЕТКИ КРОВИ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПОДВИЖНОСТЬЮ, НОСЯТ НАЗВАНИЕ

А) лейкоциты

Б) эритроциты

В) тромбоциты

Г) фибриноген

1049. [T008966] К АГГЛЮТИНОГЕНАМ II ГРУППЫ КРОВИ ОТНОСИТСЯ

А) А

Б) АВ

В) 0

Г) В

1050. [T008967] ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЯИЧНИКА СОЕДИНЯЕТСЯ С

А) широкой маточной связкой

Б) маткой

В) боковой стенкой таза

Г) круглой маточной связкой

1051. [T008968] ВРЕМЯ ПОЛНОГО СВЕРТЫВАНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (МИН)

А) 3-5

Б) 1-3

В) 5-7

Г) 7-9

1052. [T008969] АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ БЕЛОК

А) фибриноген

Б) гепарин

В) альбумин

Г) глобулин

1053. [T008970] ИЗ ОБЩЕГО СОСТАВА КРОВИ ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВЛЯЮТ (%)

А) 40-45

Б) 35-39

В) 46-50

Г) 51-55

1054. [T008971] ИЗ ОБЩЕГО СОСТАВА КРОВИ ПЛАЗМА СОСТАВЛЯЕТ (%)

А) 55-60

Б) 50-54

В) 61-65

Г) 66-70

1055. [T008973] СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНЫХ ТРУБ ПРЕДСТАВЛЕНА ЭПИТЕЛИЕМ

А) цилиндрическим мерцательным

Б) железистым

В) кубическим

Г) плоским

1056. [T008974] НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ НОСИТ НАЗВАНИЕ

А) энурез

Б) гематурия

- В) пиурия
- Г) глюкозурия

1057. [T008976] ЕМКОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЕТ В ПРЕДЕЛАХ (МЛ)

- А) 250-500
- Б) 500-700
- В) 100-200
- Г) 1000-1300

1058. [T008977] К ЭЛЕМЕНТУ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- А) синусовый узел, предсердно-желудочковый узел, пучок Гиса, ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье
- Б) симпатические и парасимпатические нервы
- В) венечный синус, ушки предсердий
- Г) сосочковые мышцы, сухожильные нити

1059. [T008978] В ВОРОТНУЮ ВЕНУ ОТТЕКАЕТ ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ ОТ

- А) кишечника
- Б) почки
- В) надпочечников
- Г) диафрагмы

1060. [T008979] НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ СЛИЯНИИ ВЕН

- А) общих подвздошных
- Б) поясничных
- В) селезеночных
- Г) печеночных

1061. [T008980] В НОРМЕ ГЛАВНЫМ ВОДИТЕЛЕМ РИТМА СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) синусно-предсердный узел
- Б) предсердно-желудочковый узел
- В) предсердно-желудочковый пучок
- Г) волокна Пуркинье

1062. [T008981] ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ КЛАПАНОМ

- А) двустворчатым (митральным)
- Б) четырехстворчатым
- В) трехстворчатым
- Г) полулунным

1063. [T008982] САМЫМ КРУПНЫМ НЕРВОМ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) седалищный
- Б) запираательный
- В) бедренный
- Г) срединный

1064. [T008983] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЖЕНЩИН В СМОТРОВЫХ КАБИНЕТАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- А) акушерка
- Б) онколог
- В) медицинская сестра
- Г) терапевт

1065. [T008984] РЕГЛАМЕНТИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА СОСТАВЛЯЕТ (МИН)

- А) 15
- Б) 30
- В) 40
- Г) 60

1066. [T008985] ОПТИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ СОСТАВЛЯЕТ (%)

- А) 40-60
- Б) 15-20
- В) 20-30
- Г) 80-90

1067. [T008986] ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ

КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гигрометр
- Б) термометр
- В) барометр
- Г) анемометр

1068. [Т008987] ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) барометр
- Б) термометр
- В) анемометр
- Г) гигрометр

1069. [Т008988] ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ ($^{\circ}\text{C}$)

- А) 22-25
- Б) 18-20
- В) 15-18
- Г) 27-28

1070. [Т008989] К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) медицинская карта стационарного больного
- Б) бланк экстренного извещения
- В) направление на санаторно-курортное лечение
- Г) направление в стационар

1071. [Т008990] СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) водным балансом
- Б) суточным диурезом
- В) дневным диурезом
- Г) никтурией

1072. [Т008991] КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕРЕТСЯ

- А) утром натощак
- Б) после завтрака
- В) в любое время дня
- Г) на ночь

1073. [Т008992] ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ (МИН)

- А) 10
- Б) 5
- В) 7
- Г) 3

1074. [Т008993] ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ БАЗАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЯМОЙ КИШКЕ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ (МИН)

- А) 7-10
- Б) 11-12
- В) 5-6
- Г) 3-5

1075. [Т008994] ЧАСТОТА ПУЛЬСА У ВЗРОСЛОГО В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (УДАРОВ В МИН)

- А) 60-80
- Б) 90-100
- В) 40-60
- Г) 100-110

1076. [Т008995] В НОРМЕ ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 16-20
- Б) 10-12
- В) 22-26
- Г) 28-32

1077. [Т008996] ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ОТРАЖАЕТ

- А) соотношение массы тела (кг) к длине тела (м^2)

Б) соотношение длины тела (m^2) к массе тела (кг)

В) соотношение массы тела (кг) к возрасту (лет)

Г) соотношение длины тела (m^2) к возрасту (лет)

1078. [Т008997] ЗА ТРИ ДНЯ ДО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ

А) молоко, овощи, черный хлеб

Б) гречневую кашу, гранат

В) яйца, белый хлеб, шоколад

Г) мясо, рыбу, творог

1079. [Т008998] ПРИЗНАКИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

А) боль, ощущение жжения при мочеиспускании

Б) увеличение суточного диуреза

В) увеличение частоты мочеиспускания в ночное время

Г) моча соломенно-желтого цвета

1080. [Т008999] РАЗНОСТЬ МЕЖДУ СИСТОЛИЧЕСКИМ И ДИАСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

А) пульсовым давлением

Б) максимальным артериальным

В) минимальным артериальным

Г) дефицитом пульса

1081. [Т009000] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (ММ.РТ.СТ.)

А) 40-50

Б) 60-89

В) 80-100

Г) 100-139

1082. [Т009001] МАКСИМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ

А) систолическим

Б) диастолическим

В) аритмическим

Г) пульсовым

1083. [Т009002] К ФАКТОРУ, СНИЖАЮЩЕМУ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТНОСИТСЯ

А) уменьшение объема циркулирующей крови

Б) повышение потребления поваренной соли

В) применение сосудосуживающих средств

Г) прием алкоголя

1084. [Т009003] МИНИМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ

А) диастолическим

Б) аритмическим

В) пульсовым

Г) систолическим

1085. [Т009004] КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

А) апноэ

Б) брадипноэ

В) тахипноэ

Г) асфиксия

1086. [Т009005] ПО НАПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧАЮТ ПУЛЬС

А) полный, пустой

Б) ритмичный, аритмичный

В) скорый, медленный

Г) твердый, мягкий

1087. [Т009006] УЧАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

А) тахипноэ

Б) брадипноэ

В) тахикардия

Г) брадикардия

1088. [Т009007] ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ВОЗНИКАЕТ ОДЫШКА

А) физиологическая

- Б) смешанная
- В) патологическая
- Г) инспираторная

1089. [T009008] СУБЪЕКТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДЫХАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ НЕПРИЯТНЫМ ОЩУЩЕНИЕМ НЕХВАТКИ ВОЗДУХА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) удушьем
- Б) бронхиальной астмой
- В) диспноэ
- Г) сердечной астмой

1090. [T009009] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА БЫВАЕТ НИЖЕ

- А) утром
- Б) днем
- В) вечером
- Г) после физической нагрузки

1091. [T009010] В МЕСТАХ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТСУТСТВИЕ

- А) гиперемии, припухлости
- Б) волосяного покрова
- В) родинок
- Г) пигментных пятен

1092. [T009011] СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) лизис
- Б) фебрилитет
- В) кризис
- Г) субфебрилитет

1093. [T009012] В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ

- А) бланк экстренного извещения УФ№ 058\у
- Б) медицинскую карту стационарного больного
- В) статистическую карту, выбывшего из стационара
- Г) журнал приема и регистрации больных

1094. [T009013] ОПРЕЛОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) воспалением кожи в области естественных складок
- Б) некротическим повреждением ткани
- В) воспалением мышечной ткани
- Г) воспалением подкожно- жировой клетчатки

1095. [T009014] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОСТА ПАЦИЕНТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) ростомер
- Б) тонометр
- В) урومتر
- Г) динамометр

1096. [T009015] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ПАЦИЕНТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) весы
- Б) тонометр
- В) урومتر
- Г) динамометр

1097. [T009207] ГНОЕВИДНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) гонореи
- Б) трихомонадной инфекции
- В) сифилиса
- Г) кандидоза

1098. [T009219] ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ С ЦЕЛЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НАЗНАЧАЮТ КОМБИНИРОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ

- А) сразу после аборта
- Б) через 1 месяц

В) через 2 месяца

Г) через 3 месяца

1099. [T009222] КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ НАЧАВШЕГОСЯ АБОРТА ЯВЛЯЕТСЯ

А) кровянистые выделения из половых путей

Б) нависание сводов влагалища

В) болезненность придатков матки при пальпации

Г) положительный френникус-симптом

1100. [T009223] ОДНИМ ИЗ РАННИХ СИМПТОМОВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) контактное кровотечение

Б) нарушение мочеиспускания

В) гематурия

Г) симптом Щёткина-Блюмберга

1101. [T009227] ВОЗБУДИТЕЛЕМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) стафилококк

Б) хламидия

В) гонококк

Г) трихомонада

1102. [T009228] ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО САЛЬПИНГООФОРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А) переход в хроническую форму

Б) эндоцервицит

В) развитие хронического кольпита

Г) развитие хронического цистита

1103. [T009230] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

А) презерватив

Б) прерванный половой акт

В) влагалищная диафрагма

Г) шеечные колпачки

1104. [T009231] БАРТОЛИНИТ ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПАЛЕНИЕМ

А) желез предверия влагалища

Б) яичниковой ткани

В) молочных желез

Г) параректальной клетчатки

1105. [T009232] ВНУТРИМАТОЧНЫЙ КОНТРАЦЕПТИВ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ

А) воспалительных заболеваниях половых органов

Б) резус-отрицательной принадлежности крови пациента

В) низкой массе тела

Г) ожирении

1106. [T009233] К ГРУППЕ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ, ОТНОСЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ

А) ведущие беспорядочную половую жизнь

Б) работающие в детских лечебных учреждениях

В) не живущие половой жизнью

Г) страдающие гипертонией

1107. [T009234] ОСЛОЖНЕНИЕМ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) невынашивание беременности

Б) миома матки

В) эндометриоз

Г) увеличение подмышечных лимфоузлов

1108. [T009262] ОПЕРАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) миомэктомия

Б) тубэктомия

В) овариоэктомия

Г) сальпингоэктомия

1109. [T009263] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) хирургический

Б) медикаментозный

В) физиотерапевтический

Г) санаторно-курортный

1110. [T009264] ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДИСМЕНОРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) медикаментозный

Б) хирургический

В) физиотерапевтический

Г) санаторно-курортный

1111. [T009265] ОТСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ НАЗЫВАЕТСЯ

А) аменореей

Б) дисменореей

В) ациклическим маточным кровотечением

Г) меноррагией

1112. [T009266] СКУДНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ НАСТУПАЮЩИЕ В СРОК НАЗЫВАЮТСЯ

А) гипоменореей

Б) гиперменореей

В) полименореей

Г) альгоменореей

1113. [T009267] ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ, НАСТУПАЮЩИЕ В СРОК, С КРОВОПОТЕРЕЙ БОЛЕЕ 150 МЛ, НАЗЫВАЮТСЯ

А) гиперменореей

Б) олигоменореей

В) альгоменореей

Г) гипоменореей

1114. [T009268] ДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ БОЛЕЕ 7 ДНЕЙ НАЗЫВАЮТСЯ

А) полименореей

Б) гиперменореей

В) альгоменореей

Г) гипоменореей

1115. [T009269] ОБИЛЬНЫЕ МЕНСТРУАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С АЦИКЛИЧЕСКИМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ НАЗЫВАЮТСЯ

А) менометроррагией

Б) полименореей

В) альгоменореей

Г) гипоменореей

1116. [T009270] МЕЖМЕНСТРУАЛЬНЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ НАЗЫВАЮТСЯ

А) метроррагией

Б) менометроррагией

В) полименореей

Г) альгоменореей

1117. [T009271] КОРОТКИЕ (ЦИКЛИЧЕСКИЕ) МЕНСТРУАЦИИ НАЗЫВАЮТСЯ

А) олигоменореей

Б) метроррагией

В) менометроррагией

Г) полименореей

1118. [T009272] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ЯВЛЯЕТСЯ

А) изменение цикличности, объема и длительности менструального кровотечения

Б) резкая боль внизу живота

В) патологические выделения из половых путей

Г) иррадиация боли в прямую кишку

1119. [T009273] ОТСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) физиологической аменореей

Б) фармакологической аменореей

В) ложной аменореей

Г) психогенной аменореей

1120. [T009274] ОТСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) физиологической аменореей

Б) фармакологической аменореей

- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

1121. [T009275] ОСТУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАЗЫВАЕТСЯ

- А) физиологической аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

1122. [T009276] ОСТУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ ДО ПЕРИОДА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ ПЕРИОД НАЗЫВАЕТСЯ

- А) физиологической аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) ложной аменореей
- Г) психогенной аменореей

1123. [T009277] АМЕНОРЕЯ ПРИ АТРЕЗИИ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ложной аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) физиологической аменореей
- Г) психогенной аменореей

1124. [T009278] АМЕНОРЕЯ ПРИ ЗАРАЩЕНИИ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ложной аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) физиологической аменореей
- Г) психогенной аменореей

1125. [T009279] АМЕНОРЕЯ ПРИ ЗАРАЩЕНИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ложной аменореей
- Б) фармакологической аменореей
- В) физиологической аменореей
- Г) психогенной аменореей

1126. [T009345] ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОТ ПАЦИЕНТКИ

- А) письменное согласие
- Б) денежное вознаграждение
- В) словесную благодарность
- Г) карту больного

1127. [T009346] СПОСОБОМ ОБРАБОТКИ РУК ПЕРЕД БИМАНУАЛЬНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гигиенический
- Б) хирургический
- В) не требует обработки
- Г) обработка ладонной поверхности антисептиком

1128. [T009348] КАЖДОЕ ПРЕДМЕТНОЕ СТЕКЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВНО ДЕЛИТСЯ НА КОЛИЧЕСТВО ЧАСТЕЙ

- А) 3
- Б) 2
- В) 4
- Г) 5

1129. [T009378] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ

- А) состояние внутренней половых органов и связанного аппарата
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

1130. [T009379] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ

- А) положение, величину, болезненность матки
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

1131. [T009380] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ

- А) состояние придатков матки
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

1132. [T009381] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ

- А) состояние связанного аппарата малого таза
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

1133. [T009382] ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ

- А) состояние внутренних половых органов
- Б) степень развитости мышц брюшного пресса
- В) состояние лимфоузлов
- Г) состояние прямой кишки

1134. [T009414] УКРОЧЕНИЕ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ ВЛАГАЛИЩНЫХ СВОДОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) внутрибрюшного кровотечения
- Б) острого холецистита
- В) кишечной непроходимости
- Г) миомы матки

1135. [T009415] УКРОЧЕНИЕ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ ВЛАГАЛИЩНЫХ СВОДОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) острого воспаления с явлениями пельвиоперитонита
- Б) острого панкреатита
- В) кишечной непроходимости
- Г) миомы матки

1136. [T009421] ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ФОРМОЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) трубная беременность
- Б) яичниковая беременность
- В) брюшная беременность
- Г) межсвязочная беременность

1137. [T009423] ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) профилактика осложнений и реабилитация
- Б) назначение лечения
- В) общение с родственниками
- Г) беседы с пациенткой

1138. [T009424] ФАЗОЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ПРИ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) первая
- Б) вторая
- В) середина цикла
- Г) не зависит от фазы

1139. [T009425] «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) УЗИ и определение хорионального гонадотропина человека в сыворотке крови
- Б) бимануальное исследование
- В) осмотр в зеркалах
- Г) кульдоцентез

1140. [T009426] РАЗРЫВ ЯИЧНИКА, СВЯЗАННЫЙ С РАЗРЫВОМ ФОЛЛИКУЛА В ПЕРИОД ОВУЛЯЦИИ ИЛИ РАЗРЫВОМ ЖЕЛТОГО ТЕЛА, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) апоплексия яичника
- Б) киста яичника
- В) опухоль яичника
- Г) яичниковая беременность

1141. [T009428] ДЛЯ НАРУШЕННОЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРНО

А) приступ резких болей внизу живота с иррадиацией в прямую кишку в сочетании с нарушением менструального цикла

Б) боль в промежности

В) скудные кровянистые выделения из половых путей

Г) увеличение живота

1142. [Т009431] ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕРЕКРУТ НОЖКИ КИСТЫ ЯИЧНИКА МОЖНО ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ

А) кисту яичника

Б) миому матки

В) прерывание беременности

Г) роды

1143. [Т009433] ЗАПОДОЗРИТЬ НЕКРОЗ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ

А) миому матки

Б) прерывание беременности

В) роды

Г) кисту яичника

1144. [Т009434] ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

А) получить письменное согласие пациентки на экстренное оперативное вмешательство

Б) накормить пациентку

В) напоить пациентку

Г) побеседовать с родственниками

1145. [Т009435] ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

А) получить письменное согласие пациентки на плановое оперативное вмешательство

Б) накормить пациентку

В) напоить пациентку

Г) побеседовать с родственниками

1146. [Т009436] ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕРЕКРУТ НОЖКИ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА МОЖНО У ПАЦИЕНТКИ, ИМЕЮЩЕЙ В АНАМНЕЗЕ

А) опухоль яичника

Б) миому матки

В) прерывание беременности

Г) роды

1147. [Т009437] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ РОЖДЕНИИ СУБМУКОЗНОГО УЗЛА МОЖЕТ БЫТЬ

А) выворот матки

Б) разрыв матки

В) разрыв промежности

Г) выпадение петель кишечника

1148. [Т009438] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

А) через третье лицо вызвать врача

Б) приготовить теплую грелку

В) дать слабительное

Г) ввести анальгетики

1149. [Т009440] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

А) по назначению врача готовить пациентку к экстренной операции

Б) приготовить теплую грелку

В) дать слабительное

Г) ввести анальгетики

1150. [Т009442] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

А) вызвать лаборанта

Б) приготовить теплую грелку

В) дать слабительное

Г) ввести анальгетики

1151. [Т009443] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

А) оповестить операционных сестер

Б) приготовить теплую грелку

В) дать слабительное

Г) ввести анальгетики

1152. [T009444] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) вызвать дополнительных сотрудников
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

1153. [T009445] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) по показаниям провести пункцию и катетеризацию второй периферической вены
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

1154. [T009446] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) набрать кровь для анализов
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

1155. [T009447] ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) установить катетер в мочевого пузырь
- Б) приготовить теплую грелку
- В) дать слабительное
- Г) ввести анальгетики

1156. [T009454] НЕЗАВИСИМЫМ ДЕЙСТВИЕМ АКУШЕРКИ ПРИ МАТОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) положить холод на низ живота
- Б) произвести выскабливание полости матки
- В) ввести сокращающие матку средства
- Г) ввести кровоостанавливающие препараты

1157. [T009455] ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ПОДСЛИЗИСТОЙ МИОМЫ МАТКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) обильные длительные, болезненные менструации
- Б) скудные, безболезненные менструации
- В) межменструальные кровянистые выделения
- Г) обильные пенистые выделения из половых путей

1158. [T009456] КАЖДУЮ ОБНАРУЖЕННУЮ ОПУХОЛЬ ЯИЧНИКА СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК

- А) потенциально злокачественную
- Б) воспалительную
- В) доброкачественную
- Г) злокачественную

1159. [T009457] К ОСЛОЖНЕНИЯМ КИСТ ЯИЧНИКОВ ОТНОСИТСЯ

- А) перекрут ножки с разрывом капсулы
- Б) рост кисты до больших размеров
- В) ущемление соседних органов
- Г) малигнизация кист

1160. [T009458] ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ НЕОБХОДИМО

- А) цитологическое исследование аспирата из полости матки
- Б) лапароскопия
- В) пункция заднего свода влагалища
- Г) бактериоскопия

1161. [T009459] ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) биопсия шейки матки с последующим гистологическим исследованием
- Б) лапароскопия
- В) пункция заднего свода влагалища
- Г) бактериоскопия

1162. [T009460] ПРИОРИТЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ АКУШЕРКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ У ПАЦИЕНТКИ НА ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

- А) направление на консультацию к онкологу
- Б) проведение кольпоскопии

В) проведение лабораторного исследования

Г) приглашение на повторный прием

1163. [Т009461] НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ХОРИОНКАРЦИНОМА ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ

А) пузырного заноса

Б) абортов

В) родов

Г) выкидышей

1164. [Т009463] ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ПОКАЗАНА ПРИ

А) перекруте ножки опухоли

Б) трихомонадном кольпите

В) гиперплазии эндометрия

Г) кандидамикозе

1165. [Т009464] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРИЧИНОЙ ВНУТРЕННЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) нарушенная внематочная беременность

Б) трихомонадный кольпит

В) гиперплазия эндометрия

Г) кандидамикоз

1166. [Т009466] ГНОЙ ПРИ ПУНКЦИИ ЗАДНЕГО СВОДА ВЛАГАЛИЩА УКАЗЫВАЕТ НА

А) пельвиоперитонит

Б) острый эндометрит

В) гиперплазию эндометрия

Г) внематочную беременность

1167. [Т009467] ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТОМ НАЗЫВАЕТСЯ

А) воспаление брюшины малого таза

Б) воспаление околоматочной клетчатки

В) воспаление придатков

Г) воспаление матки

1168. [Т009468] ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗРЫВА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ФОРМИРУЕТСЯ

А) острая анемия

Б) пельвиоперитонит

В) абсцесс

Г) матка Кувелера

1169. [Т009469] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) лапароскопия

Б) кульдоцентез

В) гистероскопия

Г) кольпоскопия

1170. [Т009470] ДЛЯ РАСЧЕТА ШОКОВОГО ИНДЕКСА АЛЬГОВЕРА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ

А) тонометр

Б) тазометр

В) стетоскоп

Г) фонендоскоп

1171. [Т009471] ПОД ТЕРМИНОМ «ОСТРЫЙ ЖИВОТ» ПОНИМАЕТСЯ

А) клинический симптомокомплекс

Б) симптом

В) заболевание

Г) хроническая патология

1172. [Т009472] СОЧЕТАНИЕ МАТОЧНОЙ И ВНЕМАТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛОДНОГО ЯЙЦА НАЗЫВАЕТСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

А) гетеротопической

Б) эктопической

В) истмической

Г) фимбриальной

1173. [Т009473] К ОСТРЫМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ

ОРГАНОВ ОТНОСИТСЯ

- А) эндометрит
- Б) перекрут ножки опухоли яичника
- В) внематочная беременность
- Г) кровотечение из наружных половых органов

1174. [Т009475] ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- А) перфорации матки
- Б) эндометрите
- В) воспалении придатков матки
- Г) перекруте ножки опухоли яичника

1175. [Т009490] ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- А) внематочной беременности
- Б) перекруте ножки опухоли яичника
- В) эндометрите
- Г) воспалении придатков матки

1176. [Т009506] ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) раннее выявление и лечение воспалительных заболеваний женских половых органов
- Б) отказ от алкоголя
- В) наличие постоянного полового партнёра
- Г) отказ от спазмолитиков

1177. [Т009518] ИСКУССТВЕННЫЙ АБОРТ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВНЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) внебольничный/криминальный аборт
- Б) опасный аборт
- В) домашний аборт
- Г) несоответствующий медицинским стандартам аборт

1178. [Т009528] РЕЗКОЕ УСИЛЕНИЕ БОЛИ В ЖИВОТЕ ПРИ БЫСТРОМ СНЯТИИ ПАЛЬПИРУЮЩЕЙ РУКИ С ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПОСЛЕ НАДАВЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ

- А) Щёткина-Блюмберга
- Б) Раздольского
- В) Образцова
- Г) Мерфи

1179. [Т009833] ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА

- А) установления диагноза
- Б) поступления в стационар
- В) начала заболевания
- Г) начала подготовки к операции

1180. [Т009834] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) подготовка пациента к операции
- Б) улучшение состояния пациента
- В) установление точного диагноза
- Г) оформление пациента в стационар

1181. [Т009835] ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

- А) с момента начала операции
- Б) с момента окончания операции
- В) в день операции
- Г) за 30 минут до операции

1182. [Т009836] ПОСЛЕДНИМ ПРИЕМОМ ПИЩИ ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ, НАЧИНАЮЩЕЙСЯ В 9 ЧАСОВ УТРА, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) легкий ужин накануне операции
- Б) обед накануне операции
- В) завтрак в день операции
- Г) перед сном накануне операции

1183. [Т009837] СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ

- А) в день операции
- Б) непосредственно перед операцией
- В) за сутки до операции
- Г) накануне операции

1184. [Т009838] ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА

- А) окончания операции
- Б) установления диагноза
- В) начала операции
- Г) через сутки после операции

1185. [Т009839] ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) остановка сердца
- Б) нагноение раны
- В) лигатурные свищи
- Г) плевропневмония

1186. [Т009840] ОТДАЛЕННЫЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ

- А) выписки из стационара
- Б) снятия швов
- В) окончания операции
- Г) наложения швов

1187. [Т009841] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ БЕЗ ВСКРЫТИЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА БОЛЬНОМУ РАЗРЕШАЕТСЯ ПИТЬ ЧЕРЕЗ

- А) 2 часа после операции
- Б) 6 часов после операции
- В) 24 часа после операции
- Г) 12 часов после операции

1188. [Т009842] ПРЕМЕДИКАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) утром перед операцией
- Б) во время операции
- В) сразу после операции
- Г) через сутки после операции

1189. [Т009844] БРИТЬЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) утром в день операции
- Б) утром накануне операции
- В) вечером накануне операции
- Г) за двое суток до операции

1190. [Т009846] ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

- А) подачей пациента в операционную
- Б) непосредственно по окончании операции
- В) накануне операции
- Г) после установления точного диагноза

1191. [Т009847] ЭКСТРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- А) в ближайшие часы
- Б) в ближайшие дни
- В) в ближайшие недели
- Г) в ближайшие месяцы

1192. [Т009848] ПОД РЕЗЕКЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ

- А) удаление части органа
- Б) выскабливание полостей
- В) полное удаление органа
- Г) удаление периферической части органа

1193. [Т009849] ПОД ЭКСТИРПАЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ

- А) полное удаление органа
- Б) удаление любой части органа
- В) выскабливание полостей
- Г) удаление патологически измененных тканей

1194. [Т009850] ПОД АМПУТАЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ

- А) удаление периферической части тела

- Б) полное удаление органа
- В) удаление любой части органа
- Г) удаление инородного тела

1195. [T009851] ПОД ИССЕЧЕНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ

- А) удаление патологически измененных тканей
- Б) полное удаление органа
- В) удаление периферической части органа
- Г) дренирование патологического очага

1196. [T009852] ВАРИАНТОМ НОРМЫ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА В 1-Е СУТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) субфебрильная температура
- Б) тромбозы и эмболии
- В) парез кишечника
- Г) острое кровотечение

1197. [T009853] ОПЕРАТИВНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

- А) радикальные
- Б) паллиативные
- В) симптоматические
- Г) пробные

1198. [T009854] К ОПЕРАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ТОЛЬКО ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО, ОТНОСИТСЯ

- А) паллиативная
- Б) симптоматическая
- В) пробная
- Г) радикальная

1199. [T009855] ЭНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пероральный
- Б) инъекционный
- В) подкожный
- Г) ингаляционный

1200. [T009856] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) болевой синдром
- Б) бессонница
- В) беременность
- Г) период лактации

1201. [T009857] ПРОМЕДОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) наркотических анальгетиков
- Б) транквилизаторов
- В) антибиотиков
- Г) муколитиков

1202. [T009858] К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ, КУПИРУЮЩЕМУ ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ОТНОСИТСЯ

- А) сальбутамол
- Б) промедол
- В) фраксипарин
- Г) амоксиклав

1203. [T009860] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЭТАМЗИЛАТ НАТРИЯ ПРОЯВЛЯЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) гемостатическое
- Б) желчегонное
- В) иммуномодулирующее
- Г) диуретическое

1204. [T009861] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НАЗНАЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- А) феррум лек

- Б) лазикс
- В) фурагин
- Г) дифлюкан

1205. [T009862] ВЕРОШПИРОН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) диуретиков
- Б) спазмолитиков
- В) транквилизаторов
- Г) ненаркотических анальгетиков

1206. [T009863] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА КЛОНИДИН (КЛОФЕЛИН) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гипотензивное
- Б) нейролептическое
- В) обезболивающее
- Г) противоаллергическое

1207. [T009864] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ПРЕДНИЗОЛОН ЯВЛЯЕТСЯ

- А) противовоспалительное
- Б) иммуномодулирующее
- В) местноанестезирующее
- Г) гемостатическое

1208. [T009865] ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК ПРИМЕНЯЮТ РАСТВОР

- А) гибитана
- Б) перманганата калия
- В) йодоната
- Г) пероксида водорода

1209. [T009866] К СЛАБИТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) бисакодил
- Б) анаприлин
- В) бисептол
- Г) амоксиклав

1210. [T009867] К ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) зиртек
- Б) фраксипарин
- В) амосин
- Г) нитрофурил

1211. [T009868] К УТЕРОТОНИЗИРУЮЩИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) метилэргометрин
- Б) гепарин натрия
- В) дротаверин (но-шпа)
- Г) кларитин

1212. [T009869] К ПРЕДОПЕРАЦИОННОМУ ПЕРИОДУ ОТНОСИТСЯ

- А) время, прошедшее от поступления пациента в медицинскую организацию до начала операции
- Б) время, прошедшее от поступления пациента в приемный покой до времени оформления ее в палату
- В) время, прошедшее от вызова бригады скорой медицинской помощи до начала операции
- Г) время, прошедшее от назначения лабораторного обследования до начала операции

1213. [T009870] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ

- А) от нескольких минут до 50 минут
- Б) от 50 минут до нескольких дней
- В) от нескольких дней до месяца
- Г) от одного до нескольких месяцев

1214. [T009871] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА

- А) малые и большие
- Б) малые, средние и большие
- В) легкие и сложные
- Г) легкие, средней сложности и сложные

1215. [T009872] ПО СРОЧНОСТИ ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА

А) неотложные, срочные и плановые

Б) несрочные и быстрые

В) внеплановые и отсроченные

Г) внеплановые и запланированные

1216. [Т009873] НЕОТЛОЖНЫЕ (ЭКСТРЕННЫЕ) ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

А) немедленно или через 2-4 часа после поступления в стационар

Б) через 24-48 часов после поступления в стационар

В) через 8-10 дней после поступления в стационар

Г) через 48-72 часа после поступления в стационар

1217. [Т009874] СРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

А) через 24-48 часов после поступления в стационар

Б) через 2-4 часа после поступления в стационар

В) через 48-72 часа после поступления в стационар

Г) через 8-10 дней после поступления в стационар

1218. [Т009875] СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТСРОЧЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ

А) несколькими днями после поступления в стационар

Б) несколькими часами после поступления в стационар

В) несколькими неделями после поступления в стационар

Г) несколькими минутами после поступления в стационар

1219. [Т009876] МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДЯТСЯ

А) влагалищным доступом под обезболиванием

Б) влагалищным доступом без обезболивания

В) трансабдоминальным путем под обезболиванием

Г) трансабдоминальным путем без обезболивания

1220. [Т009877] ВЛАГАЛИЩНЫМ ДОСТУПОМ ПОД ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ ПРОВОДЯТ

А) малые гинекологические операции

Б) большие гинекологические операции

В) лапароскопические гинекологические операции

Г) средние гинекологические операции

1221. [Т009878] РАЗДЕЛЬНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВЫСКАБЛИВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ ОТНОСЯТ К

А) малым гинекологическим операциям

Б) большим гинекологическим операциям

В) лапароскопическим гинекологическим операциям

Г) средним гинекологическим операциям

1222. [Т009879] АСПИРАЦИЮ ЭНДОМЕТРИЯ ОТНОСЯТ К

А) малым гинекологическим операциям

Б) большим гинекологическим операциям

В) лапароскопическим гинекологическим операциям

Г) средним гинекологическим операциям

1223. [Т009880] НОЖЕВУЮ БИОПСИЮ ШЕЙКИ МАТКИ ОТНОСЯТ К

А) малым гинекологическим операциям

Б) большим гинекологическим операциям

В) лапароскопическим гинекологическим операциям

Г) средним гинекологическим операциям

1224. [Т009881] ПОЛИПЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К

А) малым гинекологическим операциям

Б) большим гинекологическим операциям

В) лапароскопическим гинекологическим операциям

Г) средним гинекологическим операциям

1225. [Т009882] УДАЛЕНИЕ РОДИВШЕГОСЯ МИОМАТОЗНОГО УЗЛА ОТНОСЯТ К

А) малым гинекологическим операциям

Б) большим гинекологическим операциям

В) лапароскопическим гинекологическим операциям

Г) средним гинекологическим операциям

1226. [Т009883] ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЮ ОТНОСЯТ К

А) малым гинекологическим операциям

- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1227. [T009884] КРИОДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1228. [T009885] ЛАЗЕРНУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1229. [T009886] РАДИОВОЛНОВУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА НА ШЕЙКЕ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1230. [T009887] ХИРУРГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СРОКОМ ДО 12 НЕД ОТНОСЯТ К

- А) малым гинекологическим операциям
- Б) большим гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1231. [T009888] ТУБЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1232. [T009889] ОВАРИЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1233. [T009890] НАДВЛАГАЛИЩНУЮ АМПУТАЦИЮ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1234. [T009891] ЭКСТИРПАЦИЮ МАТКИ ОТНОСЯТ К

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1235. [T009892] ПАНГИСТЕРЭКТОМИЮ ОТНОСЯТ К

- А) большим гинекологическим операциям
- Б) малым гинекологическим операциям
- В) лапароскопическим гинекологическим операциям
- Г) средним гинекологическим операциям

1236. [T009893] КВАРЦЕВАНИЕ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ

- А) дезинфекции
- Б) дератизации
- В) дезинсекции
- Г) стерилизации

1237. [T009894] ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ

- А) облегчения боли
- Б) для лучшего отхождения мокроты
- В) для удобства проведения манипуляции
- Г) в силу ослабленного состояния

1238. [Т009895] ПРИЕМ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ПАЦИЕНТОМ ПРОВОДИТСЯ С ЧАСТОТОЙ 1 РАЗ В

- А) 7 дней
- Б) 2 недели
- В) день
- Г) 10 дней

1239. [Т009896] ДЛЯ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ПРОЛЕЖНЕЙ ХАРАКТЕРНО

- А) устойчивая гиперемия, не проходящая после прекращения давления, кожный покров не нарушен
- Б) разрушение кожного покрова, жидкие выделения из раны
- В) нарушение целостности кожи, отслойка эпидермиса
- Г) образование полости с повреждением в ней нижележащих тканей

1240. [Т009897] ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

- А) клеенку, судно, салфетки, кувшин, корнцанг, воду
- Б) таз, раствор антисептика, шприц Жане, ватные тампоны, корнцанг
- В) грушевидный баллон, корнцанг, ватные тампоны, раствор антисептика
- Г) кувшин, корнцанг, таз, раствор антисептика, кружку Эсмарха

1241. [Т009899] ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОДДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) трахеостома
- Б) илеостома
- В) гастростома
- Г) эпицистостома

1242. [Т009900] ДЛЯ РАЗЖИЖЕНИЯ СЛИЗИ В ТРАХЕОСТОМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ НЕОБХОДИМО ЗАКАПАТЬ СТЕРИЛЬНЫЙ РАСТВОР

- А) 0,9% р-р натрия хлорида
- Б) 3% р-р перекиси водорода
- В) 1% р-р новокаина
- Г) 10% р-р натрия хлорида

1243. [Т009901] ПОЛНАЯ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА ВКЛЮЧАЕТ

- А) дезинсекцию, дезинфекцию, гигиеническую ванну или душ
- Б) дезинсекцию, дезинфекцию, обмывание частей тела
- В) дезинсекцию, дезинфекцию, обтирание частей тела
- Г) обмывание или обтирание отдельных частей тела

1244. [Т009903] НА ТРАХЕОСТОМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ С ЦЕЛЬЮ УВЛАЖНЕНИЯ НАКЛАДЫВАЮТ САЛФЕТКУ, СМОЧЕННУЮ

- А) дистиллированной водой
- Б) 0,5% раствором перманганата калия
- В) 3% раствором перекиси водорода
- Г) 0,9% раствором хлорида натрия

1245. [Т009904] НЕОХОДИМУЮ ДИЕТУ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗНАЧАЕТ

- А) лечащий врач
- Б) пациент
- В) диетсестра
- Г) медицинская сестра

1246. [Т009905] ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ЭНТЕРАЛЬНЫМИ ПРИЕМАМИ ПИЩИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ БОЛЕЕ

- А) 4 часов
- Б) 5 часов
- В) 6 часов
- Г) 3 часов

1247. [Т009906] ИЗДЕЛИЕМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) система для инфузионной терапии

Б) дуоденальный зонд

В) катетер

Г) поильник

1248. [T009907] ПРЕПАРАТОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ПАРАНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

А) липофундин

Б) викасол

В) диклофенак

Г) реополиглюкин

1249. [T009908] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЕЛКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) постинъекционный инфильтрат

Б) кровотечение

В) гипотензия

Г) аппендицит

1250. [T009909] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

А) первые дни после операции на желудочно-кишечном тракте

Б) постановка лекарственной клизмы

В) задержка стула более 48 часов

Г) подготовка к инструментальному исследованию

1251. [T009910] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) травма мочевого пузыря и мочеиспускательного канала

Б) появление отеков

В) острая задержка мочи более 6 часов

Г) недержание мочи

1252. [T009911] ПОД РАСТРОЙСТВОМ ПРОЦЕССА МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОНИМАЕТСЯ

А) дизурия

Б) олигоурия

В) полиурия

Г) никтурия

1253. [T009912] ХАРАКТЕРНЫМИ СИМПТОМАМИ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

А) рвота «кофейной гущей» и «дегтеобразный стул»

Б) понижение артериального давления, головокружение

В) нитевидный пульс, слабость

Г) слабость, головокружение, обморок

1254. [T009913] ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

А) применении пузыря со льдом на область эпигастрия

Б) постановке очистительной клизмы

В) постановке горячей грелки на область эпигастрия

Г) укладывании пациента на левый бок

1255. [T009915] МЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВВЕДЕННЫЕ

А) в ухо

Б) через рот

В) посредством лекарственной клизмы

Г) под язык

1256. [T009916] ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ СНОТВОРНОЕ

А) за 30 мин до сна

Б) до еды

В) после еды

Г) за 2 часа до сна

1257. [T009917] ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПУТЕМ ИХ ВДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

А) ингаляцией

Б) инъекцией

В) впрыскиванием

Г) компрессом

1258. [Т009918] К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ

А) стерильные растворы

Б) капсулы

В) драже

Г) мази

1259. [Т009919] РЕЖУЩЕ-КОЛЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ УТИЛИЗИРУЮТ

А) в непрокальваемые контейнеры однократного применения

Б) в непрокальваемые контейнеры многократного применения

В) в мягкую тару

Г) в разобранном и измельченном виде

1260. [Т009920] ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ДОПУСКАЮТСЯ

А) лица, достигшие 18 лет и прошедшие инструктаж по технике безопасности

Б) младший медицинский персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности

В) технический персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности

Г) клининговые компании

1261. [Т009921] ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОРЫ

А) 0,25% р-р новокаин, 0,9% р-р натрия хлорид

Б) 2% р-р новокаин, 0,9% р-р натрия хлорид

В) 2% р-р новокаин, 10,0% р-р натрия хлорид

Г) 0,25% р-р новокаин, 10,0% р-р натрия хлорид

1262. [Т009922] ПАЦИЕНТКЕ, ГОТОВЯЩЕЙСЯ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ, АКУШЕРКА ЗАПЛАНИРУЕТ БРИТЬЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

А) утром в день операции

Б) вечером накануне операции

В) за 1 сутки до операции

Г) на операционном столе

1263. [Т009923] НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО АКУШЕРКИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

А) оказании помощи пациенту в самообслуживании

Б) постановке инъекции антибиотиков каждые 4 часа

В) смене дренажа

Г) назначении пациенту рациональной диеты

1264. [Т009924] ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА

А) органах малого таза

Б) сердце

В) печени

Г) почках

1265. [Т009925] ПРИОРИТЕТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) чувство страха

Б) дефицит самоухода

В) недооценка тяжести своего состояния

Г) беспокойство за оставленную работу

1266. [Т009926] ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПАЦИЕНТУ ПРОВОДЯТ

А) полную санитарную обработку

Б) обтирание кожи и смену белья

В) частичную санитарную обработку

Г) частичную санитарную обработку и смену белья

1267. [Т009927] ПРИ ПРИЕМЕ ПИЩИ БОЛЬНЫМ ЗА 40 МИНУТ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ

А) удалить содержимое желудка через зонд

Б) отложить операцию на сутки

В) вызвать рвоту

Г) назначить слабительное

1268. [T009928] ПОСТАНОВКА ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ

- А) противопоказана
- Б) необходима в любом случае
- В) необходима за 1 час
- Г) необходима непосредственно перед операцией

1269. [T009929] ОСЛОЖНЕНИЕМ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) рвота
- Б) эвентрация кишечника
- В) бронхопневмония
- Г) лигатурный свищ

1270. [T009930] ПРИЗНАКОМ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гиперемия, отек, усиление боли
- Б) промокание повязки кровью
- В) выхождение кишечных петель под кожу
- Г) побледнение краев

1271. [T009931] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ НЕОБХОДИМО

- А) снять несколько швов, дренировать рану
- Б) наложить сухую стерильную повязку
- В) ввести наркотический анальгетик
- Г) наложить повязку с ихтиоловой мазью

1272. [T009932] ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ТРОМБОЗОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) активном послеоперационном ведении больного, применении антикоагулянтов
- Б) соблюдении строгого постельного режима, применении антикоагулянтов
- В) применении солевых кровезаменителей
- Г) применении баночного массажа на грудную клетку

1273. [T009933] ОСНОВНЫМ В УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМ С ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) санация трахеобронхиального дерева
- Б) противокашлевые средства
- В) профилактика пролежней
- Г) питание через зонд

1274. [T009934] ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬНОГО В ОПЕРАЦИОННУЮ ПРОВОДИТСЯ

- А) лежа на каталке
- Б) самостоятельно больным
- В) сидя на коляске
- Г) под руку медицинским персоналом

1275. [T009935] ПОЛОЖЕНИЕМ БОЛЬНОГО В ПОСТЕЛИ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) лежа на спине без подушки, голова повернута набок
- Б) лежа с опущенным головным концом
- В) полусидя, с опорой на подушку
- Г) лежа на боку без подушки

1276. [T009936] ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО

- А) вызвать мочеиспускание рефлекторно
- Б) произвести катетеризацию мочевого пузыря
- В) ввести мочегонные средства
- Г) применить теплую грелку на низ живота

1277. [T009937] ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПАРЕЗОМ КИШЕЧНИКА ПРИМЕНЯЮТ

- А) введение подкожно прозерина
- Б) введение внутривенно физиологического раствора
- В) введение подкожно атропина
- Г) рациональное обезболивание

1278. [T009938] НЕОБХОДИМЫМ АКУШЕРСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА

"ОСТРЫЙ ЖИВОТ" ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пальпация живота
- Б) определение тургора тканей
- В) перкуссия грудной клетки
- Г) аускультация сердца

1279. [Т009939] ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТКИ С ПОСТОЯННЫМ МОЧЕВЫМ КАТЕТЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) потеря тонуса мочевого пузыря
- Б) недержание мочи
- В) пролежни
- Г) запор

1280. [Т009940] СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТКИ С ПОСТОЯННЫМ КАТЕТЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) промывание катетера 2 раз в день
- Б) своевременное опорожнение дренажного мешка
- В) обеспечение комфортных условий для мочеотделения
- Г) обеспечение пациенту достаточного времени для мочеиспускания

1281. [Т009941] ПРЕМЕДИКАЦИЮ БОЛЬНОМУ ПЕРЕД ОБЩИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ НАЗНАЧАЕТ

- А) врач-анестезиолог
- Б) лечащий врач
- В) врач приемного покоя
- Г) сестра-анестезистка

1282. [Т009942] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО

- А) по назначению врача удалить содержимое желудка через зонд
- Б) определить рост и вес пациента
- В) по назначению врача сделать очистительную клизму
- Г) обеспечить прием пациентом гигиенической ванны

1283. [Т009944] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ БОЛЬНОМУ НАЗНАЧАЮТ

- А) дыхательную гимнастику
- Б) интубацию трахеи
- В) диету, богатую белком
- Г) УВЧ на грудную клетку

1284. [Т009945] ЭКСТРЕННАЯ СМЕНА ПОВЯЗКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ

- А) незначительном промокании серозным экссудатом
- Б) болезненности краев раны
- В) повышении температуры тела
- Г) пропитывании повязки кровью

1285. [Т010203] СЕКСУАЛЬНЫМ ЗДОРОВЬЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) состояние, позволяющее испытывать половое влечение и реализацию его, получая при этом удовольствие
- Б) наличие ежедневной половой жизни
- В) воздержание от беспорядочных половых связей
- Г) наличие нескольких половых партнеров

1286. [Т010204] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДОСТИГАЕТСЯ

- А) безопасным прерыванием беременности
- Б) отказом от половой жизни
- В) отказом от проживания в городах
- Г) применением народных средств лечения

1287. [Т010205] ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) показателями рождаемости
- Б) наличием половой жизни
- В) количеством половых партнеров
- Г) социальными условиями

1288. [Т010206] КРИТЕРИЕМ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

А) рождаемости детей с врожденными пороками развития

Б) сердечно-сосудистых заболеваний

В) расторжения браков

Г) встречаемости родителей одиночек

1289. [T010207] ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

А) наследственность

Б) неблагоприятная внешняя среда

В) санитарное неблагополучие населения

Г) модифицированные продукты питания

1290. [T010208] ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

А) социально-экономический уровень жизни

Б) соматическое здоровье

В) аномалии полового развития

Г) генетические заболевания

1291. [T010209] ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) нарушение роста плода

Б) генетические мутации

В) проявление наследственных заболеваний

Г) соматические заболевания матери

1292. [T010210] РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

А) преждевременным родам

Б) запоздалым родам

В) слабой родовой деятельности

Г) не оказывает влияние на беременность

1293. [T010211] КУРЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

А) гипотрофии плода

Б) гипертрофии плода

В) чрезмерной родовой деятельности

Г) не оказывает влияния на беременность

1294. [T010212] РЕННЕЕ НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ ПОВЫШАЕТ

А) риск возникновения инфекций, передаваемых половым путем

Б) качество половой жизни

В) уровень сексуальной культуры

Г) уровень репродуктивного здоровья

1295. [T010213] СОВРЕМЕННОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

А) поздним вступлением в брак

Б) ранним вступлением в брак

В) преобладанием контрацепции над абортами

Г) уменьшением количества половых партнеров

1296. [T010215] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА

А) гигиеническое воспитание подрастающего поколения

Б) расширение ассортимента продуктов питания

В) обеспечение высокого уровня общественного здоровья

Г) создание оптимальных условий труда и отдыха

1297. [T010216] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ

А) вакцинацию

Б) борьбу со стрессом

В) динамическое наблюдение

Г) восстановительное лечение

1298. [T010217] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ

А) диспансеризацию

Б) рациональное питание

В) физическую активность

Г) охрану окружающей среды

1299. [T010219] СОВРЕМЕННОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) поздним деторождением
- Б) ранним вступлением в брак
- В) преобладанием контрацепции над абортами
- Г) уменьшением количества половых партнеров

1300. [T010220] КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ

- А) быть высокоэффективным
- Б) оказывать системное влияние на организм
- В) обладать необратимым действием
- Г) иметь сложные инструкции применения

1301. [T010221] МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) подкожный имплант
- Б) прерванный половой акт
- В) спермицид
- Г) барьерный метод

1302. [T010222] К БАРЬЕРНЫМ МЕТОДАМ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) презерватив
- Б) внутриматочный контрацептив
- В) прерванный половой акт
- Г) вазэктомия

1303. [T010223] МЕТОДОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) барьерный метод
- Б) биологический метод
- В) метод гормональной контрацепции
- Г) внутриматочная контрацепция

1304. [T010225] САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РЕЖИМОМ ПРИЕМА КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) 21+7
- Б) 24+4
- В) 26+2
- Г) непрерывный

1305. [T010226] ЛЕЧЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) регуляция менструального цикла
- Б) элиминация инфекций, передающихся половым путем
- В) лизис спаек в малом тазу
- Г) снижение минеральной плотности костей

1306. [T010227] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИЕМУ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) рак молочных желез
- Б) железодефицитная анемия
- В) нерегулярный менструальный цикл
- Г) дисменорея

1307. [T010229] ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ОВУЛЯЦИИ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ

- А) гонадотропины
- Б) миорелаксанты
- В) иммунодепрессанты
- Г) антиагреганты

1308. [T010230] МЕТОДОМ ИСКУССТВЕННОЙ ИНСЕМИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) введение нативной или криоконсервированной спермы
- Б) стимуляция овуляции и сперматогенеза
- В) манипуляции с зародышевым материалом
- Г) перенос оплодотворенных яйцеклеток в матку

1309. [T010232] ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) эндокринный фактор
- Б) сердечно-сосудистый фактор
- В) желудочно-кишечный фактор
- Г) нервно-мышечный фактор

1310. [T010233] ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) шеечный фактор
- Б) сфинктерный фактор
- В) рефлюксный фактор
- Г) антиперистальтический фактор

1311. [T010234] ФАКТОРОМ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) трубно-перитонельный фактор
- Б) сфинктерный фактор
- В) рефлюксный фактор
- Г) антиперистальтический фактор

1312. [T010235] К ЧИСТО ПРОГЕСТИНОВЫМ КОНТРАЦЕПТИВАМ ОТНОСЯТСЯ

- А) мини-пили
- Б) мини-свечи
- В) мини-тампоны
- Г) накожный пластырь

1313. [T010236] УРОВЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЗАВИСИТ ОТ

- А) грамотного регулирования деторождения
- Б) взаимоотношения партнеров
- В) регулярности половой жизни
- Г) психологического климата семьи

1314. [T010237] ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЮТСЯ

- А) выкидыш и бесплодие
- Б) преждевременные роды
- В) эктопия шейки матки
- Г) эрозия шейки матки

1315. [T010238] РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) увеличением числа заболеваний с хроническим и рецидивирующим течением
- Б) увеличением рождаемости
- В) снижением числа экстрагенитальных заболеваний
- Г) снижением числа инфекционных заболеваний

1316. [T010239] ФАКТОРОМ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИМ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) злоупотребление алкоголем
- Б) здоровый образ жизни
- В) физическая активность
- Г) острые кишечные инфекции

1317. [T010240] НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА МАЛОМ СРОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) медикаментозный аборт
- Б) вакуум-аспирация полости матки
- В) эвакуация плодного яйца кюреткой
- Г) введение гипертонического раствора в полость матки

1318. [T010241] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кровотечение
- Б) лейомиома матки
- В) бартолинит
- Г) эрозия шейки матки

1319. [T010242] В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФУНКЦИЮ

- А) репродуктивную
- Б) социальную
- В) психоэмоциональную
- Г) воспитательную

1320. [T010243] КРИТЕРИЕМ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ

- А) экстрагенитальной

- Б) туберкулезом
- В) гепатитом А
- Г) гепатитом В

1321. [T010244] ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОНТРАЦЕПЦИИ У ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) профилактика первого аборта и незапланированной беременности
- Б) подавление сексуальности в подростковом возрасте
- В) ознакомление с техникой сексуального общения
- Г) частые обращения в женскую консультацию

1322. [T010245] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) необходимость дополнительных методов обследования
- Б) клиника «острого живота»
- В) необходимость консультации узкого специалиста
- Г) оформление медицинских документов

1323. [T010246] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) неэффективность амбулаторного лечения
- Б) клиника «острого живота»
- В) необходимость консультации узкого специалиста
- Г) оформление медицинских документов

1324. [T010247] О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ИНФОРМИРУЕТ

- А) лечащий врач
- Б) главный врач
- В) акушерка
- Г) санитарка

1325. [T010248] ПРАВОМ ЧЕЛОВЕКА ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) репродуктивный выбор
- Б) моральный выбор
- В) социальный выбор
- Г) политический выбор

1326. [T010251] ЗАЛОЖЕННОЕ ПРИРОДОЙ РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) материнством
- Б) карьерой
- В) реализацией
- Г) достижением

1327. [T010252] ЧИСЛО САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ АБОРТОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ СПОСОБНОСТЬ ЖЕНЩИН К

- А) вынашиванию беременности
- Б) родам
- В) овуляции
- Г) контрацепции

1328. [T010253] ЧИСЛО АБОРТОВ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ХАРАКТЕРИЗУЕТ УРОВЕНЬ

- А) тяжелой заболеваемости беременных
- Б) отношений в паре
- В) фертильности
- Г) материальной обеспеченности

1329. [T010254] РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРАВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

- А) № 323-ФЗ
- Б) № 273-ФЗ
- В) № 152-ФЗ
- Г) № 52-ФЗ

1330. [T010255] РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРАВО ВКЛЮЧАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ О

- А) безопасном аборте
- Б) беспорядочных половых связях
- В) профессиональных вредностях

Г) психологическом аспекте абортов

1331. [T010256] ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ЗАЧАТИЕ, НАЗЫВАЮТСЯ МЕТОДАМИ

А) контрацепции

Б) овуляции

В) стимуляции

Г) ограничения

1332. [T010257] НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

А) криминальные аборты

Б) легальные аборты

В) перенашивание беременности

Г) крупные дети

1333. [T010258] БЕЗОПАСНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АБОРТА ЯВЛЯЕТСЯ

А) наличие квалифицированных медицинских кадров

Б) свободная продажа хирургических инструментов

В) информационная пропаганда абортов

Г) запрет абортов

1334. [T010259] КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ

А) не оказывать системного влияния на организм

Б) быть низкоэффективным

В) обладать необратимым действием

Г) иметь сложные инструкции применения

1335. [T010260] КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ

А) быть простым в применении

Б) быть низкоэффективным

В) обладать необратимым действием

Г) иметь сложные инструкции применения

1336. [T010261] КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ

А) быть доступным для любых социальных групп

Б) быть низкоэффективным

В) обладать необратимым действием

Г) иметь сложные инструкции применения

1337. [T010262] КОНТРАЦЕПТИВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЮ

А) быть экономически выгодным

Б) быть низкоэффективным

В) обладать необратимым действием

Г) иметь сложные инструкции применения

1338. [T010263] ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРАЦЕПЦИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ИНДЕКСОМ

А) Перля

Б) Соловьева

В) массы тела

Г) рождаемости

1339. [T010264] ПОД ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ГОРМОНАЛЬНОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ

А) изменения в самочувствии женщины или ее организме, не приводящие к серьезному нарушению функций жизненно важных органов и систем

Б) расстройства здоровья, приводящие к нарушению правильной деятельности организма

В) изменение взаимоотношений в паре

Г) нарушение социальной адаптации

1340. [T010265] ПОД ОСЛОЖНЕНИЕМ ГОРМОНАЛЬНОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ

А) расстройства здоровья, приводящие к нарушению правильной деятельности организма

Б) изменения в самочувствии женщины или ее организме, не приводящие к серьезному нарушению функций жизненно важных органов и систем

В) изменение взаимоотношений в паре

Г) нарушение социальной адаптации

1341. [T010266] СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ

А) необратимым

Б) обратимым

В) временным

Г) сезонным

1342. [T010267] МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) абстиненция (половое воздержание)

Б) календарный метод (по точному дню овуляции)

В) использование тестов на овуляцию

Г) метод лактационной аменореи

1343. [T010269] ПРИ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ ПРЕЗЕРВАТИВ НЕОБХОДИМО НАДЕВАТЬ НА ПОЛОВОЙ ЧЛЕН

А) до полового акта

Б) перед эякуляцией

В) после полового акта

Г) после эякуляции

1344. [T010270] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

А) безопасную беременность и уход до родов, в период родов и после родов

Б) трудовой отпуск

В) отпуск по уходу за ребенком

Г) выплату материнского капитала

1345. [T010271] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

А) лечение бесплодия

Б) трудовой отпуск

В) отпуск по уходу за ребенком

Г) выплату материнского капитала

1346. [T010272] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

А) лечение заболеваний репродуктивной сферы

Б) трудовой отпуск

В) отпуск по уходу за ребенком

Г) выплату материнского капитала

1347. [T010273] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

А) лечение заболеваний, передающихся половым путем

Б) трудовой отпуск

В) отпуск по уходу за ребенком

Г) выплату материнского капитала

1348. [T010274] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

А) возможность доступа и выбор методов и средств контрацепции

Б) трудовой отпуск

В) отпуск по уходу за ребенком

Г) выплату материнского капитала

1349. [T010275] ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

А) безопасное и эффективное предохранение от нежелательной беременности

Б) трудовой отпуск

В) отпуск по уходу за ребенком

Г) выплату материнского капитала

1350. [T010276] ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ МАЗОК НА

А) онкоцитологию

Б) гормональный фон

В) степень чистоты влагалища

Г) состав микрофлоры

1351. [T010278] ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЖЕНЩИН С ЭРОЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПРОБА

А) Шиллера

Б) Шуварского

В) Шредера

Г) Гентера

1352. [T010279] ЖЕНЩИНА 35 ЛЕТ НАХОДИТСЯ В ПЕРИОДЕ

А) репродуктивном

- Б) пубертатном
- В) климактерическом
- Г) параменопаузальном

1353. [T010280] ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ

- А) бесплодии
- Б) эрозии шейки матки
- В) внематочной беременности
- Г) кисте яичника

1354. [T010283] МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЧИСТЫХ ГЕСТАГЕНОВ ОСНОВАН НА

- А) супрессии эндометрия, затрудняющей имплантацию
- Б) спермицидном эффекте
- В) понижение вязкости цервикальной слизи
- Г) вычислении опасного периода

1355. [T010315] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВВЕДЕНИЮ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) частая смена половых партнеров
- Б) истмико-цервикальная недостаточность
- В) невынашивание беременности в анамнезе
- Г) возраст старше 38 лет

1356. [T010316] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИЕМУ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) заболевание печени
- Б) глаукома
- В) возраст младше 35 лет
- Г) нерегулярная половая жизнь

1357. [T010341] КОНТАКТНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) рака шейки матки ранних стадий
- Б) нормальной беременности
- В) нормальной менопаузы
- Г) апоплексии яичника

1358. [T010512] К ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ОТХОДАМ ОТНОСИТСЯ КЛАСС

- А) Б
- Б) А
- В) Г
- Г) Д

1359. [T010515] МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В

- А) крови
- Б) слюне
- В) сперме
- Г) влагалищном секрете

1360. [T010516] ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) переливание крови
- Б) рукопожатие
- В) укусы насекомых
- Г) прием пищи из одной посуды

1361. [T010585] ДЛЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА

- А) гипотрофия плода
- Б) макросомия плода
- В) крупный плод
- Г) перенашивание

1362. [T010586] ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ПРЕДЛОЖЕНЫ

- А) Строгановым
- Б) Бодяжиной
- В) Славянским
- Г) Скробанским

1363. [T010588] ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРЕЭКЛАМПСИИ, ПРИ КОТОРОЙ НАРУШЕНЫ ФУНКЦИИ

ПЕЧЕНИ И СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) HELLP-синдромом
- Б) ЕРН-синдромом
- В) остеомаляцией
- Г) гепатитом

1364. [Т010589] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ

- А) мочи и крови на ХГ
- Б) крови на RW
- В) мочи на белок
- Г) крови на белок

1365. [Т010590] ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЛАКТОСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) умеренное нагрубание молочных желез
- Б) температура тела 40 градусов, озноб
- В) свободное отделение молока
- Г) повышение артериального давления

1366. [Т010591] ПРИ ПОЛНОМ РАЗРЫВЕ МАТКИ СХВАТКИ

- А) прекращаются
- Б) усиливаются
- В) становятся дискоординированными
- Г) становятся болезненными

1367. [Т010592] ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БЕРЕМЕННОЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- А) врожденному кретинизму
- Б) гипотрофии плода
- В) гипогликемии плода
- Г) пиелонефриту

1368. [Т010593] ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЕТСЯ

- А) преэклампсией
- Б) рвотой беременных
- В) тошнотой
- Г) многоводием

1369. [Т010594] ПОТЕРЯ 50% ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ СООТВЕСТВУЕТ

- А) стадии необратимого шока
- Б) стадии компенсированного шока
- В) обратимой стадии шока
- Г) синдрому малого выброса

1370. [Т010595] ДИАГНОЗ КЛИНИЧЕСКИ УЗКИЙ ТАЗ МОЖНО УСТАНОВИТЬ

- А) только в родах
- Б) в конце беременности
- В) при постановке на учет
- Г) во втором триместре беременности

1371. [Т010596] НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ С

- А) гломерулонефритом
- Б) пиелонефритом
- В) мочекаменной болезнью
- Г) циститом

1372. [Т010597] ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА И РАЗМЕРОВ ТАЗА В РОДАХ НАЗВАН ИМЕНЕМ

- А) Вастена
- Б) Шредера
- В) Отта
- Г) Цовьянова

1373. [Т010599] ОПРЕДЕЛИТЬ СТАДИЮ СВЕРТЫВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ

- А) проба Ли-Уайта
- Б) проба Шиллера
- В) пульс
- Г) АД

1374. [T010600] ПРИЗНАКОМ ГЕМОМРАГИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) частый нитевидный пульс
- Б) повышение АД
- В) АД 110/70
- Г) гиперемия лица

1375. [T010601] НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ СТАДИЕЙ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) дистрофическая
- Б) аллергическая
- В) токсическая
- Г) невротическая

1376. [T010603] НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) понижение выработки окситоцина
- Б) повышение концентрации простагландинов
- В) повышение выработки эстрадиола
- Г) повышение концентрации кальция

1377. [T010604] К НАИБОЛЕЕ РЕДКИМ ФОРМАМ АНОМАЛИИ ТАЗА ОТНОСЯТ

- А) остеомалятический
- Б) общеравномерно-суженный
- В) поперечносуженный
- Г) простой плоский

1378. [T010606] «МАТКА КЮВЕЛЕРА» ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- А) преждевременной отслойке нормально-расположенной плаценты
- Б) предлежании плаценты
- В) слабости родовой деятельности
- Г) многоводии

1379. [T010607] СТЕПЕНИ СУЖЕНИЯ ПЛОСКОГО ТАЗА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО РАЗМЕРАМ

- А) истинной конъюгаты
- Б) индекса Соловьева
- В) поперечного размера плоскости входа
- Г) поперечного размера плоскости выхода

1380. [T010608] НАРУЖНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ ОТСУТВИИ БОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А) предлежания плаценты
- Б) отслойки плаценты
- В) начавшегося выкидыша
- Г) угрожающего выкидыша

1381. [T010609] СИЛЬНЫЕ И ДЛИТЕЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ ИНТЕРВАЛАМИ СХВАТКИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) чрезмерной родовой деятельности
- Б) дискоординированной родовой деятельности
- В) патологического прелиминарного периода
- Г) слабости родовой деятельности

1382. [T010610] НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ПРИ РАННЕМ ТОКСИКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) анализ мочи на наличие кетоновых тел
- Б) биохимический анализ крови
- В) ультразвуковое исследование
- Г) офтальмоскопия

1383. [T010611] ПРИ ГИПОКСИИ ПЛОДА АЦИДОЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ

- А) нарастает
- Б) снижается
- В) существенно не изменяется
- Г) изменяется также, как в эритроцитах

1384. [T010612] ОСТРАЯ ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- А) преждевременной отслойки плаценты
- Б) перенашивания беременности
- В) экстрагенитальных заболеваний
- Г) длительной угрозы преждевременного прерывания беременности

1385. [T010613] РАЗРЫВЫ ШЕЙКИ МАТКИ ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ

- А) осмотре родовых путей с помощью зеркал
- Б) биопсии
- В) ручном обследовании стенок полости матки
- Г) ультразвуковом обследовании

1386. [T010614] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СУДОРОГ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) магния сульфат
- Б) преднизолон
- В) сульфаниламид
- Г) атропин

1387. [T010616] ЧАЩЕ ВСЕГО У БЕРЕМЕННЫХ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ

- А) железодефицитная анемия
- Б) постгеморрагическая анемия
- В) апластическая анемия
- Г) гемолитическая анемия

1388. [T010617] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- А) препарат железа
- Б) магния сульфат
- В) преднизолон
- Г) сульфаниламид

1389. [T010619] ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА МЕНЕЕ 70 Г/Л БЕРЕМЕННУЮ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ

- А) на госпитализацию в стационар
- Б) на санаторно-курортное лечение
- В) в дневной стационар
- Г) на физиопсихопрофилактическую подготовку к родам

1390. [T010620] ПРИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ АНЕМИИ ПОСЕЩЕНИЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ НАЗНАЧАЮТ

- А) в обычные сроки по стандарту наблюдения за беременной
- Б) чаще обычных сроков по стандарту наблюдения за беременной
- В) реже обычных сроков по стандарту наблюдения за беременной
- Г) сроки определяются по желанию женщины

1391. [T010621] САМЫМ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ГЕСТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) железодефицитная анемия
- Б) перенашивание беременности
- В) тазовое предлежание плода
- Г) бессимптомная бактериурия

1392. [T010622] БЕРЕМЕННЫМ С БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛОРЫ И ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ НАЗНАЧАЮТ

- А) медикаментозное лечение
- Б) диетотерапию
- В) лечебную физкультуру
- Г) физиотерапию

1393. [T010623] ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ОСНОВАНА НА

- А) микробиологическом исследовании мочи
- Б) результатах общего анализа мочи
- В) анализа мочи по Нечипоренко
- Г) оценке цвета мочи

1394. [T010624] МОЧА ЦВЕТА КОКА-КОЛЫ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- А) HELLP-синдрома
- Б) многоводия
- В) маловодия
- Г) острого цистита

1395. [T010625] ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО

- А) отсутствие клинических симптомов
- Б) болевой синдром
- В) кровь в моче

Г) острое повышение температуры тела

1396. [T010626] ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО

А) наличие бактерий в средней порции мочи

Б) болевой синдром

В) кровь в моче

Г) острое повышение температуры тела

1397. [T010627] ДЛЯ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ ХАРАКТЕРНО

А) наличие или отсутствие лейкоцитурии

Б) болевой синдром

В) кровь в моче

Г) острое повышение температуры тела

1398. [T010628] ПРОФИЛАКТИКОЙ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ

А) бессимптомной бактериурии

Б) анемии

В) явных отеков

Г) скрытых отеков

1399. [T010629] ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ КЛУБОЧКОВ, ВОВЛЕКАЮЩЕЕ КАНАЛЬЦЫ И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНУЮ ТКАНЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) гломерулонефрит

Б) пиелонефрит

В) цистит

Г) уретрит

1400. [T010630] РАЗВИТИЕ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОБЫЧНО СВЯЗАНО С ПЕРЕНЕСЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

А) стрептококковыми

Б) вирусными

В) паразитарными

Г) грибковыми

1401. [T010632] ДИАБЕТ, РАЗВИВШИЙСЯ ПОСЛЕ 28 НЕД БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) гестационный сахарный диабет

Б) сахарный диабет 1 типа

В) сахарный диабет 2 типа

Г) сахарный диабет промежуточного типа

1402. [T010633] ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

А) преэклампсии

Б) запоров

В) многоплодной беременности

Г) бесплодия

1403. [T010634] УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ВЗЯТЫЙ ИЗ ПАЛЬЦА НАТОЩАК У БЕРЕМЕННЫХ В МИЛЛИМОЛЯХ НА ЛИТР, В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

А) менее 6,3

Б) более 8,1

В) более 6,6

Г) менее 3,3

1404. [T010635] КРИТЕРИЕМ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ВЕНОЗНОЙ ПЛАЗМЫ НАТОЩАК В МИЛЛИМОЛЯХ НА ЛИТР

А) от 5,1 до 7,0

Б) от 7,1 до 10,0

В) от 3,1 до 10,0

Г) от 1,1 до 3,0

1405. [T010636] ПЕРОРАЛЬНЫЙ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ ПРОВОДЯТ С ГЛЮКОЗОЙ В КОЛИЧЕСТВЕ

А) 75 г

Б) 5 г

В) 50 г

Г) 25 г

1406. [T010637] ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ФЕТОПАТИЯ ПРИВОДИТ К

А) увеличению веса плода

Б) уменьшению веса плода

В) не влияет на вес плода

Г) перенашиванию беременности

1407. [T010639] КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ИМЕЕТ

А) благоприятный прогноз для физиологического течения беременности

Б) неблагоприятный прогноз для течения беременности

В) крайне неблагоприятный прогноз для течения беременности

Г) показания для прерывания беременности

1408. [T010640] НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) запор

Б) диарея

В) метеоризм

Г) парез

1409. [T010641] ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИМЕНЯЮТ

А) лекарственную целлюлозу

Б) лекарственную глюкозу

В) водную нагрузку

Г) ошелачивающие растворы

1410. [T010642] ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАПОРЫ ВОЗНИКАЮТ В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ В НЕДЕЛЯХ

А) 17-36

Б) 7-10

В) 12-20

Г) 37-40

1411. [T010644] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

А) запор

Б) диарея

В) чрезмерная физическая нагрузка

Г) длительный постельный режим

1412. [T010645] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

А) профилактика запоров

Б) нормализация сна

В) проведение физиотерапии

Г) проведение психотерапии

1413. [T010646] КОНСЕРВАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

А) мазей и свечей, содержащих прокаин, бензокаин, белладонну, трибенозид

Б) свечей с папаверином

В) обильного питья

Г) ограниченного питания

1414. [T010647] ПРОФИЛАКТИКА ГИПОТИРЕОЗА ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ

А) препаратов йода

Б) препаратов железа

В) диетотерапии

Г) антибиотикотерапии

1415. [T010649] НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЖЕНЩИНЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

А) послеродовой период

Б) 1 триместр беременности

В) 2 триместр беременности

Г) 3 триместр беременности

1416. [T010650] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА БЕРЕМЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ В ГРАММАХ НА ЛИТР

НИЖЕ

А) 110

Б) 120

В) 130

Г) 140

1417. [Т010651] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ 42 НЕДЕЛИ И БОЛЕЕ НАЗЫВАЕТСЯ

А) перенашиванием

Б) недонашиванием

В) невынашиванием

Г) перезрелостью

1418. [Т010652] С ЦЕЛЬЮ ИНДУКЦИИ РОДОВ НАЗНАЧАЮТ

А) мифепристон

Б) минизистон

В) макролиды

Г) фторхинолоны

1419. [Т010855] К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ОТНОСИТСЯ

А) нормально протекающая беременность

Б) угроза прерывания беременности

В) преэклампсия

Г) тяжёлый токсикоз

1420. [Т010856] ЦЕЛЬЮ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ЯВЛЯЕТСЯ

А) укрепление мышц живота и промежности

Б) улучшение подвижности крестцово-подвздошных сочленений

В) укрепление грудных мышц

Г) укрепление мышц верхнего плечевого пояса

1421. [Т010857] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССАЖА СПИНЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

А) на боку

Б) сидя

В) на животе

Г) стоя

1422. [Т010858] ЦЕЛЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 3 ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ

А) промежности, спины

Б) верхнего плечевого пояса

В) нижних конечностей

Г) грудных

1423. [Т010860] ПРИ НОРМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ЛЕЧЕБНУЮ ГИМНАСТИКУ МОЖНО НАЧИНАТЬ

А) на вторые сутки после родов

Б) сразу после родов

В) через 4 часа после родов

Г) через неделю после родов

1424. [Т010861] К ВИДУ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРОТИВОПОКАЗАННОМУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОТНОСИТСЯ

А) бег

Б) дыхательная гимнастика

В) йога

Г) плавание

1425. [Т010862] ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

А) магния сульфат

Б) метамизол натрия (анальгин)

В) дротаверин (но-шпа)

Г) окситоцин

1426. [Т010865] К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОТНОСИТСЯ

- А) хронический сальпингоофорит в стадии ремиссии
- Б) острый гнойный сальпингоофорит
- В) маточное кровотечение
- Г) опухоль яичников

1427. [T010866] ЦЕЛЮ ЛФК ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ликвидация спаек
- Б) увеличение мышечной массы
- В) улучшение настроения
- Г) похудение

1428. [T010867] ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПРОВОДИТ

- А) врач-гинеколог
- Б) акушерка
- В) массажист
- Г) физиотерапевт

1429. [T010870] ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) отсутствие побочных эффектов
- Б) увеличение сроков лечения
- В) расширение спектра применяемых лекарственных препаратов
- Г) отсутствие необходимости дальнейшего врачебного наблюдения

1430. [T010872] К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ОТНОСЯТ

- А) силовые упражнения
- Б) плавание
- В) терренкуры
- Г) утреннюю и лечебную гимнастику

1431. [T010873] ПРОФИЛАКТИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) своевременное лечение последствий родовых травм
- Б) профилактический прием антибактериальных препаратов
- В) постоянное применение гинекологических орошений
- Г) ограничение двигательной активности

1432. [T010874] ТРЕТЬИМ ЭТАПОМ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) амбулаторно-поликлинический
- Б) санаторно-курортный
- В) стационарный
- Г) превентивный

1433. [T010876] ЦЕЛЮ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) завершение патологического процесса
- Б) борьба с факторами риска
- В) профилактика рецидивов болезни
- Г) спасение жизни человека

1434. [T010877] БОРЬБА С ФАКТОРАМИ РИСКА ПРОВОДИТСЯ НА _____ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

- А) амбулаторно-поликлиническом
- Б) санаторно-курортном
- В) стационарном
- Г) превентивном

1435. [T010896] ФАКТОРОМ РИСКА ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВРОЖДЁННОЙ СЛЕПОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ

- А) острая вирусная инфекция
- Б) тазовое предлежание плода
- В) физическая перегрузка матери в период беременности
- Г) многоплодная беременность

1436. [T010900] ДИФЛЮКАН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) противогрибковое средство
- Б) антибиотик

В) ненаркотический анальгетик

Г) противоглистное средство

1437. [T010905] ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ОКСИТОЦИН

А) кровотечение во время родов с нарушением свертываемости крови

Б) купирование приступа стенокардии

В) купирование приступа бронхиальной астмы

Г) купирование приступа судорог

1438. [T010906] ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ЗАЩИЩЕННЫМ ПЕНИЦИЛЛИНАМ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) амоксиклав

Б) джозамицин

В) глюкофаж

Г) кестин

1439. [T010909] БЕРЕМЕННАЯ С ДВОЙНЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА В РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

А) за 2 недели до родов

Б) в 40 недель

В) сразу же после отхождения вод

Г) с началом срочных родов

1440. [T010910] КОНТРОЛЬ КРОВИ НА АНТИТЕЛА ПРИ ВЕРОЯТНОСТИ РЕЗУС-КОНФЛИКТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДЯТ

А) 1 раз в месяц

Б) 1 раз

В) 3 раза

Г) 2 раза

1441. [T010911] ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ЛФК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВОДИТЬ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

А) 30-35

Б) 20-26

В) 36-38

Г) 22-24

1442. [T010912] ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

А) госпитализировать для обследования

Б) наблюдать амбулаторно

В) прервать беременность

Г) уменьшить физические нагрузки

1443. [T010913] СНИЖЕНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, СПОСОБСТВУЕТ

А) ранняя выписка из роддома

Б) нарушение правил заключительной дезинфекции

В) отсутствие приточно-вытяжной вентиляции

Г) увеличение частоты инвазивных вмешательств

1444. [T010914] ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОКАЗАНА ПРИ

А) истмико-цервикальной недостаточности

Б) миоме матки

В) перегородке тела матки

Г) седловидной матке

1445. [T010915] К ГРУППЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, СРЕДИ РОДИЛЬНИЦ ОТНОСЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ

А) с хориоамнионитом в родах

Б) с преэклампсией

В) с хроническим гастритом

Г) с многоплодной беременностью

1446. [T010916] ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ИЗ ДВОЙНИ ПЛОДА НЕОБХОДИМО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ

А) проверить наружными приемами положение и предлежание

- Б) ввести внутривенно метилэргометрин
- В) произвести влагалищное исследование
- Г) произвести амниотомию

1447. [T010917] ЛФК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНО

- А) при рубце на матке
- Б) при сроке беременности 30-35 недель
- В) у беременных старше 30 лет
- Г) у беременных с миопией средней степени

1448. [T010918] ПРОГЕСТЕРОНОВАЯ ПОДДЕРЖКА БЕРЕМЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- А) эндовагинального применения микронизированного прогестерона
- Б) перорального приема микронизированного прогестерона
- В) дивигеля
- Г) дексаметазона

1449. [T010919] ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 36-37
- Б) 33-34
- В) 39-40
- Г) 30-32

1450. [T010920] ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) плановую госпитализацию за 2 недели до родов
- Б) досрочное вскрытие плодного пузыря
- В) поворот плода на ножку
- Г) экстренную операцию кесарева сечения

1451. [T010921] ТЕРМИН «...URIA» (НАРУШЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ) ИМЕЕТ ПРИСТАВКУ

- А) dys
- Б) hyper
- В) hypo
- Г) anti

1452. [T010923] ПРИРАЩЕНИЮ ПЛАЦЕНТЫ СПОСОБСТВУЮТ

- А) осложненные аборты
- Б) пониженный уровень ХГ
- В) назначение прогестерона во время беременности
- Г) пониженный уровень окситоцина

1453. [T010924] ПРИ ОСТРОМ ЖИРОВОМ ГЕПАТОЗЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) прерывание беременности
- Б) сохранение беременности
- В) амбулаторное наблюдение
- Г) интенсивное лечение

1454. [T010925] ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОДА, ПРИ КОТОРОМ РОДЫ ПРИ ДВОЙНЕ ПРОТЕКАЮТ С МЕНЬШИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ

- А) головном предлежании 1-го и 2-го плодов
- Б) ножном предлежании 1-го плода и головном 2-го
- В) поперечном положении 2-го плода и головном 1-го
- Г) поперечном предлежании 2-х плодов

1455. [T010927] ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ 1 ПРОВОДИТСЯ

- А) при чисто ягодичном предлежании
- Б) при ножном предлежании
- В) при поперечном положении
- Г) при косом положении плода

1456. [T010928] ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ 1 ПРИМЕНЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) сохранения членорасположения плода
- Б) исправления положения плода
- В) родостимуляции
- Г) профилактики кровотечения

1457. [T010929] ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ГОЛОВКИ ПРИ ТАЗОВОМ И НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ

ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД

- А) Мориссо-Левре
- Б) Кредо-Лазаревича
- В) Кюстнера-Чукалова
- Г) Уилта-Иванова

1458. [T010930] ВЫПАДЕНИЕ ПУПОВИНЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО В СЛУЧАЕ ОТХОЖДЕНИЯ ВОД ПРИ

- А) поперечном положении плода
- Б) головном предлежании
- В) смешанном тазовом предлежании
- Г) чисто ягодичном предлежании

1459. [T010931] ТЕРМИН «...CORPORA» (АНТИТЕЛА) СОДЕРЖИТ ПРИСТАВКУ

- А) contra
- Б) anti
- В) endo
- Г) hypo

1460. [T010932] ПРИЧИНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) понижение выработки окситоцина
- Б) повышение концентрации простагландинов
- В) повышение выработки эстрадиола
- Г) повышение концентрации кальция

1461. [T010933] С ЦЕЛЬЮ РОДОСТИМУЛЯЦИИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) энзопрост
- Б) эссенциале форте
- В) аминофиллин (эуфиллин)
- Г) этимизол

1462. [T010934] ДЛЯ СНЯТИЯ ГИПЕРТОНУСА МАТКИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) гинипрал
- Б) динопрост
- В) синестрол
- Г) кальция хлорид

1463. [T010935] ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ В СВЯЗИ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ В

- А) развернутой операционной
- Б) женской консультации
- В) приемном покое
- Г) предродовой палате

1464. [T010936] СРАЩЕНИЕ БЛИЗНЕЦОВ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ПРИ НАЛИЧИИ

- А) 1-го хориона и 1 амниона
- Б) 2-х хорионов и 2-х амнионов
- В) 4-х оболочек между плодами
- Г) 1-го хориона и 2-х амнионов

1465. [T010937] ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ ДВОЙНЕЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО

- А) невынашивание
- Б) перенашивание
- В) развитие крупных плодов
- Г) бурная родовая деятельность

1466. [T010938] ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ

- А) малым косым
- Б) большим косым
- В) средним косым
- Г) прямым

1467. [T010940] ПОСЛЕ ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЧАСТОТА ИММУНИЗАЦИИ RH (-) –ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ В ПРОЦЕНТАХ В СРЕДНЕМ

- А) 10
- Б) 20
- В) 30

Г) 50

1468. [T010941] ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) в отделения патологии беременных специализированных родильных домов
- Б) в отделения патологии беременных не специализированных родильных домов
- В) в отделения больниц по профилю патологии
- Г) в санатории-профилактории

1469. [T010942] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В РОДАХ В МОМЕНТ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ГОЛОВКИ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) окситоцин
- Б) дицинон
- В) маммафизин
- Г) прегнантол

1470. [T010944] НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 37 НЕДЕЛЬ И ПРЕЭКЛАМПСИИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) подготовку к досрочному родоразрешению
- Б) лечение в дневном стационаре
- В) ожидание срочных родов
- Г) контроль функции почек

1471. [T010946] ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ИМЕЮЩИМ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ УРОДСТВА ПЛОДА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ СРОКЕ 13-14 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) краснуха
- Б) острый ринит
- В) ветрянка
- Г) острый трахеит

1472. [T010947] РВОТА БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) потерей веса
- Б) появлением отеков
- В) гипертензией
- Г) брадикардией

1473. [T010948] ПРИ ВЫРАЖЕННОМ МНОГОВОДИИ КОЛИЧЕСТВО ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В КОНЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ЛИТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5 - 7
- Б) 2 - 3
- В) 3-4
- Г) 1-1,5

1474. [T010950] НАЛОЖЕНИЕ ШВА ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЦИОНАЛЬНО ПРОВЕСТИ

- А) при беременности 11-14 недель
- Б) до беременности
- В) сразу после задержки месячных
- Г) при беременности 18-26 недель

1475. [T010951] СНЯТИЕ ШВА, НАЛОЖЕННОГО ПО МЕТОДУ ШИРОДКАРА, ПРОВОДИТСЯ ПРИ СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

- А) 32
- Б) 30
- В) 36
- Г) 39

1476. [T010953] ПРОГЕСТЕРОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПОМИМО ЯИЧНИКОВ, ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ

- А) плацентой
- Б) гипофизом
- В) гипоталамусом
- Г) щитовидной железой

1477. [T010954] СРОК ГЕСТАЦИИ, ПРИ КОТОРОМ ПЛОД ДОСТИГАЕТ ДЛИНЫ 35 СМ И МАССЫ 1000 Г, В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 28

- Б) 26
- В) 35
- Г) 30

1478. [T010955] ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОЗЖЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗЫВАЮТСЯ

- А) фетопатии
- Б) гаметопатии
- В) эмбриопатии
- Г) зиготопатии

1479. [T010956] РОДИЛЬНИЦЕ СО ШВАМИ НА ПРОМЕЖНОСТИ ПОЛАГАЕТСЯ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК В ДНЯХ

- А) 70
- Б) 56
- В) 86
- Г) 84

1480. [T010957] ПОСЛЕ ЗАШИВАНИЯ ПРОМЕЖНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СИДЕТЬ

- А) 2 недели
- Б) 2 дня
- В) 5 дней
- Г) 1 месяц

1481. [T010959] НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ПОЯВЛЕНИЕ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

- А) после нескольких абортов
- Б) при первой беременности
- В) при второй беременности после нормальных первых родов
- Г) у первородящей без отягощенного анамнеза

1482. [T010961] ПО ТЕОРИИ ВЕРБОВА ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗРЫВА МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) патология матки
- Б) бурная родовая деятельность
- В) клиническое несоответствие
- Г) крупный плод

1483. [T010962] ПРОНИЦАЕМОСТЬ СТЕНОК СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) повышена
- Б) слегка понижена
- В) существенно понижена
- Г) не изменена

1484. [T010963] СВЕРТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) повышены
- Б) понижены
- В) не изменены
- Г) можно не учитывать для прогноза родов

1485. [T010964] НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАТЬ КРОВЬ И МОЧУ НА САХАР У БЕРЕМЕННЫХ, ИМЕВШИХ

- А) роды крупным плодом
- Б) два аборта
- В) запоздалые роды
- Г) быстрые роды

1486. [T010965] У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ ДИАБЕТОМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТЬ В ИНСУЛИНЕ

- А) повышена
- Б) уменьшена
- В) резко уменьшена
- Г) остается без изменений

1487. [T010967] ПРИ ИНСУЛИНОЗАВИСИМОМ ДИАБЕТЕ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬСЯ У

- А) акушера и эндокринолога
- Б) терапевта
- В) только эндокринолога

Г) только гинеколога

1488. [T010968] ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ГЕМОГЛОБИН В Г/Л

- А) 96
- Б) 112
- В) 118
- Г) 120

1489. [T010969] НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЕТ

- А) во 2-м и 3-м триместрах беременности и в родах
- Б) до 12 недель беременности
- В) в первую неделю беременности
- Г) в первый месяц беременности

1490. [T010970] У БЕРЕМЕННЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНА СОХРАНЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

- А) бета-адреномиметиками
- Б) магнием
- В) метацином
- Г) прогестероном

1491. [T010971] ПРИ СИНДРОМЕ СДАВЛЕНИЯ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

- А) затруднен возврат крови к сердцу из нижних конечностей
- Б) повышается объем циркулирующей крови
- В) наблюдается гипертензия
- Г) самочувствие не страдает

1492. [T010972] ПИУРИЯ И БАКТЕРИУРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ У БЕРЕМЕННОЙ ПРИЗНАКОМ

- А) пиелонефрита
- Б) диабета
- В) раннего гестоза
- Г) позднего гестоза

1493. [T010973] РОДЫ ПРОВОДЯТ В АКУШЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИ

- А) остром гепатите
- Б) гепатозе беременных
- В) трихомониазе
- Г) хроническом тонзиллите

1494. [T010974] К СТАДИЯМ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТСЯ СТАДИИ

- А) прилива, красного и серого опеченения, разрешения
- Б) подъема, стояния температуры, кризиса
- В) легочных и внелегочных проявлений
- Г) начальная, развернутых клинических проявлений, стадия осложнений

1495. [T010978] ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ

- А) почечные клубочки
- Б) почечные канальцы
- В) почечные лоханки
- Г) все элементы почечной паренхимы

1496. [T010979] ИЗЖОГА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ

- А) забрасывании желудочного содержимого в пищевод при ослаблении тонуса кардиального сфинктера
- Б) появлении эрозий и язв на слизистой пищевода
- В) уменьшении образования слизи в желудке и неполной нейтрализации соляной кислоты
- Г) повышенной кислотности желудочного сока

1497. [T010980] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) закупорка общего желчного протока желчными камнями
- Б) закупорка общего желчного протока лямблиями
- В) вирусный гепатит
- Г) гемолитическая болезнь новорожденных

1498. [T010983] РВОТА БЕРЕМЕННЫХ ПРЕКРАЩАЕТСЯ К ____ НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ

- А) 12 – 16-й
- Б) 4 – 6-й

В) 8 – 10-й

Г) 17 – 18-й

1499. [T010984] «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) цервикометрия и определение фетального фибронектина

Б) измерение истинной конъюгаты

В) определение высоты стояния дна матки

Г) доплерометрия

1500. [T010986] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

А) непрекращающаяся рвота, прогрессирующая кетонурия в течении 3-4 дней, выраженная тахикардия, желтушное окрашивание склер и кожного покрова

Б) рвота до 5 раз в день, отсутствие аппетита

В) дерматоз, температура 37,5°C, ЧДД 21 – 22

Г) рвота 5-10 раз в день, протеинурия, лейкоцитоз

1501. [T010987] МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОТЕКОВ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) голени

Б) отеки поясница и передняя брюшная стенка

В) лицо

Г) правая рука

1502. [T010989] В ТРИАДУ ЦАНГЕМЕЙСТЕРА ВХОДЯТ СИМПТОМЫ

А) артериальная гипертензия, протеинурия, отеки

Б) артериальная гипотензия, протеинурия, отеки

В) артериальная гипертензия, гематурия, отеки

Г) судороги, олигурия, отеки

1503. [T010990] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЕ, ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЯВЛЯЮЩИЙСЯ БАЗОВОЙ ТЕРАПИЕЙ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

А) магния сульфат

Б) фуросемид

В) фенобарбитал

Г) 0,9% раствор натрия хлорид

1504. [T010991] СРОКАМИ ОЧЕНЬ РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ В НЕДЕЛЯХ

А) 22 – 27

Б) 28 - 33

В) 34 – 37

Г) 38 – 42

1505. [T010992] ОСЛОЖНЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ , ПРИ КОТОРОЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ, ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНИ, СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) Hellp – синдром

Б) ДВС – синдром

В) эклампсия

Г) преэклампсия

1506. [T010993] КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ НАЧИНАЮЩИХСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) выраженные схваткообразные боли внизу живота или схватки

Б) боли в поясничной области и нижней части живота

В) регулярная родовая деятельность и раскрытие маточного зева более 3 см

Г) все ответы верны

1507. [T010994] ТОКОЛИТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ- ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ

А) нефидипин и атосибан

Б) парацетамол и атропин

В) клонидин и промедол

Г) магния сульфат и окситоцин

1508. [T010995] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) респираторный дистресс-синдром плода
- Б) генерализованная инфекция
- В) врожденные пороки развития
- Г) гипоксия плода

1509. [T010996] СИМПТОМОМ УГРОЖАЮЩЕГО АБОРТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) боли внизу живота
- Б) тошнота
- В) рвота
- Г) схватки

1510. [T010997] ТАКТИКОЙ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ РВОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) коррекция режима питания
- Б) консультация терапевта
- В) госпитализация
- Г) консультация гастроэнтеролога

1511. [T010998] ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ ВРАЧ ДОЛЖЕН

- А) предупредить аспирацию и асфиксию
- Б) держать руки беременной
- В) осуществить переливание плазмы крови
- Г) ничего не делать

1512. [T010999] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) перенесенная ранее венозная тромбоэмболия
- Б) хронический гастрит
- В) хронический пиелонефрит
- Г) бронхиальная астма

1513. [T011000] ПРИ ГИПОТЕРИОЗЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗНАЧАЮТ ПРЕПАРАТЫ

- А) гормонов щитовидной железы
- Б) половых гормонов
- В) антибактериальные препараты
- Г) антигипертензивные препараты

1514. [T011001] АНТИДОТОМ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СУЛЬФАТА МАГНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) глюконат кальция
- Б) увлажненный кислород
- В) препараты железа
- Г) антигистаминные препараты

1515. [T011002] ПЕРЕДОЗИРОВКА СУЛЬФАТА МАГНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ

- А) дыхательной и сердечной недостаточности
- Б) запоров
- В) отеков голеней
- Г) рвоты

1516. [T011003] ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ

- А) легкоусвояемых углеводов
- Б) хлеба грубого помола
- В) кисломолочных продуктов
- Г) отварного мяса

1517. [T011004] РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПРАВИЛОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) дробное и частое питание (5-6 раз в день)
- Б) редкое питание утром и вечером (2 раза в день)
- В) перенос основного объема пищи на ужин
- Г) перенос основного объема пищи на завтрак

1518. [T011005] ПЕРЕД СНОМ БЕРЕМЕННОЙ ЛУЧШЕ СЪЕСТЬ

- А) кефир, фрукты
- Б) бутерброд с колбасой
- В) жареный картофель
- Г) пирожное

1519. [T011006] БЕРЕМЕННЫМ НА ПОЗДНИХ СРОКАХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕЗДА НА

- А) велосипеде
- Б) автомобиле
- В) общественном транспорте
- Г) железнодорожном транспорте

1520. [T011007] РАБОТУ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ БЕРЕМЕННЫМ НЕОБХОДИМО

- А) сократить
- Б) увеличить
- В) запретить
- Г) не изменять

1521. [T011008] ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКОМ НАЧАЛА ФЕРРОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) 1 триместр
- Б) 2 триместр
- В) 3 триместр
- Г) перед родами

1522. [T011009] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЭУТИРИОИДНОГО ЗОБА ЯВЛЯЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ

- А) йодированной соли
- Б) сахара
- В) клетчатки
- Г) кисломолочных продуктов

1523. [T011010] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАПОРОВ У БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДОВАНО УПОТРЕБЛЯТЬ ПИЩУ ОБОГАЩЕННУЮ

- А) клетчаткой
- Б) йодом
- В) сахаром
- Г) солью

1524. [T011011] ПОТРЕБНОСТЬ В УГЛЕВОДАХ У БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЗА СЧЕТ

- А) хлеба грубого помола
- Б) кондитерских изделий
- В) кисломолочных продуктов
- Г) орехов

1525. [T011012] МЕРОПРИЯТИЕМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПРОФИЛАКТИКУ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обследование и ранее выявление хронических вирусных заболеваний печени
- Б) прерывание беременности в острой фазе
- В) введение антибактериальных препаратов
- Г) длительная контрацепция

1526. [T011013] ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬСЯ ПУЛЬМОНОЛОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) бронхиальная астма
- Б) ревматизм
- В) пороки сердца
- Г) вирусные гепатиты

1527. [T011014] ПРИ ПЕРВИЧНОМ ВЫЯВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ПОКАЗАНО

- А) тест на толерантность к глюкозе
- Б) определение глюкозы в моче
- В) определение алт и аст
- Г) определение общего белка в моче

1528. [T011015] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ИНФИЦИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КРАСНУХОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) вакцинация от краснухи до начала беременности и предотвращение контактов с больными краснухой
- Б) постановка прививки от краснухи во время беременности
- В) исключение из пищи облигатных аллергенов
- Г) применение фолиевой кислоты

1529. [T011016] ПРОФИЛАКТИКОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) прегравидарная подготовка
- Б) соблюдение правил гигиены
- В) инфузионная терапия
- Г) противовирусная терапия

1530. [T011017] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗЖОГИ У БЕРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СНА

- А) с приподнятым головным концом
- Б) с приподнятым ножным концом
- В) с приподнятым ножным и головным концом
- Г) положение не имеет значения

1531. [T011018] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В РАМКАХ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГТОВКИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ

- А) фолиевую кислоту
- Б) витамин С
- В) рыбий жир
- Г) витамин В12

1532. [T011019] ТЕРМИН «...GLYСАЕМIA» (УВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ САХАРА В КРОВИ) ИМЕЕТ ПРИСТАВКУ

- А) hyper
- Б) hypo
- В) poly
- Г) para

1533. [T011020] СУФФИКСОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ БОЛЕЗНЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) -itis
- Б) -oma
- В) -iasis
- Г) -ismus

1534. [T011021] СУФФИКСОМ, ОБОЗНАЧАЮЩИМ ОПУХОЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) -oma
- Б) -itis
- В) -iasis
- Г) -ismus

1535. [T011022] ТЕРМИН «ANGI...» (СОСУДИСТАЯ ОПУХОЛЬ) ИМЕЕТ СУФФИКС

- А) -oma
- Б) -itis
- В) -iasis
- Г) -ismus

1536. [T011024] ТЕРМИН «...URIA» (МАЛОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ МОЧИ) СОДЕРЖИТ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ- ПРИСТАВКУ

- А) olig
- Б) sym
- В) pan
- Г) meso

1537. [T011025] ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «РЕБЕРНЫЙ» ИМЕЕТ СЛОВАРНУЮ ФОРМУ

- А) costalis, e
- Б) costalis, a,um
- В) costalis,is
- Г) costalis,ior

1538. [T011026] БУКВОСОЧЕТАНИЕ «ТЬ» ЧИТАЕТСЯ КАК (ЦИ) В СЛОВЕ

- А) solutio
- Б) fonticulus
- В) tibia
- Г) mixtio

1539. [T011027] ТЕРМИН «...CARDIUM» (ОКОЛОСЕРДЕЧНАЯ СУМКА) ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИСТАВКИ

- А) peri

- Б) epi
- В) endo
- Г) sym

1540. [T011028] В ТЕРМИНЕ «...LINGUA»(ПОД ЯЗЫК) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРЕДЛОГ

- А) sub
- Б) per
- В) in
- Г) pro

1541. [T011084] ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ (МИН)

- А) 10
- Б) 5
- В) 30
- Г) 40

1542. [T011085] ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕАНИМАЦИИ ПРИ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННОГО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

- А) в восстановлении проходимости дыхательных путей
- Б) в искусственной вентиляции легких
- В) в коррекции метаболических расстройств
- Г) в проведении закрытого массажа сердца

1543. [T011086] ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) преэклампсии тяжелой степени
- Б) эклампсии
- В) отеков
- Г) остеомалации

1544. [T011087] К ПРИЗНАКУ ЭКЛАМПСИИ ОТНОСЯТ

- А) тонические и клонические судороги
- Б) тахикардия
- В) обезвоживание
- Г) анасарка

1545. [T011088] ПРЕДСУДОРОЖНЫЙ ПЕРИОД ЭКЛАМПСИИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ

- А) фибриллярными подергиваниями мышц лиц и фиксированным взглядом в одну сторону
- Б) клоническими судорогами
- В) тоническими судорогами
- Г) отсутствием дыхания

1546. [T011089] НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА ПРОВОДЯТ

- А) двумя пальцами
- Б) проксимальной частью кистей
- В) одной рукой
- Г) двумя руками

1547. [T011091] ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) протеинурия
- Б) лейкоцитурия
- В) бактериурия
- Г) пиурия

1548. [T011092] ВТОРАЯ ФАЗА ЭКЛАМПСИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) апноэ
- Б) патологическим типом дыхания
- В) дыханием нормальным
- Г) дыханием форсированным

1549. [T011093] НОВОРОЖДЕННЫЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР НА 5 БАЛЛОВ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ АСФИКСИИ

- А) средней степени
- Б) тяжелой степени
- В) легкой степени
- Г) нет асфиксии

1550. [T011094] К ПРИЗНАКАМ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ ОТНОСЯТ

- А) боль в эпигастральной области, рвота
- Б) фибриллярные подергивания мышц лица
- В) гипотония
- Г) гипертония

1551. [T011095] «ЗОЛОТОЙ» СТАНДАРТ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ ВКЛЮЧАЕТ

- А) внутривенное введение 25% раствора сернокислой магнезии
- Б) применение гипотензивных средств
- В) переливание 10-20% раствора альбумина с целью восполнения дефицита белка
- Г) применение диуретиков

1552. [T011096] РЕАНИМАТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ

- А) проблемы оживления организма
- Б) профилактику экстремальных ситуаций
- В) функционирование основных жизненных систем
- Г) физиологию человека

1553. [T011099] КОМПЛЕКСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) визуальное, мониторное, лабораторное наблюдения
- Б) визуальное, мониторное наблюдения
- В) мониторное, лабораторное наблюдения
- Г) интенсивное наблюдение

1554. [T011101] БОЛЬНОГО С ОТЕКОМ ЛЕГКИХ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В ПОЛОЖЕНИИ

- А) с приподнятым изголовьем
- Б) сидя
- В) лежа на спине
- Г) лежа на животе

1555. [T011102] ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ АППАРАТ БОБРОВА ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) 40% раствором этилового спирта
- Б) изотоническим раствором натрия хлорида
- В) раствором фурацилина
- Г) раствором хлоргексидина

1556. [T011104] УДАЛЕНИЕ СЛИЗИ ИЗ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЭЛЕКТРООТСОСОМ У БОЛЬНОГО В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИИ (СЕК)

- А) не более 15
- Б) не более 5
- В) не более 20
- Г) 20-30

1557. [T011106] ТАКТИКА АКУШЕРКИ В ПЕРИОД КЛОНИЧЕСКИХ СУДОРОГ У БОЛЬНОЙ С ЭКЛАМПСИЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) профилактику ушибов и прикусывания языка
- Б) проведение оксигенотерапии
- В) введение литической смеси
- Г) катетеризацию периферической вены

1558. [T011107] ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ОСТРЫХ ПЕРОРАЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ПОКАЗАНО

- А) при любых острых пероральных отравлениях
- Б) если прошло не больше 2 часов после приема яда
- В) при отравлениях кислотами и щелочами
- Г) при бессознательном состоянии больного

1559. [T011108] АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) 0,1% р-р атропина сульфат
- Б) 5% р-р эфедрин гидрохлорид
- В) 25% р-р магнезия сульфат
- Г) унитиол

1560. [T011110] ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫМ И ДЕТЯМ

ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ПРОВОДИТСЯ МЕТОДОМ

- А) изо рта в рот и в нос
- Б) изо рта в рот
- В) изо рта в нос
- Г) изо рта в рот, изо рта в нос

1561. [T011111] ОБЪЕМ ВОЗДУХА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ СОСТАВЛЯЕТ В МИЛЛИЛИТРАХ

- А) 20-30
- Б) 50-60
- В) 80- 100
- Г) больше 100

1562. [T011113] ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ТИПИЧНОГО ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) загрудинная боль продолжительностью более 20 минут
- Б) нарушение ритма сердца
- В) артериальная гипертензия
- Г) артериальная гипотензия

1563. [T011114] ПРИЗНАКОМ ОСТРЕЙШЕЙ СТАДИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) подъем сегмента ST
- Б) Q патологический
- В) высокий остроконечный T
- Г) T в грудных отведениях

1564. [T011115] ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) гиперемия лица, сухость кожи, глазные яблоки мягкие, тургор кожи снижен
- Б) кожа гиперемированная, сухая, зрачки расширенные, глазные яблоки твердые
- В) кожа цианотичная, сухая, глаза запавшие, тризм жевательной мускулатуры, повышенный мышечный тонус
- Г) тризм жевательной мускулатуры, повышенный мышечный тонус

1565. [T011116] ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЫХАНИЕ

- А) частое, глубокое
- Б) поверхностное, неритмичное
- В) не нарушено
- Г) редкое, с длительным апноэ

1566. [T011117] ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) туалет верхних дыхательных путей, ингаляция кислорода, внутривенное введение 0,9% р-р натрия хлорида
- Б) внутривенное введение инсулина 40 ЕД, ингаляция кислорода, введение 0,9% р-р натрия хлорида внутривенно капельно
- В) ингаляция кислорода, введение полиглюкина внутривенно капельно
- Г) внутримышечное введение инсулина 20 ЕД, внутривенное введение гемодеза

1567. [T011118] ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ У БОЛЬНОГО КОЖА

- А) обычного цвета, влажная, глазные яблоки твердые, тонус мышц повышен
- Б) обычного цвета, влажная, глазные яблоки твердые, тонус мышц повышен
- В) гиперемированная, влажная, зрачки резко расширенны, тонус мышц снижен
- Г) гиперемированная, тонус мышц повышен

1568. [T011120] МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК СОСТАВЛЯЕТ

- А) 30 минут после введения препарата
- Б) 3 минуты после введения препарата
- В) 1 час после введения препарата
- Г) 15 минуты после введения препарата

1569. [T011121] ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) расширение венозного отдела сосудистого русла
- Б) снижение сократительной способности миокарда
- В) уменьшение объема циркулирующей крови

Г) угнетение сосудодвигательного центра

1570. [T011122] ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) внутривенное введение преднизолона и адреналина
- Б) наложение жгута
- В) подготовка аптечки для оказания помощи при анафилактическом шоке
- Г) введение антигистаминных препаратов

1571. [T011125] ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ ОБЫЧНО ПРЕДШЕСТВУЕТ

- А) бурная родовая деятельность
- Б) длительный подготовительный период
- В) длительный безводный период
- Г) артериальная гипертензия

1572. [T011127] К ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ, НЕ ОТНОСИТСЯ

- А) многоводие
- Б) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
- В) разрыв матки
- Г) несвоевременное вскрытие плодного пузыря

1573. [T011128] ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЬНЫЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ

- А) диетотерапию с ограничением углеводов и жиров, инсулинотерапию
- Б) сахаропонижающие препараты группы сульфаниламидов
- В) диетотерапию с ограничением белков
- Г) бигуаниды

1574. [T011129] К ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НЕ ОТНОСИТСЯ

- А) маловодие
- Б) преждевременное прерывание беременности
- В) раннее развитие позднего токсикоза
- Г) ангиопатия сетчатки

1575. [T011130] К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ ДВС-СИНДРОМА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ОТНОСИТСЯ

- А) нарушение гемостаза при позднем токсикозе беременных, попадание в кровь тромبوпластических веществ
- Б) выделение в кровь фибринолитических веществ
- В) дефицит VIII фактора свертывающей системы крови
- Г) массивное кровотечение

1576. [T011131] В АКУШЕРСКИЙ СТАЦИОНАР ПОСТУПИЛА БЕРЕМЕННАЯ С ДИАГНОЗОМ: - БЕРЕМЕННОСТЬ 33 НЕДЕЛИ; - ПРЕЭКЛАМПСИЯ; - ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ; - АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА. СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ

- А) экстренное кесарево сечение
- Б) плодоразрушающую операцию
- В) кесарево сечение с последующей надвлагалищной ампутацией матки
- Г) вакуум-экстракцию плода

1577. [T011132] В РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТУПИЛА БЕРЕМЕННАЯ С ЖАЛОБАМИ НА ОБИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ. УСТАНОВЛЕН ДИАГНОЗ: - БЕРЕМЕННОСТЬ 34 НЕДЕЛИ; - ПОЛНОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ; - АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА. СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ

- А) экстренное кесарево сечение
- Б) плодоразрушающую операцию
- В) кесарево сечение с последующей надвлагалищной ампутацией матки
- Г) вакуум-экстракцию плода

1578. [T011134] ПОТЕРЯ КРОВИ В 750-1500МЛ (15-30% ОЦК) СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

- А) 2-ой
- Б) 1-ой
- В) 3-ой

Г) 4-ой

1579. [T011135] ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВВЕДЕНИЕ РАСТВОРА В ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ КАТЕТЕР ЗАВЕРШИЛОСЬ, НЕОБХОДИМО

- А) поставить «гепариновую пробку» и закрыть катетер
- Б) закрыть катетер пробкой и этим ограничиться
- В) поставить «гепариновую пробку» и этим ограничиться
- Г) промыть и закрыть катетер

1580. [T011137] ПУЛЬСОКСИМЕТР, КАПНОГРАФ, ВОЛЮМОСПИРОМЕТР ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ

- А) оксигенации, пульса, вентиляции
- Б) концентрации кислорода в дыхательной смеси
- В) ЭКГ, АД, центрального венозного давления, электроэнцефалограммы, температуры
- Г) работы аппарата ИВЛ

1581. [T011138] КАРДИОМОНИТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ

- А) ЭКГ, АД, ЧДД, центрального венозного давления, температуры, дыхания
- Б) оксигенации, вентиляции и кровообращения
- В) концентрации кислорода в дыхательной смеси
- Г) работы аппарата ингаляционного наркоза

1582. [T011141] ВЛАЖНЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ КОМЫ

- А) гипогликемической
- Б) гипергликемической
- В) уремической
- Г) почечной

1583. [T011152] ПРЕКАРДИАЛЬНЫЙ УДАР НАНОСИТСЯ

- А) на границе средней и нижней части грудины
- Б) в области мечевидного отростка
- В) в области левого подреберья
- Г) в верхней части грудины

1584. [T011153] НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В КРОВОТОК МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) через магистральную вену
- Б) через периферическую вену
- В) под корень языка
- Г) эндотрахеально

1585. [T011154] ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ

- А) падение АД
- Б) головная боль
- В) резкая слабость
- Г) кожный зуд

1586. [T011157] ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБОЖЖЁННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- А) холодной водой до онемения
- Б) 96% этиловым спиртом
- В) раствором новокаина
- Г) жиром

1587. [T011164] ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ГЕСТОЗЕ ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН

- А) Строгановым
- Б) Скробанским
- В) Бодяжиной
- Г) Бровкиным

1588. [T011167] НА ФОНЕ МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ АД ИЗМЕРЯЮТ

- А) до и после введения раствора сульфата магния
- Б) 2 раза в сутки
- В) 3 раза в сутки
- Г) 4 раза в сутки

1589. [T011175] ТОКОЛИТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) партусистен
- Б) простенон
- В) прозерин
- Г) пахикармин

1590. [T011176] ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СЛЕДУЮТ ПРИНЦИПУ

- А) должны назначаться врачом
- Б) не следует принимать
- В) можно принимать без консультации врача
- Г) не причиняют вреда плоду во время эмбриогенеза

1591. [T011184] ИСХОДОМ ПЕРЕНАШИВАНИЯ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) увеличение процента оперативных вмешательств
- Б) гипотрофия плода
- В) увеличение количества вод
- Г) невозможность родоразрешений через естественные родовые пути

1592. [T011188] ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОЛНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ И КРОВОТЕЧЕНИИ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) наблюдении за состоянием АД, пульсом роженицы, подготовке набора первой помощи при кровотечении, подготовке женщины к экстренной операции «кесарево сечение»
- Б) прикладывании пузыря со льдом на область матки и наблюдении за состоянием АД, пульсом
- В) выдаче дицинона и наблюдении за состоянием АД, пульсом
- Г) выдаче дицинона и прикладывании пузыря со льдом на область матки

1593. [T011190] ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ

- А) бициллин
- Б) рифампицин
- В) амоксициллин
- Г) азитромицин

1594. [T011209] ПЕРИОД ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ, КОГДА ОРГАНИЗМ РАБОТАЕТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) беременность
- Б) детство
- В) климакс
- Г) старость

1595. [T011221] БЕРЕМЕННЫМ ПОСЛЕ 28 НЕД БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ

- А) длительных поездок на любом виде транспорта
- Б) прогулок в парке
- В) сбалансированного питания
- Г) общения с родственниками

1596. [T011230] 50% ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА БЕЛКОВ В ПИТАНИИ БЕРЕМЕННОЙ ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬСЯ НА БЕЛКИ

- А) животного происхождения
- Б) растительного происхождения
- В) химического происхождения
- Г) генномодифицированные белки

1597. [T011586] ТЕРМИН «...CARDITIS» (ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОСЕРДЕЧНОЙ СУМКИ) ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИСТАВКИ

- А) peri
- Б) para
- В) pan
- Г) sub

1598. [T011587] ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) болевой синдром средней и сильной интенсивности
- Б) бессонница
- В) беременность
- Г) период лактации

1599. [T011588] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПРЕПАРАТА ОМНОПОН ОТНОСИТСЯ

- А) наркотический анальгетик
- Б) транквилизатор
- В) антибиотик
- Г) муколитик

1600. [T011589] К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

- А) феррум лек
- Б) лазикс
- В) фурагин
- Г) дифлюкан

1601. [T011590] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА КЛОНИДИН (КЛОФЕЛИН) ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гипотензивное
- Б) нейролептическое
- В) обезболивающее
- Г) противоаллергическое

1602. [T011592] ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) зиртек
- Б) фраксипарин
- В) амосин
- Г) нитрофурил

1603. [T011593] ПРЕПАРАТ ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- А) витамины
- Б) антибиотики
- В) гомеопатические средства
- Г) противовирусные средства

1604. [T011596] К ПЕРИОПЕРАТИВНОМУ ПЕРИОДУ ОТНОСИТСЯ ВРЕМЯ

- А) от принятия решения об операции до восстановления трудоспособности
- Б) от поступления пациента до начала операции
- В) от окончания операции до выписки
- Г) с момента окончания операции до восстановления трудоспособности

1605. [T011597] ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПРОВОДИТСЯ

- А) полная санитарная обработка
- Б) частичная санитарная обработка
- В) обтирание кожи и смена белья
- Г) санитарная обработка не производится

1606. [T011598] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) комплексная подготовка пациентки к операции
- Б) обследование сердечно-сосудистой системы
- В) улучшение состояния пациентки
- Г) санация очагов инфекции

1607. [T011599] СРОКОМ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) восстановление трудоспособности
- Б) выписка из стационара
- В) заживление послеоперационной раны
- Г) устранение ранних послеоперационных осложнений

1608. [T011600] ФАКТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) характер заболевания
- Б) особенности начала заболевания
- В) объем предстоящей операции
- Г) время поступления в стационар

1609. [T011601] ПРЕМЕДИКАЦИЮ БОЛЬНОМУ НАЗНАЧАЕТ

- А) врач-анестезиолог
- Б) врач приемного покоя
- В) лечащий врач

Г) акушерка

1610. [T011602] ГЛАВНЫМ ПРИНЦИПОМ В РАБОТЕ АКУШЕРКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) обеспечение безопасности материнства и соблюдение прав пациентки

Б) забота об имидже акушерки

В) выполнение всех желаний роженицы

Г) внедрение хозрасчета и расширение сферы услуг

1611. [T011603] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

А) выполнить назначенную анестезиологом- премедикацию

Б) дать женщине слабительное

В) вечером перед сном накормить женщину ужином

Г) побеседовать с родственниками

1612. [T011604] ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЧА АКУШЕРКА В ПРАВЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

А) ручное выделение и отделение последа и его частей

Б) кесарево сечение

В) прерывание беременности

Г) наложение акушерских щипцов

1613. [T011605] ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЧА АКУШЕРКА В ПРАВЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

А) рассечение промежности в родах

Б) кесарево сечение

В) прерывание беременности

Г) наложение акушерских щипцов

1614. [T011606] ПРИ ОПЕРАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-

ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ОБЯЗАННОСТЬ АКУШЕРКИ ВХОДИТ

А) подготовка беременной

Б) обезболивание пациентки

В) наложение на шейку матки циркулярного шва в области внутреннего зева

Г) беседа с родственниками

1615. [T011607] КОНТРОЛИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

А) каждый час

Б) каждые 2 часа

В) каждые 3 часа

Г) каждые 4 часа

1616. [T011608] ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРЕМЕДИКАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

А) вечером накануне операции и утром в день операции

Б) не проводится

В) за два дня до операции

Г) только утром в день операции

1617. [T011609] ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ ВИДИМАЯ КРОВОПОТЕРЯ ЧАЩЕ ВСЕГО СОСТАВЛЯЕТ В МИЛЛИЛИТРАХ

А) 500

Б) 350

В) 200

Г) 800

1618. [T011610] С ЦЕЛЬЮ ЭКСТРЕННОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ЭКЛАМПСИИ ПРОИЗВОДЯТ

А) кесарево сечение

Б) экстракцию плода за тазовый конец

В) вакуум-экстракцию плода

Г) плодоразрушающую операцию

1619. [T011611] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЮТ

А) прозерин

Б) прогестерон

В) партусистен

Г) папазол

1620. [T011612] УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ЭНДОМЕТРИТА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЧАЩЕ СВЯЗАНО С

А) наличием очагов хронической инфекции у женщины

Б) длительности безводного промежутка

В) качеством шовного материала

Г) длительности родов

1621. [T011613] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИМЕНЯЮТ

А) антибактериальную терапию

Б) гормонотерапию

В) утеротоническую терапию

Г) физические факторы воздействия

1622. [T011614] ВЕСЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД УСЛОВНО ДЕЛЯТ НА

А) диагностический и подготовительный

Б) диагностический и лечебный

В) лечебный и дооперационный

Г) ранний и поздний

1623. [T011615] ГИПЕРКОАГУЛЯЦИЯ КРОВИ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ

А) тромбозов и тромбоэмболий

Б) язв

В) пролежней

Г) кровотечений

1624. [T011616] ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛНОТЫ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

А) экстренных больных

Б) плановых больных

В) срочных больных

Г) детей

1625. [T011617] ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ПОД СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ ПАЦИЕНТКУ ПОДГОТАВЛИВАЮТ

А) так же, как для наркоза

Б) так же, как для обследования

В) так же, как для местной анестезии

Г) подготовка не нужна

1626. [T011618] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТКИ К ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

А) в обмывании или обтирании особенно загрязненных участков тела

Б) в гигиеническом душе

В) в купание в ванне

Г) обработка не производится

1627. [T011619] ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ ОБЫЧНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ

А) к 3-6-м суткам послеоперационного периода

Б) к 3-6-ти часам послеоперационного периода

В) к 3-6-ти месяцам послеоперационного периода

Г) перед выпиской из стационара

1628. [T011620] НАГНОЕНИЕ РАНЫ ОБЫЧНО ДИАГНОСТИРУЕТСЯ

А) на 6-7-е сутки после операции

Б) к 3-6-ти часам послеоперационного периода

В) к 3-6-ти месяцам послеоперационного периода

Г) перед выпиской из стационара

1629. [T011621] ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОК ПЕРЕНЕСШИХ АБДОМИНАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

А) внутрибрюшинное кровотечение

Б) похудение

В) бледность

Г) сонливость

1630. [T011622] КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА ЧАЩЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ

- А) уже в 1-е сутки после операции
- Б) на 5-е сутки
- В) на 12-е сутки
- Г) перед выпиской

1631. [T011623] СОХРАНЯЮЩИЙСЯ НА 3-4-Й ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПАРЕЗ КИШЕЧНИКА ЧАЩЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

- А) послеоперационного перитонита
- Б) кишечной непроходимости
- В) расхождении швов
- Г) формировании свища свища

1632. [T011624] ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ГИПОКОАГУЛЯЦИОННОЙ ФАЗЕ ДВС-СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) свежзамороженная плазма
- Б) цельная кровь
- В) гипертонический раствор
- Г) гипотонический раствор

1633. [T011625] ВСЯ ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЭКЛАМПСИИ НАПРАВЛЕНА НА ПРОФИЛАКТИКУ

- А) следующего приступа судорог
- Б) пареза кишечника
- В) почечной колики
- Г) печеночной комы

1634. [T011626] ЗА 30 МИНУТ ДО ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ВВОДЯТ

- А) атропин и димедрол
- Б) метилэргометрин
- В) питуитрин
- Г) прозерин и окситоцин

1635. [T011627] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пороки развития плода несовместимые с жизнью
- Б) экстрагенитальная патология в стадии компенсации
- В) предлежание плаценты
- Г) рубец на матке

1636. [T011628] ПРИ ДЕФЕКТЕ ПЛАЦЕНТЫ ПОКАЗАНО

- А) ручное обследование стенок полости матки
- Б) выскабливание стенок полости матки
- В) внутривенное введение окситоцина
- Г) проведение вакуум-аспирации

1637. [T011629] ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 5 ПЛОДАМИ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ

- А) редуцирование лишних плодов в первые недели
- Б) проведение сохраняющей терапии без редуцирования
- В) наблюдение без сохраняющей терапии
- Г) прерывание беременности

1638. [T011630] В СЛУЧАЕ РОДОВ ПРИ НОЖНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРИ МАССЕ ПЛОДА 3800 Г НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ

- А) кесарева сечения
- Б) родостимуляции
- В) перенеотомии
- Г) классического акушерского пособия

1639. [T011631] ПРИ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ СУЖЕНИЯ ТАЗА РОДЫ ЗАКАНЧИВАЮТ ПУТЕМ

- А) операции кесарева сечения
- Б) наложения акушерских щипцов
- В) родостимуляции
- Г) вакуум-экстракции плода

1640. [T011632] В СЛУЧАЕ ПОЛНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ В РОДАХ ПОКАЗАНО

- А) кесарево сечение

- Б) перенеотомия
- В) акушерские щипцы
- Г) проведение родостимуляции

1641. [T011633] В СЛУЧАЕ ДИАГНОСТИКИ КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ В РОДАХ НЕОБХОДИМО

- А) выполнять операцию кесарева сечения
- Б) применить акушерские щипцы
- В) назначить родостимуляцию
- Г) применить бинт Вербова

1642. [T011634] ОПЕРАЦИЯ ВСКРЫТИЯ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

- А) амниотомия
- Б) амниоцентез
- В) амниоскопия
- Г) амнионит

1643. [T011636] НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ МАТКИ

- А) поперечный в области нижнего сегмента
- Б) продольный в области нижнего сегмента
- В) Т-образный
- Г) корпоральный

1644. [T011637] ХОРИОНАМНИОНИТ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) противопоказанием к операции «кесарево сечение»
- Б) воспалением брюшины
- В) абсолютным показанием к операции «кесарево сечение»
- Г) относительным показанием к операции «кесарево сечение»

1645. [T011638] ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ И СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НУЖНО

- А) произвести экстраперитонеальное кесарево сечение
- Б) вести роды через естественные родовые пути
- В) выполнить интраперитонеальное кесарево сечение
- Г) наложить акушерские щипцы

1646. [T011639] АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПОКАЗАНА

- А) для профилактической меры
- Б) только при высокой температуре
- В) только при абсолютных показаниях
- Г) только при длительном безводном периоде

1647. [T011640] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ «КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ» АКУШЕРКА ДОЛЖНА ВЕЧЕРОМ ПЕРЕД СНОМ

- А) выполнить назначенные анестезиологом средства и способствовать обеспечению сна и покоя женщины перед операцией
- Б) дать женщине слабительное
- В) подробно рассказать обо всех этапах операции
- Г) накормить женщину ужином

1648. [T011641] РУЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ ПРОВОДИТСЯ ПОД

- А) внутривенным наркозом
- Б) парацервикальной анестезией
- В) пудендальной анестезией
- Г) местная инфильтрационной анестезией

1649. [T011642] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ РУЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ

- А) антибиотики и сокращающие средства
- Б) наркотические анальгетики
- В) ненаркотические анальгетики
- Г) гипотензивные и мочегонные средства

1650. [T011643] ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ «МАТКИ КЮВЕЛЕРА» ПОКАЗАНО

- А) экстирпация матки
- Б) кесарево сечение
- В) выскабливание полости матки

Г) консервативное наблюдение

1651. [T011644] ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОМУ КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

А) повышение температуры в родах

Б) безводный промежуток 12 часов

В) косое положение плода

Г) поперечное положение плода

1652. [T011645] УШИВАНИЕ ПРОМЕЖНОСТИ РОДИЛЬНИЦЫ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

А) перинеорафия

Б) эпизиотомия

В) перинеотомия

Г) витректомия

1653. [T011646] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОРЕЗА КИШЕЧНИКА НА 2-3 СУТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НУЖНО ПРИМЕНИТЬ

А) прозерин

Б) прогестерон

В) партусистен

Г) папазол

1654. [T011647] ПОКАЗАНИЕМ К УДАЛЕНИЮ МАТКИ ПРИ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

А) пропитывание стенки матки кровью

Б) перерастяжение матки

В) гипотония матки

Г) наличие добавочного рога матки

1655. [T011648] ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) боль

Б) учащенное мочеиспускание

В) диарея

Г) рвота

1656. [T011662] ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ НАЗНАЧАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (ДНЕЙ)

А) 3

Б) 1

В) 2

Г) 5

1657. [T011665] СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ

А) зависят от диагноза

Б) в ближайшие часы

В) в течение месяца

Г) в течение недели

1658. [T011667] В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЛЕЖНЕЙ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАЦИЕНТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

А) регулярная смена положения тела

Б) рациональное питание

В) применение инъекций антибиотиков

Г) подкладывание клеенки под матрац больного

1659. [T011668] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗОВ И ЭМБОЛИЙ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

А) ранняя активация пациента

Б) соблюдение диеты

В) санация очагов инфекции до операции

Г) исключение переохлаждения пациента

1660. [T011672] ЦЕЛЮЮ АКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) профилактика тромбоемболических осложнений

Б) предупреждение занесения инфекции в рану

В) предупреждение вторичного кровотечения

Г) удлинение послеоперационного периода

1661. [T011686] НЕДОСТАТОЧНО ОБРАБОТАННЫЕ РУКИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ЯВЛЯЮТСЯ

А) фактором и источником передачи инфекции

Б) источником инфекции

В) фактором передачи инфекции

Г) механизмом передачи инфекции

1662. [T011733] ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРЕЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) гипертензия

Б) гипотония

В) анемия

Г) гипогликемия

1663. [T011734] В ГРУППЕ ПОВТОРНОРОДЯЩИХ БЫСТРЫМИ СЧИТАЮТСЯ РОДЫ С ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ (Ч)

А) от 4 до 2

Б) от 6 до 4

В) менее 2

Г) менее 3

1664. [T011736] ЗАПОЗДАЛЫМИ СЧИТАЮТСЯ РОДЫ НАЧИНАЯ СО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ (ДН)

А) 295

Б) 250

В) 270

Г) 280

1665. [T011737] ПРИЗНАКОМ ПЕРЕНОШЕННОСТИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ

А) мацерация кожи стоп и ладоней

Б) широкие швы и роднички

В) масса тела 4000 г

Г) гидроцефалия плода

1666. [T011738] ПРИЧИНОЙ ПЕРЕНАШИВАНИЯ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

А) снижение концентрации эстрадиола

Б) повышение концентрации эстрадиола

В) снижение концентрации прогестерона

Г) повышение выработки простагландинов

1667. [T011739] ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ НАЗЫВАЮТ ОТХОЖДЕНИЕ ВОД

А) до начала родовой деятельности

Б) с началом родовой деятельности

В) при открытии шейки 3 см

Г) при открытии шейки 6 см

1668. [T011741] ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ БЕЗВОДНОГО ПЕРИОДА АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ___ ЧАСОВ

А) 12

Б) 24

В) 1

Г) 3

1669. [T011742] ПРИ НЕУКРОТИМОЙ РВОТЕ ОБЫЧНО ПОЯВЛЯЕТСЯ

А) тахикардия

Б) брадикардия

В) гипертензия

Г) гипертемия

1670. [T011743] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЗУС-КОНФЛИКТА ПРИ ВТОРОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 74 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ РОДОВ ИЛИ АБОРТА ВВОДЯТ

А) антирезус иммуноглобулин

Б) антибиотики

В) гемостатические средства

Г) глюкокортикоиды

1671. [T011745] РОДЫ У ЖЕНЩИНЫ С ДИАБЕТОМ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В

- А) специализированном родильном доме
- Б) родильном доме общего профиля
- В) наблюдательном отделении родильного дома
- Г) эндокринном отделении стационара

1672. [T011746] У РЕБЕНКА, РОДИВШЕГОСЯ У МАТЕРИ С ДИАБЕТОМ

- А) необходимо исследовать кровь на сахар
- Б) чаще всего бывает гипергликемия
- В) обычно выражена гипотрофия
- Г) кожные покровы, как правило, бледные

1673. [T011747] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ КРОВИ У БЕРЕМЕННОЙ

- А) план ведения беременности и родов после заключения гематолога и данных коагулограммы
- Б) родоразрешение только методом кесарева сечения
- В) всегда назначается стерильная пункция
- Г) роды проводить в наблюдательном отделении

1674. [T011748] ПРИ МИОПИИ 2-ОЙ СТЕПЕНИ (-5 - -6 ДИОПТРИЙ) У БЕРЕМЕННОЙ ПОКАЗАНО

- А) укорочение периода изгнания путем перинеотомии
- Б) кесарево сечение
- В) естественное родоразрешение без оперативных вмешательств
- Г) исключение потуг методом наложения акушерских щипцов

1675. [T011749] ПРИ МНОГОВОДИИ В РОДАХ ВСКРЫТИЕ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ

- А) при раскрытии шейки на 3-4 см вне схватки
- Б) при полном раскрытии
- В) на высоте схватки
- Г) не раньше раскрытия шейки матки на 8 см

1676. [T011750] ЖЕНЩИНА, В АНАМНЕЗЕ У КОТОРОЙ ПРИСУТСТВУЕТ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ФОРМА ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА, ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ НА УЧЕТЕ У СПЕЦИАЛИСТА

- А) онколога
- Б) венеролога
- В) нефролога
- Г) невропатолога

1677. [T011751] ИНФОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЛЯ КРИТЕРИЯ ИЗЛЕЧЕННОСТИ ПОСЛЕ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛИЗ

- А) мочи и крови на хорионический гонадотропин
- Б) крови на сахар
- В) мочи на наличие лейкоцитов
- Г) крови на RW

1678. [T011752] ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ РВОТЫ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИМЕНЯЮТ

- А) метоклопромид гидрохлорид (церукал)
- Б) скополамин
- В) атропина сульфат
- Г) дифенгидрамин (димедрол)

1679. [T011753] ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В АКУШЕРСТВЕ ПРИМЕНЯЮТ

- А) бупивакаин
- Б) анаприлин
- В) лидокаин
- Г) этимизол

1680. [T011754] РЕЛАКСАЦИЯ МАТКИ БЫСТРО ДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- А) энфлурана
- Б) дифенгидрамина (димедрола)
- В) гипотиозида
- Г) метронидазола

1681. [T011755] К ПОКАЗАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНОТЕРОЛА В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ ОТНОСЯТ

- А) угрожающие преждевременные роды

Б) маточные кровотечения, вызванные атонией матки

В) слабость родовой деятельности

Г) прерывание беременности

1682. [T011757] ДЛЯ ОСТАНОВКИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

А) эргометрина малеат

Б) динопрост

В) сальбутамол

Г) магния сульфат

1683. [T011758] ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, КОТОРОЕ ПРИВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ВРОЖДЕННЫХ УРОДСТВ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

А) эмбриотоксическое действие

Б) тератогенное действие

В) мутагенное действие

Г) фетотоксическое действие

1684. [T011759] К ПОСЛЕДСТВИЮ ВВЕДЕНИЯ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

А) гипотрофия плаценты и плода

Б) потеря слуха

В) поражение кожных покровов

Г) геморрагический синдром

1685. [T011760] СВОЕВРЕМЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

А) проводится по показаниям

Б) проводится при инфекционных заболеваниях

В) благотворно влияет на мать и плод при туберкулезе

Г) благотворно влияет на мать и плод при сахарном диабете

1686. [T011761] К ДЕЗАГРЕГАНТУ, УЛУЧШАЮЩЕМУ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ, ОТНОСЯТ

А) ацетилсалициловую кислоту

Б) анаприлин

В) морфин

Г) сумамед

1687. [T011762] К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ АЛЬБУМИНА ОТНОСЯТСЯ

А) плазмозаменители

Б) ненаркотические анальгетики

В) антибиотики

Г) антикоагулянты

1688. [T011763] К ПОКАЗАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ОКСИТОЦИН ОТНОСИТСЯ

А) послеродовая гипотония матки

Б) удушье

В) приступ стенокардии

Г) гипертонический криз

1689. [T011764] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ЦЕРУКАЛ ЯВЛЯЕТСЯ

А) противорвотное

Б) антиаритмическое

В) гипотензивное

Г) диуретическое

1690. [T011765] К ГРУППЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ОТНОСИТСЯ

А) гепарин натрия

Б) ацетилсалициловая кислота

В) диклофенак натрия

Г) ибуклин

1691. [T011767] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ АНТИБИОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) антимикробное

Б) жаропонижающее

В) противоаллергическое

Г) адсорбирующее

1692. [T011768] К СИМПТОМУ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА ОТНОСИТСЯ

- А) гематурия
- Б) дизурия
- В) никтурия
- Г) пиурия

1693. [T011770] ПРИ ВНЕЗАПНОМ СНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ВНУТРИВЕННО

- А) эпинефрин (адреналин)
- Б) преднизолон
- В) ацетилсалициловую кислоту
- Г) дицинон

1694. [T011771] К КОЖНОМУ АНТИСЕПТИКУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ

- А) спирт 70%
- Б) фурацилин
- В) спирт 40%
- Г) перекись водорода

1695. [T011772] К ПРЕПАРАТУ, ПРОТИВОПОКАЗАННОМУ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ОТНОСИТСЯ

- А) стрептомицин
- Б) пенициллин
- В) амоксициллин
- Г) азитромицин

1696. [T011773] АНТИБИОТИКОМ ИЗ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) пефлоксацин
- Б) карбенициллин
- В) рифампицин
- Г) стрептомицин

1697. [T011774] ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИЙ СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) галидор
- Б) фестал
- В) пепсин
- Г) омез

1698. [T011775] АДРЕНОБЛОКАТОРОМ, ИСПОЛЬЗУЕНЫМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) атенолол
- Б) фуросемид
- В) омепрозол (омез)
- Г) изоптин

1699. [T011776] ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) фамотидин
- Б) сайтотек
- В) солкосерил
- Г) дротаверин (но-шпа)

1700. [T011777] К ЦЕФАЛОСПОРИНАМ 1 ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСЯТ

- А) цефазолин
- Б) беродуал
- В) винпоцетин
- Г) сумамед

1701. [T011780] К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- А) эссенциале форте
- Б) ацетилсалециловая кислота
- В) винпоцетин
- Г) лазолван

1702. [T011781] ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ ПО ЗИМНИЦКОМУ НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ _____ ПОРЦИЙ МОЧИ

- А) 8
Б) 2
В) 12
Г) 6
- 1703. [T011782] СБОР МОЧИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КАЖДЫЕ (Ч)**
А) 3
Б) 2
В) 4
Г) 6
- 1704. [T011783] ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВОСПРИЯТИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПАЦИЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ**
А) памятку
Б) направление
В) лабораторный бланк
Г) выписку из амбулаторной карты
- 1705. [T011784] НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО КАЛА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ (В ГР)**
А) 5
Б) 10
В) 20
Г) 15
- 1706. [T011785] КАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ СОБИРАЕТСЯ ИЗ**
А) трех мест
Б) одного места
В) двух мест
Г) четырех мест
- 1707. [T011786] КАБИНЕТ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, В КОТОРОМ ВРАЧ ОСМАТРИВАЕТ ПАЦИЕНТА, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ**
А) смотровой
Б) санпропускник
В) клизменная
Г) диагностическая
- 1708. [T011787] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (ММ. РТ. СТ.)**
А) 40-50
Б) 60-89
В) 80-100
Г) 100-139
- 1709. [T011788] НОРМАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ (ММ. РТ. СТ.) ЯВЛЯЮТСЯ**
А) 60-89
Б) 90-100
В) 140-159
Г) 100-139
- 1710. [T011789] ПОД ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА ПОНИМАЮТ**
А) асистолию
Б) брадикардию
В) тахикардию
Г) аритмию
- 1711. [T011790] ПОД ТАХИКАРДИЕЙ ПОНИМАЮТ ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ БОЛЕЕ (В МИН)**
А) 80
Б) 60
В) 70
Г) 50
- 1712. [T011791] ДЕФИЦИТ ПУЛЬСА ВОЗНИКАЕТ ПРИ**
А) мерцательной аритмии
Б) повышении артериального давления

В) понижении артериального давления

Г) брадикардии

1713. [T011792] ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СОСТАВЛЯЮТ (С⁰)

А) 0,2-0,5

Б) 1,0-1,5

В) 0,8-1,0

Г) 0,1-0,3

1714. [T011794] В РАЗВИТИИ ЛИХОРАДКИ РАЗЛИЧАЮТ _____ ПЕРИОДА

А) 3

Б) 2

В) 4

Г) 1

1715. [T011795] ГРАНИЦЫ СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА (С⁰) ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЮТ

А) 37,1-38

Б) 39,1-40

В) 38,1-40

Г) 36,1-37,3

1716. [T011796] ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) озноб

Б) чувство жара

В) рвота

Г) судороги

1717. [T011797] ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВТОРОГО ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) чувство жара

Б) озноб

В) сухость кожных покровов

Г) бледность кожных покровов

1718. [T011798] К ТИПУ ЛИХОРАДКИ, ПРИ КОТОРОЙ УТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ВЫШЕ ВЕЧЕРНЕЙ, ОТНОСИТСЯ

А) извращенная

Б) послабляющая

В) перемежающаяся

Г) атипичная

1719. [T011799] ЛИХОРАДКА, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ СВЫШЕ 45 ДНЕЙ, ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ

А) хроническая

Б) острая

В) подострая

Г) мимолетная

1720. [T011800] ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

А) «Ниттифор»

Б) натрия гидрокарбонат

В) «Мистраль»

Г) раствор фурацилина

1721. [T011801] КРАТНОСТЬ РАСЧЕСЫВАНИЯ ВОЛОС ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТ

А) ежедневно

Б) один раз в три дня

В) один раз в два дня

Г) не реже одного раза в неделю

1722. [T011802] ОПРЕЛОСТИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В

А) паховых складках

Б) локтевых сгибах

В) подмышечных впадинах

Г) области коленного сустава

1723. [T011803] КРАТНОСТЬ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ РОДИЛЬНИЦАМ

СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 раз в три дня
- Б) 1 раз в семь дней
- В) ежедневно
- Г) по мере загрязнения

1724. [T011804] СМЕНА БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- А) систематически, до прекращения выделений из ран
- Б) 1 раз в три дня
- В) один раз в семь дней
- Г) 4-5 раз в сутки

1725. [T011805] ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИИ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ_(ЧАС)

- А) 12
- Б) 8
- В) 10
- Г) 14

1726. [T011806] СТЕРИЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В

- А) операционных, родильных блоках, палатах для новорожденных
- Б) операционных, манипуляционных, палатах для новорожденных, родильных блоках
- В) операционных, палатах для новорожденных и интенсивной терапии
- Г) операционных, родильных блоках

1727. [T011807] ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИИ ДОПУСКАЕТСЯ В

- А) помещении для грязного белья с водостойкой отделкой поверхностей
- Б) кладовой для чистого белья
- В) санитарной комнате
- Г) кабинете сестры хозяйки

1728. [T011808] ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА ВО ВДЫХАЕМОЙ СМЕСИ СОСТАВЛЯЕТ (%)

- А) 40-60
- Б) 20-40
- В) 60-80
- Г) 80-100

1729. [T011809] ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КИСЛОРОДА С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА БОБРОВА ПРИМЕНЯЮТ

- А) дистиллированную воду
- Б) перманганат калия 5%
- В) перекись водорода 3%
- Г) раствор натрия хлорида 0,9%

1730. [T011810] К ПОСЛАБЛЯЮЩИМ КЛИЗМАМ ОТНОСИТСЯ

- А) масляная
- Б) очистительная
- В) лекарственная
- Г) питательная

1731. [T011811] ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ НЕОБОДИМО ПРИГОТОВИТЬ 100 МЛ

- А) 10% раствора хлорида натрия
- Б) 2% раствора гидрокарбоната натрия
- В) 5% раствора сульфата магния
- Г) 0,9% раствора хлорида натрия

1732. [T011812] ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (ЧАС)

- А) 6-10
- Б) 1-2
- В) 4-6
- Г) 10-12

1733. [T011813] ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) острая задержка мочи более 6 часов

Б) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала

В) недержание мочи

Г) появление отеков

1734. [T011814] ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НЕ СОДЕРЖАЩИХ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И СПОР, ЯВЛЯЮТСЯ

А) стерильными

Б) чистыми

В) продезинфицированными

Г) одноразовыми

1735. [T011815] ИНСУЛИН ВВОДЯТ В ОРГАНИЗМ

А) после того как место инъекции просохло от антисептика

Б) через 15 секунд после обработки антисептиком

В) сразу же

Г) через 30 секунд после обработки антисептиком

1736. [T011817] ПРИ ПОПАДНИИ 10% РАСТВОРА ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ ПОД КОЖУ РАЗВИВАЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ

А) некроз мягких тканей

Б) тромбофлебит

В) абсцесс

Г) инфильтрат

1737. [T011818] К ОСЛОЖНЕНИЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОД КОЖЕЙ ВОЗНИКЛО БАГРОВОЕ ПЯТНО ПРИ ПУНКЦИИ ВЕНЫ, ОТНОСИТСЯ

А) гематома

Б) медикаментозная эмболия

В) тромбофлебит

Г) некроз

1738. [T011819] К ОСЛОЖНЕНИЮ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К МОМЕНТАЛЬНОЙ СМЕРТИ ПРИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ, ОТНОСИТСЯ

А) воздушная эмболия

Б) гематома

В) сепсис

Г) некроз

1739. [T011821] ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО

А) белка в моче

Б) эритроцитов в моче

В) дыхательный объем

Г) тургор кожи

1740. [T011822] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ АКУШЕРСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

А) окситоцина

Б) ампициллина

В) димедрола

Г) прозерина

1741. [T011823] ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ЗАКАЗАТЬ

А) свежзамороженную плазму

Б) изотонический раствор

В) антибиотики

Г) консультацию терапевта

1742. [T011824] ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ПРИГОТОВИТЬ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ

А) ручного обследования матки

Б) наложения акушерских щипцов

В) вакуум-экстракции плода

Г) вакуум-аспирации

1743. [T011825] ПРИ АКУШЕРСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

А) катетеризировать периферическую вену

Б) назначить общий анализ крови

В) обработать палату

Г) вызвать санитарку

1744. [T011826] БЕРЕМЕННАЯ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ

А) тихом

Б) шумном

В) ярком

Г) большом

1745. [T011827] ИНВАЗИВНЫЕ И БОЛЕЗНЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ БЕРЕМЕННОЙ ПОСЛЕ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ ВОЗМОЖНО ПРОВОДИТЬ

А) только после введения в наркоз

Б) без прикрытия наркозом

В) в соответствии со стадией эклампсии

Г) только в родильном зале

1746. [T011828] ПРИ НАГНОЕНИИ ШВОВ ПРОМЕЖНОСТИ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО

А) проинформировать врача о сложившейся ситуации

Б) вызвать родственников

В) изолировать пациентку

Г) изменить диету

1747. [T011829] ПРИ НАГНОЕНИИ ШВОВ ПРОМЕЖНОСТИ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА ПОДГОТОВИТЬ РОДИЛЬНИЦУ С НОВОРОЖДЕННЫМ К

А) переводу в обсервационное акушерское отделение

Б) переводу в детское отделение

В) выписке домой

Г) переводу в инфекционное отделение

1748. [T011830] СНИМАЮТ ШВЫ НА ПРОМЕЖНОСТИ, ОЧИЩАЮТ РАНУ ОТ ГНОЙНОГО ОТДЕЛЯЕМОГО И ПО ВОЗМОЖНОСТИ УДАЛЯЮТ УЧАСТКИ НЕКРОТИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ В

А) обсервационном акушерском отделении

Б) родильном зале

В) приемном отделении

Г) выписной комнате

1749. [T011831] ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОГО СЕПСИСА БЕЗ МЕТАСТАЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) септицемия

Б) пиодермия

В) септикопиемия

Г) анемия

1750. [T011832] ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОГО СЕПСИСА С МЕТАСТАЗАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) септикопиемия

Б) пиодермия

В) септицемия

Г) анемия

1751. [T011833] САМОЙ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А) флегмонозная

Б) серозная

В) инфильтративная

Г) застойная

1752. [T011834] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А) лактостаз и трещины сосков

Б) разрыв промежности

В) низкий вес плода

Г) асимметрия молочных желез

1753. [T011835] ПРЕПАРАТОМ, ИНГИБИРУЮЩИМ СЕКРЕЦИЮ ПРОЛАКТИНА ПРИ ЛАКТАЦИОННОМ МАСТИТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

А) бромокриптин

Б) сумамед

В) окситоцин

Г) метилэргометрин

1754. [T011836] У ВСЕХ БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА

- А) обеих руках
- Б) левой руке
- В) правой руке
- Г) это не имеет значения

1755. [T011837] СПОСОБОМ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) волдырная проба
- Б) прикроватный тест
- В) признак Вастена
- Г) измерение окружности живота

1756. [T011838] СПОСОБОМ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) взвешивание беременных
- Б) прикроватный тест
- В) признак Вастена
- Г) измерение окружности живота

1757. [T011839] ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БЕЛКА В МОЧЕ НЕОБХОДИМО

- А) повторить анализ
- Б) назначить диуретики
- В) собрать анамнез
- Г) вызвать родственников

1758. [T011840] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) мелькание мушек перед глазами
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

1759. [T011841] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ощущение тяжести в области лба, затылка
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

1760. [T011842] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) шум в ушах
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

1761. [T011843] НАСТОРАЖИВАЮЩИМ СИМПТОМОМ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выпадение полей зрения
- Б) чувство голода
- В) усталость
- Г) гордая походка беременной

1762. [T011844] ПРОВОЦИРУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКЛАМПСИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) яркий свет, громкий звук, боль
- Б) приглушенные звук и свет
- В) тишина
- Г) просторная одежда

1763. [T011845] ОПАСНОСТЬ ПРИПАДКА ЭКЛАМПСИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) кровоизлиянии в жизненно важные органы
- Б) прибавке веса
- В) похудении
- Г) изменении настроения

1764. [T011846] ОПАСНОСТЬ ПРИПАДКА ЭКЛАМПСИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) нарушении маточно-плацентарного кровообращения

- Б) прибавке веса
- В) похудении
- Г) изменении настроения

1765. [T011847] ФИБРИЛЛЯРНЫЕ ПОДЕРГИВАНИЯ МЫШЦ ВЕК ХАРАКТЕРИЗУЮТ ФАЗУ ЭКЛАМПСИИ

- А) преэклампсию
- Б) тонические судороги
- В) клонические судороги
- Г) разрешение припадка

1766. [T011848] СЕРИЮ ПРИСТУПОВ ЭКЛАМПСИИ НАЗЫВАЮТ

- А) эклампсическим статусом
- Б) тетанусом
- В) клонусом
- Г) тонусом

1767. [T011849] ПРИСТУП ЭКЛАМПСИИ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- А) во время беременности, в родах и в послеродовом периоде
- Б) только во время беременности
- В) только в родах
- Г) только в послеродовом периоде

1768. [T011850] ЭКЛАМПСИЯ БЕЗ СУДОРОГ

- А) существует
- Б) не существует
- В) обсуждается
- Г) не известно

1769. [T011851] СОЗДАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПО В.В. СТРОГАНОВУ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

- А) преэклампсии
- Б) кровотечения
- В) тазовом предлежании плода
- Г) гестационном сахарном диабете

1770. [T011852] ПРИ УГРОЗЕ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ АКУШЕРКА ДОЛЖНА

- А) вызвать акушера-гинеколога, бригаду специализированной скорой помощи
- Б) проветрить помещение
- В) накормить беременную
- Г) вызвать родственников

1771. [T011853] ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ

- А) только в условиях развернутой операционной
- Б) в любых условиях
- В) в теплом помещении
- Г) в присутствии второй акушерки

1772. [T011854] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КРОВЯНИСТЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ НЕОБХОДИМО

- А) вызвать акушера-гинеколога, бригаду специализированной скорой помощи
- Б) проветрить помещение
- В) накормить беременную
- Г) вызвать родственников

1773. [T011855] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КРОВЯНИСТЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННОЙ С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ НЕОБХОДИМО

- А) немедленно госпитализировать
- Б) проветрить помещение
- В) накормить беременную
- Г) вызвать родственников

1774. [T011856] В ОТЛИЧИЕ ОТ ГИПОТОНИЧЕСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ТРАВМЕ РОДОВЫХ ПУТЕЙ МАТКА

- А) плотная
- Б) дряблая
- В) мягкая

Г) асимметричная

1775. [T011857] ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ АКУШЕРКЕ НЕОБХОДИМО

А) вызвать акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога

Б) наложить кровоостанавливающий жгут

В) ввести кровоостанавливающие средства

Г) начать переливать кровь

1776. [T011858] ПОСЛЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЬНОГО РУЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СТЕНОК ПОЛОСТИ МАТКИ ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ПОВТОРНО ДРУГОЙ АКУШЕРКОЙ

А) противопоказано

Б) показано

В) зависит от ситуации

Г) зависит от возраста пациентки